

430029
~~430029~~



Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b29299184>

W. Q. 290

BEHANDELING

DER

HUIDZIEKTEN;





W. F. Büchner
medic et chirurg. vrbu.

BEHANDELING
DER
SLEPENDE
HUIDZIEKTEN:

DOOR
W. F. BÜCHNER,

Med. et Chir. Doctor te Gouda.

Te AMSTERDAM,
BIJ R. J. BERNTROP.

1839.



VOORBERIGT.



Het gemis van een uitvoerig werk over de slepende huidziekten, zelfs van vertalingen, waarmede ons de pers anders ruimschoots voorziet, heeft den uitgever van mijn Handboek genoopt, dat gedeelte, waarin de slepende huidziekten afgehandeld worden, afzonderlijk uit te geven, onder den titel: »Behandeling der slepende Huidziekten;» hopende daarmede aan het geneeskundig publiek eene dienst te bewijzen, door in eene behoefte te voorzien, die veelmalen drukkend wordt gevoeld. Ik vereenig mijne wenschen met de hoop des uitgevers, namelijk: dat dit werk moge be-

antwoorden aan de billijke vorderingen van mijne kunstgenooten.

Dat ik in de behandeling van dit mijn onderwerp, veelvuldig gebruik heb moeten maken, zoowel van oudere als van nieuwere schrijvers, kan bij hem die met den omvang der slepende huidziekten bekend is, geene verwondering verwekken.

Men vordere noch verwachte nieuwe theoriën over en vreemde behandelingen van de beschrevene ziekten; theoriën welke vaak al wat vroegere ervaring heeft geleerd, omver werpen, en de daardoor ledig geworden plaatsen met hersenschimmen aanvullen.

Ik heb getracht de waarheid uit de natuur te putten, zij moge oud of nieuw zijn. De daarbij geraadpleegde schrijvers, zijn kort aangewezen, ten einde een' ieder' het zijne behoude, en geene vruchten geplukt worden, in den tuin van eenen anderen gekweekt.

Buitendien schreef ik zonder schroom, naar overtuiging, opnemende, wat mij noodig en nuttig scheen, weglatende het overtollige; vooral van datgene wat mij voorkwam tot de mode-artikelen te behooren, en geen gezag door de goedkeuring

van stembevoegde mannen in de kunst verkregen heeft. Bij huidziekten, tot hiertoe voor ongeneesbaar te houden, heb ik, zonder terughouding, het onvermogen der kunst erkend.

De afstand der drukpers heeft fouten doen insluipen; de meest zinstorende zijn op een bijgevoegd blad aangewezen, de min belangrijke ter verbetering aan den welwillenden lezer overgelaten.

Door een bijgevoegd register wordt het gebruik van dit werk gemakkelijk gemaakt. Zonder al te groote wijdloopigheid, vlije ik mij, dat het noodige daarin is opgenomen.

Verplichting gevoelende aan de beoordeelaars, der door mij in het licht gegevene werken, beveel ik hun dezen mijnen arbeid. Het oordeel van geleerde en verdienstelijke mannen, is mij niet onverschillig. De geneeskunst rust op ervaring, ervaring op juiste waarneming en oordeel, maar wie ziet, wie hoort, wie voelt alleen datgene, wat wezentlijk te zien, te hooren en te voelen is? En waar is de mensch die zich in staat bevindt altijd en overal een juist oordeel te vellen, zoo lang beperkende invloeden, den menschelijken geest

binnen vaste grenzen gebouden houdt? Het oordeel van anderen hebben wij tot wegwijzer noodig, op het pad der ervaring. Als zoodanige beschouw ik mijne beoordeelaars; onder beding van toestemming, dat ook hunne oordeelvellingen naar den mensch rieken.

Bijval vindende, zal een stel platen bij dit werk worden uitgegeven, waarvan de prospectus met proefplaten aan het geneeskundig publiek zal worden voorgelegd. Vertrouwende op eene goede uitvoering, bevelen schrijver en uitgever, dezelve aan de welwillende medewerking en deelneming der vaderlandsche kunstgenooten.

GOUDA,
den 24 Junij 1839.

W. F. BÜCHNER.

INLEIDING.

De slepende huidziekten, waarvan reeds het noodige in de inleiding tot de huidziekten in het algemeen (2de deel, 2de afd. 2de stuk) gezegd is, zijn een der moeilijkste hoofdstukken, zoowel der bespiegelende als der beoefende geneeskunst. Dit spruit voort uit de veelvuldigheid harer oorzaken en de duisterheid, die deze nog bedekt; voorts uit het bezwaar, om met juistheid orden, klasfen en foorten vast te stellen, en hare grenzen naauwkeurig af te bakenen, met vermijding van verwarringen; maar vooral uit derzelve geneeskundige behandeling. Het getal der geneesmiddelen, tegen dezelve aangeraden, is te groot; de middelen zelven zijn dikwijls te tegenstrijdig, om ze allen aan te halen en over derzelve gebruik te spreken; terwijl de keuze van die, welke te behouden, en die, welke te verwerpen zijn, hoogst moeilijk is.

Het is waar, de vorderingen, die de geneeskunst in de kennis der slepende huidziekten gedurende de laatste 30 jaren gemaakt heeft, (nadat echter reeds vroeger LORRY en PLENK goede bakens gesteld hadden) zijn zeer groot. Door de voortreffelijke schriften van R. WILLAN, BATEMAN, RAYER, ALIBERT, BIËTT, GREEN, BLASIUS, RUST en meer anderen, is veel geschied en zijn groote schreden gedaan op den weg, die tot de den mensch mogelijke volmaking van dat gedeelte der geneeskunst leidt. Doch, er bestaat nog veel, dat duister is, en tot deszelfs opheldering den arbeid van genievolle mannen vordert, in daartoe gunstige betrekkingen geplaatst.

Dat er, voor als nog, groote moeilijkheden met de rangschikking der huidziekten gepaard gaan, wordt voldingend bewezen door de verscheidenheden en afwijkingen, welke wij ontwaren bij het onderzoek der verdeelingen in orden, klassen en soorten, door de genoemde schrijvers in hunne werken aangenomen en gevolgd. Ééne en dezelfde ziekte vindt men bij den eenen tot deze, bij den anderen tot geene orde of klasse gebragt, niettegenstaande zij in het grondbeginfel, waarop de door hen aangenomene verdeelingen rusten, namelijk de uitwendige gedaante des uitslags, met elkander overeenstemmen.

Alleen die geneesheeren, welke bij groote hospitalen, of bij inrigtingen, enkel ter opneming van slepende huidziekten daargesteld, geplaatst zijn, en de geneeskundige praktijk uitoefenen,
zijn

zijn bevoegd om veranderingen en wijzigingen in de thans algemeen aangenomene verdeeling voor te stellen; want zij bezitten de hulpmiddelen om zoowel het gebrekkige aan te toonen, als de veranderingen en wijzigingen, die zij noodig oordeelen, door den schat van eigene ervaringen te staven. De geneesheer, in den burgerstand of bij burger-ziekenhuizen geplaatst, heeft daartoe zelden, zoo immer, de noodige gelegenheid. Zelden valt het hem ten deel, de slepende huidziekten in al hare mogelijke gedaanten en wijzigingen bij elkander te zien en waar te nemen: de uitgebreidste praktijk en een lang gerekt leven zijn daartoe niet toereikend. Ook aan den geoefendsten arts komen gevallen voor, waarin hij twijfelt; want hij moet ziekten erkennen en bij den ziektenaam noemen, die hij te voren nimmer gezien heeft: eene taak, die ook dan nog onoverkomelijke zwaarigheden oplevert, wanneer hem alle afbeeldingen en beschrijvingen der ziekten bekend zijn.

Van deze waarheden doordrongen, heb ik mij in de verdeeling der slepende huidziekten, voornamentlijk tot die van BIETT en GREEN bepaald, en daarbij ook andere schrijvers geraadpleegd. Door die verdeeling aan te nemen, als hebbende het burgerregt bij de geneeskundigen van onzen tijd verkregen, kwam ik in de verpligting, hier en daar van de verdeeling, in dit Handboek in de inleiding tot de huidziekten in het algemeen voorkomende, af te wijken. Daarbij scheen het mij nuttig en derhalve ook noodig te zijn, de geheele verdeeling

der huidziekten , zoowel der heete als der slepende , over te nemen , — met aanwijzing echter van de plaatsen , waar de eerste in dit werk reeds behandeld zijn. De jeugdige kunstgenoot erlangt daardoor een algemeen overzicht van alle huidziekten , en van de verdeeling , door de laatste en beste schrijvers over die ziekten aangenomen ; hetwelk dezen of genen niet ongevallig , eenigen welligt ook nuttig kan zijn.

Ik heb gemeend , niet te mogen nalaten , onaan- gezien de groote zwarigheden , daarmede verbonden , ook de Hollandsche namen der slepende huidziekten op te geven en deze naast de kunstbenamingen te plaatsen. Dat hierdoor aanleiding tot gegronde aanmerkingen gegeven wordt , is ligt te bevroeden : ik , voor mij zelve , ben geenszins met allen tevre- den. Intusschen zal men willen toestemmen , dat , bij het gemis eener algemeen aangenomene Holland- sche benaming , iedere daarop doelende poging , voor hoe vele verbetering dezelve ook vatbaar moge wezen , op eenige welwillende toegevendheid mag hopen. Want ook min doelmatig gekozen namen kunnen ontkennend nuttig zijn , daar de verbeteringen , die dezelve vorderen , andere kunstgenoo- ten aansporen iets te leveren , dat beter en meer doeltreffend is.

De verdeeling der huidziekten , op de uitwendige gedaante des uitslags gegrond , vordert eene korte omschrijving en bepaling van de vormen des uit- slags : dezelve zullen aan het hoofd der orde hare plaats vinden.

1^o. Orde. *Exanthemata*. Heete ontstekingswaardige VERDEELING.
en koortsige huidziekten.

- | | | |
|------------------------|---|---|
| a. <i>Erythema</i> . | } | Deze zijn reeds afgehandeld
in het II Deel, 2 afd.,
1 stuk. |
| b. <i>Erysipelas</i> . | | |
| c. <i>Roseola</i> . | | |
| d. <i>Scarlatina</i> . | } | II Deel, 2 afd., 2 stuk. |
| e. <i>Rubeola</i> . | | |
| f. <i>Urticaria</i> . | | |

2^o. Orde. *Vesiculae*. Blaasjes.

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| a. <i>Miliaria</i> . | } | II Deel, 2 afd., 2 stuk. |
| b. <i>Varicella</i> . | | |
| c. <i>Eczema</i> . | Hitte uitslag. Vurige puisten. | |
| d. <i>Herpes</i> . | Haarworm. | |
| e. <i>Scabies</i> . | Schurft. | |

3^o. Orde. *Bullae*. Blaren, Bleinen, Blazen.

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| a. <i>Pemphigus, Pompholyx</i> . | { | II Deel, 2 afd.,
2 stuk, pag. 1065. |
| b. <i>Rupia</i> . | | |
| Vuile Blaar, v. Korst, v. Haarworm. | | |

4^o. Orde. *Pustulae*. Puisten.

- | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------|
| a. <i>Variolae</i> . | } | II Deel, 2 afd., 2 stuk. |
| b. <i>Vaccinia</i> . | | |
| c. <i>Ecthyma</i> . | Etterende puisten, Etterende
Haarwormen. | |
| d. <i>Impetigo</i> . | Natte roof. | |
| e. <i>Acne</i> . | Vinnen. | |
| f. <i>Mentagra</i> , <i>Sycosis</i> . | Baardschurft. | |
| g. <i>Porriga</i> . | Hoofdzeer. | |

5^e. Orde. *Papulae*. Peukels.

- a. *Strophulus*. Tanduitslag.
- b. *Lichen*. Huidmos.
- c. *Prurigo*. Huidjeukte.

6^e. Orde. *Squammae*. Schubben.

- a. *Lepra*. Melaatschheid.
- b. *Psoriasis*. Drooge kraauwfel, droog
schubachtig Huidmos.
- c. *Pytiriasis*. Zemel-uitslag.
- d. *Ichthyosis*. Vischschubachtig uitslag.

7^e. Orde. *Tuberculae*. Knobbels.

- a. *Elephantiasis Graecorum*. Grieksche oliv-
fantsziekte.
- b. *Moluscum*. Uitwasfen.
- c. *Framboesia*. Pokken der Goudkust.
- d. *Lupus*. De wolf.
- e. *Cancer*. Kanker of kreeftgezwel.
- f. *Furunculus*. Bloedzweer, Bloedvin.
- g. *Anthrax*. Pestkool.
- h. *Pustula maligna*. Zwarte Blaas.

8^e. Orde. *Maculae*. Vlekken.

- a. *Ephelis*. Sproeten.
- b. *Naevus*. Moedervlekken.
- c. *Albinismus*. Witte huid.
- d. *Vitiligo*. Gevlekte huid.

9^e. Orde. Ziekte der Huid-aanhangfels.

- a. *Onychia*. Ziekte der nagels.

b. *Pli-*

- b. *Plica*, *Trichoma*, *Plicatio*, *Plicatura*.
Poolfche vlecht.

Huidziekten, welke tot geene der voorgaande orden gebragt en grondvormen voor nieuwe orden aangenomen kunnen worden.

- 10^e. Orde. *Pellagra*. *Dermatagria*. *Erysipelas periodicus nervosus chronicus*, *Scorbutus alpinus*. Lombardysche pokken, Scheurbuik der Alpen.

11^e. Orde.

- a. *Syphilides*. Venerifche Huidziekten.

12^e. Orde.

- a. *Purpura*, *petechiae*. Peperkoorn. Handboek II deel, 2 afd., 2 ftuk, pag. 810.

13^e. Orde.

- a. *Elephantiasis Arabum*. Arabifche olifantsziekte.

14^e. Orde.

- a. *Keloides*. *Cheloides*. *Cancroides*. Schildpadroof.

2^o. Orde. *Vesiculae*. *Blaasjes*.

Kleine door opheffing der opperhuid ontstane blaasjes, met een helder, doorschijnend, waterachtig vocht gevuld, dat in het verdere beloop troebel, wit, ondoorschijnend, gekleurd of etterachtig wordt, met of zonder ontsteking der huid. De blaasjes bersten; het vocht, dat zich dan ontlast, verdroogt tot dunne, gele of bruinachtige schilfers. Wanneer dit geen plaats vindt, wordt de waterachtige vloeistof door de opflorpemde vaten opgenomen, de opgehevene opperhuid verdroogt en schilfert af; wanneer dezelve vroeger loslaat, dan ontstaan vochtige ontvellingen.

Tot deze orde behooren: a. *Eczema*. b. *Herpes*. c. *Scabies*.

I.

Eczema. Hitte-uitslag, Vurige Puisten.

Bepaling. Kleine in een zeer groot getal naast elkander staande blaasjes, die niet ineenvloeijen, in plekken van onrégelmatige gedaanten uitbotten, op de geheele oppervlakte des ligchaams voorkomen in eenen grooteren of kleineren omvang, eenige deelen der huid echter meer dan andere beminnen; dezelve gaan met hevige jeukte gepaard, verloop en zonder koorts met weinig of geene ontsteking; de blaasjes verdroogen en schilferen af, er ontstaan dunne, ligtgele roven of natte ontvellingen. De uitbottingen grijpen dikwijls bij herhalingen plaats; na de genezing blijven eene vlekken of andere teekenen op de huid terug.

Naar

Naar aanleiding van de voornaamste vormen, Verdeeling. waarin deze huidziekte voorkomt, onderscheidt men:

- a. *Eczema acutum.*
- b. ——— *chronicum.*

Alhoewel het *Eczema* tot de min belangrijke en dikwijls voorkomende huidziekten behoort, en aan de geneesheeren uit de vroegste tijdperken der kunst, zoowel als aan die van lateren tijd bekend was, heerscht er toch nog groote onzekerheid omtrent deszelfs oorzaken en kenteekenen. Dit is blijkbaar uit de geschriften zelfs van die geneeskundigen, die zich de grootste verdiensten omtrent de huidziekten verwierven; vooral wanneer wij op hunne schikkingen in orden, klasfen en foorten acht geven. LORRY heeft het *Eczema* niet onder de blaasjes, maar onder de *papulae* (peukels), SCHMOLZ onder *Hydroa* gebragt; terwijl ALIBERT wijzigingen van hetzelfde als *Squammosa humida*, *Lichen agacus*, *Tinea asbestina* en *Furfuracea* beschrijft. Aangaande de oorzaken en kenteekenen, zullen wij in het volgende gelegenheid vinden, de deswege bestaande verscheidenheden en afwijkingen, bij onderscheidene schrijvers voorkomende, aan te stippen.

De geheele oppervlakte der huid kan door het *Eczema* worden aangedaan. Op die plaatfen, waar de uitwendige bekleedselen met de slijmvliesen zamenhangen, breidt het zich somwijlen ook over gedeelten van deze uit. Bij voorkeur echter tast het die deelen aan, welke met haren bezet zijn,

of een groot aantal smeerbeursjes hebben. Het behaarde hoofd (*Eczema capitis*), de okselholte, het aangezicht (*Eczema faciei*), de borsten bij vrouwen, de handen, de vouw des elleboogs en de knieholte, de teeldeelen (*Eczema genitalium*) bij beide geslachten en de omliggende deelen zijn de plaatsen, welke het bij voorkeur aandoet. Menigwerf breidt het zich, wanneer de teeldeelen lijden, over de inwendige oppervlakte van de schede en het fundament uit; zelden blijft het tot een der genoemde deelen bepaald; gewoonlijk komt het op meer plaatsen te voorschijn met gelijktijdige of achtereenvolgende uitbottingen, zoodat het meermaalen van plaats verandert. Somwijlen, echter zeldzaam, breidt hetzelfde zich over de geheele oppervlakte des ligchaams uit.

Besmettelijkheid.

In geene der gedaanten, waarin het *Eczema* voorkomt, is hetzelfde besmettelijk. Echter kunnen de afgescheidene vochten zeer scherp worden, en door plaatselijke prikkeling op de huid van gezonde personen een *Eczema* voortbrengen. BIETT spreekt van voorbeelden na den *Coïtus*.

Kenteekenen.

Zelden zijn de blaasjes grooter dan eene gierstkorrel of een speldeknop. Zonder voorboden grijpt de uitbotting met hevige jeukte plaats, breidt zich van eenen kleinen omtrek over eene groote oppervlakte uit, keert van tijd tot tijd terug, verdroogt op de eene plaats en komt op eene andere weder te voorschijn, en maakt den bedriegelijken schijn der tot stand gekomene genezing kenbaar. De grondvlakte der blaasjes geeft geene of slechts

flechts eene zeer geringe ontfleking te kennen, de aanwezige roodheid der huid heeft de gedaante van onregelmatige plekken en striemen. De blaasjes, alhoewel in groot getal opgehoopt, digt bij elkander staande en zamenhangende, vloeijen nimmer tot groote blazen te zamen.

De duur is zeer verschillend : van weken tot maanden en jaren. In den ligststen graad blijven de blaasjes van acht tot veertien dagen staan, verdroogen en schilferen met dunne, weeke plaatjes af, en de geheele duur der ziekte blijft binnen den tijd van drie weken beperkt. Dezelve duurt langer, wanneer de blaasjes bersten en de ontlaste vochten tot gele en bruine dunne roven verdroogen. Geschiedt dit niet, en grijpen er ontvellingen plaats, dan wordt de ziekte eene der langwijdigste. De ontlasting van waterachtige vochten is alsdan verbazend groot; de verbanden en het linnen, waarmede de ontvelde deelen gedekt worden, zijn spoedig doorweekt en moeten zeer dikwijls ververscht worden. Dit vocht verspreidt eenen onaangename reuk, gelijkende, volgens ALIBERT, aan dien, welke heet gemaakt meel of vermolmd hout van zich geven.

Een der teekenen, aan deze ziekte bijzonder Jeukte. eigen, bestaat in de buitengewone jeukte, die het eigenaardige heeft, dat zij met een hevig brandend gevoel gepaard gaat. De lijder, tot aanhoudend krabben genoodzaakt, ontwaart daardoor echter geene aangename vermindering van jeukte, gelijk bij andere huidziekten, maar brandende pijnen, wel-

welke den toestand des lijdens , bij eenige uitgebreidheid des uitflags , allerbeklagenswaardigst maken. Al de blaasjes worden door het aanhoudend krabben opengereten , en eene vochtige , bloedige ontvelling voortgebracht , die hoogst pijnlijk is. De aandrang tot krabben blijft intusfchen zoo hevig , dat de lijdens zich daarvan niet kunnen onthouden. LORRY verhaalt , dat mannen , die zich met de meeste vastheid van wil daarvan onthielden , door fluipen werden aangetast ; alsmede , dat hij een geval heeft waargenomen , waarin een *Eczema penis priapismus* veroorzaakte. De jeukete is , volgens ALIBERT , zoo ondragelijk , dat de lijdens dag noch nacht eenige rust genieten , zich het vel met de nagels verscheuren , en door zelfmoord een einde aan hun leven trachten te maken.

Voorbeschik-
kende oorza-
ken.

Lieden van eene zachte , teedere , weeke huid , die veel en sterk zweeten , die door gebrek aan linnen en kleeding de noodige reinheid misfen ; — zij , die door hunne beroepsbezigheden ontbloote ligchaamsdeelen aan de zonnestralen of de kunsthitte moeten blootstellen , zijn het meest aan deze ziekte onderhevig.

Gelegenheid-
gevende oor-
zaken.

Armoedige , vochtige , ongezonde woningen , slecht voedsel , misbruik van sterken drank , groote hitte , de arbeid in fabrieken en andere werkplaatsen , waarbij eenige huiddeelen veelvuldig of aanhoudend met scherpe , de huid prikkelende stoffen in aanraking komen.

Scherpe uitwendige geneesmiddelen (*Eczema pharmacitum*) de onwillekeurige afvloeijing van de

urin, het afloopende zog bij vrouwen, en andere langs natuurlijke of buitengewone wegen afgescheidene vochten, welke fcherp zijn, en voortdurend fommige huiddeelen nat maken; — de zoogenaamde fcherpten, het langdurig gebruik van kwik (*Eczema mercuriale*), van zwavel (*Eczema a sulphure*), koortfen en andere ziekten, die zich door opgewekte werkdadigheid der huid critisch befliften. In vele gevallen zijn er geene bekende oorzaken voorafgegaan, dat er echter van de genoemde fteeds de eene of andere aanwezig is, blijkt daaruit, dat gezonde, in allezins gunftige omftandigheden levende perfonen zelden of nimmer door *Eczema* aangetast worden.

Deze bestaat in verhoogde terugwerking der lijdende huiddeelen, door algemeene of plaatselijke prikkeling opgewekt, met ophooping van niet behoorlijk toe bereide voedingsftoffen in het bloed, tot welker onfchadelijkmaking de natuur buitengewone affcheidingen behoeft, om de gezondheid te bewaren of te herftellen.

Naaste oorzaak.

Eczema acutum.

De fpoedig verloopende hitte-uitflag.

a. *Eczema simplex.* De eenvoudige hitte-uitflag.

Uitbotting met jeukte, zonder voorboden, tot eenen begrensden omtrek bepaald. De zeer talrijke, gierstkorrelvormige blaasjes ftaan digt bij elkander, vloeijen niet in een, zijn doorschijnend, glin-

glinsterend, ongekleurd, zonder ontsteking. Het daarin bevatte heldere, doorschijnende vocht wordt troebel en wit. Door de spoedig volgende opflorping worden de blaasjes flets, ledig, verdroogen en schilferen in zeer dunne plaatjes bijna onmerkbaar af. Ook gebeurt het, dat de blaasjes bersten, en de uitgestorte vochten tot dunne schubachtige schilfers verdroogen, spoedig afvallen en geen spoor op de huid terug laten. Volgens GREEN blijft er eene roode vlek terug, die of droog is of in het midden eene kleine opening heeft, waaruit een waterachtig vocht zijpelt. Hiermede strijden de algemeen aangenomen onderscheidingskenmerken van het *Eczema simplex*, namelijk, afwezigheid van ontsteking en waterachtige uitwaseming, en niet wederkeerende afschilfering; bewijzende alzoo, dat de door GREEN opgegeven uitgang de aanwezigheid van eene der overige wijzigingen dezer huidziekte te kennen geeft.

De duur van het *Eczema simplex* is van twee tot drie weken, somwijlen nog langer, doordien achtereenvolgens op onderscheidene huiddeelen nieuwe uitbottingen plaats grijpen. Gewoonlijk blijft hetzelfde tot enkele huiddeelen bepaald (*Eczema locale simplex*); zelden breidt het zich algemeen uit (*Eczema universale simplex*). De deelen, op welke het inzonderheid voorkomt, zijn: het aangezicht, de armen, de handen en de oppervlakte tusschen de vingers. Het wordt dan ligtelijk met het schurft verward, te eerder, daar hevige jeukte beide ziekten vergezelt.

Jonge lieden, die eene teedere huid hebben, het vrouwelijk geslacht, kraamvrouwen en personen, welke eene groote hitte bij hunnen arbeid moeten verduren, hebben de grootste voorgeschiedtheid om er door aangetast te worden.

Deszelfs gewone oorzaken zijn: de werking der zonnestralen bij groote hitte op de bloote huid (*Eczema solare*), scherpe, prikkelende inwrijvingen en waschingen, kwik- en zwavelzalven. Kwakzalvers bedienen zich van deze middelen, om de voorgenoemde terug getredene scabies, die zij als oorzaak van vele ziekten uitkrijten, op nieuw te doen uitbotten, terwijl zij niets anders dan een plaatselijk *Eczema* voortbrengen.

Het is eene ligte plaatselijke ziekte, die zonder Voorzegging. belangrijke verschijnselen verloopt en met geene toevallen gepaard gaat, welke een algemeen lijden der bewerktuiging aanwijzen. Als complicatie komt hetzelfde somwijlen met de scabies en het huidmos (*Lichen*) voor, meerendeels opgewekt door uitwendige hulpmiddelen, welke tot de genezing van die ziekte worden aangewend.

b. *Eczema rubrum*. De roode hitte-uitslag. *Herpes squamosa madidans* (van ALIBERT).

Hitte en spanning in de huid gaan den uitslag vooraf en vergezellen denzelven; de huid heeft, door vermeerderden toevloed van bloed eene roode kleur; derzelver oppervlakte wordt ruw door opkomende kleine, witte peukels, die in witte, doorschijnende blaasjes van onregelmatige gedaante overgaan,

gaan , ter grootte van speldeknoopen en door eenen fijnen rooden ring omgeven. Niet voor den zesden of achten dag neemt de roodheid af , het vocht in de blaasjes verdwijnt door opflorping , en nadat deze geheel dáár is , grijpt er eene zemelachtige afschilfering plaats , met fijne ronde plaatjes , die somwijlen aan de huid een bepoederd aanzien geven. Na de afschilfering blijft de huid nog eenige dagen rood , bezet met kleine ronde peukels , door eenen onregelmatigen witten ring omgeven.

Niet altijd is het verloop zoo eenvoudig en regelmatig ; zeer dikwijls blijft de huid voortdurend rood en in eenen geprikkelden toestand ; de vochten , die zich uit de opengekrabde en gebersten blaasjes onlasten , worden scherp en verwekken huidontsteking met natte ontvelling. De eerst waterachtig uitzijperende vochten bekomen , door bijmenging van bloed eene roode kleur , worden kleverig , dikker en verdroogen tot dunne , breede , weeke schilfers ; deze vallen af om voor andere plaats te maken ; de huid blijft rood en ontstoken. Naar mate de hoeveelheid der afgescheidene vochten vermindert , worden de schilfers dikker , drooger , vaster en blijven langer zitten. De huid herkrijgt in den omtrek der aangedane deelen hare natuurlijke kleur en gedaante , van waar de genezing naar het middelpunt toe voortgaat ; dezelve komt na een tijdsverloop van drie weken tot stand. Dieper in de bewerktuiging gewortelde oorzaken beletten de genezing , en hebben den overgang in het slepende *Eczema* ten gevolge.

c. *Eczema impetiginodes*. De nat-roovige hitte-uitslag.

Deze ontwikkelt zich of oorspronkelijk, doordien de ziekelijke terugwerking der huid, tot eenen hooger trap geklommen zijnde, grootere blaasjes ontwikkelt; of afgeleid uit het *eczema rubrum*; in beide gevallen neemt het eene nat-roovige gedaante aan. De huiddeelen, op welke de uitbotting plaats heeft, zijn gezwollen, de water vaat klieren in de nabijgelegene deelen zwellen en worden pijnlijk. De blaasjes worden ondoorschijnend, en het vocht, in dezelve bevat, verandert in een' dunnen etter. De blaasjes bersten spoedig, en het uitgestorte vocht verdikt tot schijnvliesachtige witte stremsels, of verdroogt tot gele, weeke, opgehoopte, somwijlen zeer groote schubben; waar dezelve afschilferen heeft de huid eene karmozijn roode kleur met afscheiding van een roodgekleurd waterachtig vocht, dat wederom tot schubben verdroogt, die wederom afvallen, om door andere vervangen te worden.

Gedurende eenigen tijd, zoo lang namelijk, als de verhoogde terugwerking aanhoudt en de scherpte der afgescheidene vochten eenen toestand van ontsteking in de huid onderhoudt, vinden de afschilferingen en ontwikkeling van nieuwe schubben en roven plaats. Naarmate gene afnemen, vermindert het getal der blaasjes, de waterachtige vochten worden in eene mindere hoeveelheid afgescheiden, de daaruit gevormd wordende schubben zijn dunner, en de huid herneemt allengskens hare

natuurlijke gedaante en kleur, nadat eene tijdruimte van meer dan drie weken verlopen is.

De uitflag kan alleen plaatselijk tot een enkel huiddeel bepaald blijven (*Eczema impetiginodes locale*), of algemeen zijn (*Eczema impetiginodes universale*). In beide deze gedaanten is hetzelfde eene meer of minder belangrijke ziekte, gaat dikwijls met koorts en andere toevallen gepaard, afhankelijk van algemeene stoornissen der bewerktuiging.

Wanneer de uitflag algemeen verbreid is, vindt men gewoonlijk gelegenheid, hetzelfde gelijktijdig in al zijne verschillende wijzigingen en overgangen van de eene gedaante in de andere waar te nemen. Op onderscheidene huiddeelen, dikwijls binnen eenen kleinen omtrek en dicht bij elkander, ziet men de peukeltjes, als eerste kiemen des uitflags, de blaasjes van derzelver aanvankelijke tot volkomene ontwikkeling, alle rangen doorlopende, het uitzweeten der waterachtige vochten, de verdrooging tot schubben, en deze in al hare wijzigingen.

Bij den plaatselijken nat-roovigen hitte-uitflag, ziet men tusfchen de daaraan eigene peukels en blaasjes, die van den roode: een bewijs, dat beide geene verschillende ziekten zijn, maar wijzigingen van eene en dezelfde.

Het *eczema impetiginodes* gaat in het fleepende over, wanneer het langer dan dertig dagen duurt: in niets verschillend van datgene, waarin het roode overgaat. De bij voortduring uitbottende
blaas-

blaasjes met derzelver eigenaardig verloop, en de afwezigheid van ware puisten, leveren kenschetsfende onderscheidingsteekenen op, die tegen de dwaling beveiligen van hetzelfde voor den natroovigen uitflag (*impetigo*) aan te zien, of voor eene samenstelling uit *eczema* en *impetigo* te houden. Echter kunnen bij hevige ontsteking der huid en de aanwezigheid van inwendige oorzaken complicatiën met andere huidziekten, en wel voornamelijk met *impetigo* en *ecthyma* (etteraarde, huidmos) voorkomen. Het eigendommelijke der *eczema*-blaasjes, de groote zich spoedig vullende puisten van *impetigo* en *ecthyma* maken het niet moeilijk deze complicatie te erkennen en juist te beoordeelen.

Het *eczema acutum* is in zijne verschillende vormen, doorgaans eene ware uitwendige tot de huid bepaalde ziekte, die met geene eigenlijdende algemeene aandoening der bewerktuiging gepaard gaat en een regelmatig beloop volgt. Wanneer hetzelfde eene groote oppervlakte der huid inneemt, en met hevige ontsteking gepaard gaat, ontstaan medelijdend algemeene toevallen: de pols wordt vol en groot, de spijsvertering gestoord, en in de afscheidingen grijpen afwijkingen en wijzigingen plaats; ook het zenuwgestel wordt daarin betrokken.

Eczema chronicum.

Wanneer het *eczema rubrum* en *impetiginodes* in het slepende overgaan, dan wordt de huid, door de telkens op nieuw uitbottende blaasjes, aanhoudend in eenen toestand van verhoogde reactie

gehouden, en door de fcherpe vochten, die ontlast worden, geprikkeld; de ontsteking dringt dieper in het weeffel der huid. Er grijpen ontvellingen plaats in den omtrek der gewrichten, zoowel als op die plaats, waar de huid door de bewegingen plooit; er ontstaan meer of minder diepe kloven, die eene buitengewoon groote hoeveelheid dunne waterachtige vochten ontlasten, welke de verbanden en de kleederen spoedig doorweken en derzelver verversching bij herhaling noodig maken. Worden de vastgekleefde verbanden onvoorzigtig afgerukt, dan heeft men eene bloedende oppervlakte. De huid is eenigzins zuchtig gezwollen, en de ingedrukte voren, door de plooiën der verbanden, blijven nog nadat deze zijn weggenomen, gelijk bij andere zuchtige zwelling, eenigen tijd staan. In deze gedaante is het *eczema* eene zeer langdurige en hardnekkige ziekte, die maanden en jaren kan voortduren, en vaak alle pogingen tot genezing verijdt.

In het beloop dezer ziekte, komen afwisselend verbetering en verslimming voor. De uitgestorte vochten blijven dun en waterachtig, en beletten door de groote hoeveelheid de opdrooging tot schubben en roven. Bij vrouwen worden op deze wijze de handen en vingers menigwerf zoo hevig aangetast, dat de afgescheidene waterachtige vochten druppelsgewijze afvloeijen; bij mannen voornamelijk de voeten of ook, de vochten dik etterachtig en verdroogen tot schubben en roven, die af-

afvallend eene roode oppervlakte terug laten, op welke weder nieuwe blaasjes uitbotten, die hetzelfde beloop volgen.

Het plaatselijk slepende *eczema* verbreidt zich menigwerf over eene groote oppervlakte der huid. Somwijlen blijft het tot eenen kleinen omtrek beperkt, en bepaalt zich tot den rug van den neus, eene der oorfehelen, den rug der hand, enz.

Het slepende *eczema* tast meer volwasfenen dan kinderen, en het vrouwelijk geflacht meer dan het mannelijke aan. Het komt dikwijls met de eerfte lentewarmte te voorfchijn, blijft gedurende den zomer aanwezig, verdwijnt in den herfst, en fchijnt in den winter genezen, tot dat in het voorjaar nieuwe uitbottingen het tegendeel bewijzen. Menigmaal wordt het slepende *eczema* door buikloop vervangen, zoodat de eene dezer ziekten te voorfchijn treedt, wanneer de andere den lijder verlaat. In het algemeen oefenen de jaargetijden en groote plotfelinge veranderingen in de warmtemaat des dampkrings eenen zeer kennelijken invloed uit op de ontwikkeling, herhaling en verflimmering der uitbottingen en des uitflags.

De oorzaken van het slepende *eczema* zijn zelden alleen uitwendige en plaatselijk werkende, gewoonlijk de zoodanige, welke als bekende of als verborgene algemeen werkende fchadelijkheden medelijgend eene verhoogde en ziekelijke terugwerking in de huid opwekken, hetzij als crisis of ter vervanging van andere ziekten.

Het *eczema simplex* wordt menigwerf met de *Diagnos. Ichurft* verwisseld. Het ontwikkelt zich, gelijk

deze, zonder voorafgaande ontsteking of andere voorboden, bepaalt zich vaak alleen tot de handen en vingers, en gaat met hevige jeukte gepaard. De onderscheidingsteekenen zijn: de kleine ronde gierstvormige blaasjes, die, op een rood veld opgehoopt, dicht bij elkander staan, samenhangen, meer vochtig zijn, en dikwijls na tuschenpoozen de koortsen uitbotten; de schilfers en schubben keeren meermalen terug. De genezing komt door middelen tot stand, die de schurft niet genezen. Bij de schurft zijn de blaasjes puntig met eene harde grondvlakte, niet opgehoopt of samenhangend, en staan afgezonderd; het talrijkst aan de gewrichten en tuschen de vingers. Op andere ligchaamsdeelen komen dezelve hier en daar slechts enkel voor, uitgezonderd in zeer verouderde gevallen, waarin het geheele ligchaam er mede bezet is. De jeukte verwekt eene aangener gewaardwording, terwijl dezelve bij het *eczema* altijd met pijn gepaard gaat. Eindelijk is de schurft besmettelijk, het *eczema* niet.

Het *eczema rubrum* kan met den gierstuitslag verwisseld worden. De afwezigheid van koorts bij het *eczema*, het algemeene lijden, het spoedige beloop, het gevaar, dat de gierstuitslag influit, en de grootere niet samenhangende blaasjes leveren verscheidenheden genoeg op, om beide de ziekten niet met elkander te verwisselen.

Eczema impetiginodes onderscheidt zich van *impetigo* (natte roof) door de volgende teekenen. De *impetigo* blijft tot eenen kleinen omtrek bepaald,

paald, komt niet met blaasjes, maar met puisten op, welke een dikker, ondoorschijnend etterachtig vocht bevatten, dat tot roven en korsten, en niet tot schilfers en schubben opdroogt.

Eczema chronicum is vaak moeilijk te erkennen, en kan met *lichen agrius* verwisseld worden. Onderscheidingsteekenen zijn: de schubben bij het *lichen agrius* zijn dikker, donkerder van kleur en roofachtig; deze, afvallende, laten ligte likteekens na, en de oppervlakte blijft met peukels bezet. Bij de andere soort van *lichen* is de huid meer in de diepte ontaard, meer gespannen en kan niet in plooijen worden opgevat; de omtrek der aangedane huid is met geene blaasjes, maar met harde peukels bezet, die lang staan blijven.

De *psoriasis* onderscheidt zich van het *eczema chronicum* door de grootere schubben, door de gladde roode verhevene oppervlakte, die na het afvallen van dezeive terug blijft; door haar geheel beloop en door de kloven en wrongels, welke de aangedane huiddeelen in alle rigtingen doorkruisen en van de bewegingen der spieren niet afhankelijk zijn.

Het *eczema capitis* is eene der meest voorkomende plaatselijke foorten, dat dikwijls met *tinea capitis* of *porrigo* verwisseld wordt. Het kenstetst zich door alleen kinderen beneden zes jaren oud, voornamelijk gedurende het tanden krijgen, aan te tasten; als ook door de groote hoeveelheid kleverige waterachtige vochten, die het hoofd zoo

nat maken, als of er water over was uitgegoten. De haren kleven te zamen, en overdekken met de schilfers van de opgedroogde vochten het geheele hoofd als met een vilt, waarin eene tallooze menigte ongedierte nestelt. Onder dit dekfel is de huid rood, ligt gezwollen, met een groot getal kleine gaatjes bezaaid, waaruit voortdurend veel waterachtig vócht zijpelt. De kinderen worden door eene ondragelijke jeukte gekweld, zoodat zij het hoofd geen oogenblik stil houden, zelfs niet in den slaap, maar onophoudelijk op het kussen of op den nek heen en weder wrijven en met de nagels openrijten. Wanneer de uitslag zich over het geheele hoofd uitbreidt, dan deelt het zich aan het voorhoofd, de wangen, den neus en de ooren mede. De ontsteking bereikt somwijlen eenen hoogen trap, zoodat kleine abscesfen in het celweeffel ontstaan; de halsklieren worden pijnlijk en zwellen, enkele gaan tot verzwering over. De haarbolletjes nemen geen deel in het lijden der huid, de haargroei gaat krachtig voort en nimmer volgt er kaalhoofdigheid. Meerendeels bestaan bij deze soort van lijders scrophuleuse aandoening en gebrekkige voeding.

Het *eczema faciei* en *aurium* behooren tot het eenvoudige en roode *eczema* met al de verschijnselen, aan deze soorten eigen, en onderscheiden zich van de *crusta lactea*, waarmede zij door onachtzaamheid dikwijls verwisseld worden. Beide behooren tot de hardnekkigste soorten.

Voorzegging. De roode en de roofachtige hitte uitslag (*eczema*

rubrum en *impetiginodes*) zijn geene gevaarlijke, Prognosis. maar zeer lastige ziekten, geneesbaar door eene doelmatige behandeling, zonder eenige sporen na te laten. De slepende hitte-uitslag (*eczema chronicum*) is eene kwellende en langdurige ziekte, vooral dan, wanneer met de wisseling der jaargetijden nieuwe uitbottingen plaats grijpen, deze andere ziekten vervangen, en wederkeeren wanneer gunstige verschijnselen eene spoedige genezing beloven. Het wordt zeer langdurig en dikwijls ongeneesbaar, wanneer het met andere slepende huidziekten verbonden voorkomt. Volgens ALIBERT gaat het meermalen in plaatselijke en algemeene waterzucht, in andere ziekten en *marasmus* over.

In de eerste plaats is het noodig, de aanwezige Geneeskundige uitwendige oorzaken doelmatig uit den weg te ruimen door zuiverende en verzachtende wasfchingen en baden, de huid van alle vreemde en prikkelende zelfstandigheden te reinigen en tegen dezelve te beveiligen.

Wanneer de ziekelijk verhoogde reactie der huid alleen door uitwendige prikkels is opgewekt en on- Eczema simplex. derhouden wordt, kan de genezing spoedig tot stand worden gebragt door verkoelende, zuurachtige, ontstekingswerende dranken: limonade, water en azijn, wei van melk met wijnsteen of tamarinde bereid, met toevoeging van antiphlogistische lakfeermiddelen, wanneer de buiksondasting terug blijft. Tegen het *eczema* na de koepok-inenting ontstaan, heeft CORRIGAN eene vereeniging van jalappe en salpeter met vrucht aangewend. Uitwendig fchrijve

men verzachtende wasfchingen met afkookfel van zemelen en warm-water baden voor. Biedt de ziekte aan deze middelen tegenftand, breidt zich de uitflag verder uit en wordt de jeukte hevig, dan moeten fterker werkende lakfeermiddelen bij herhaling worden toegediend, afgewisfeld met afkookfels van de fassaparillen en aftreksels van de *serpentaria*. Uitwendig zijn alsdan de loogzout- en zwavelbaden noodig. De eerfte bereidt men door vier tot acht oncen kali of *natron carbonicum* in het noodige water voor een bad op te losfen; — de zwavelbaden door vier oncen zwavellever in de plaats van de koolzure loogzouten te nemen. Die baden moeten eene warmte hebben van 90 tot 95 graden FAHRENHEIT.

Eczema rubrum et impetiginodes.

Deze worden in derzelver ligtere graden op dezelfde wijze behandeld. Is de ontfteking der huid meer ontwikkeld, de uitflag algemeen verbreid, hardnekkig en langdurend, dan zijn er bloedontlastingen door aderlatingen en bloedzuigers op de meest aangedane huiddeelen noodig; daarna geeft men de verkoelende lakfeermiddelen bij herhaling, en zoo lang er eene afleiding naar het darmkanaal gevorderd wordt; vervolgens zweetmiddelen, fpiesglasbereidingen, volgens WHITTING den *tartarus emeticus*, van $\frac{1}{16}$ tot $\frac{1}{8}$ grein om de drie uren, verbonden met *opium* als de jeukte zeer hevig is; afkookfels van *sassaparillen*, *dulcamara* en *cortex peruvianus* met zwavelzuur, waar de geheele bewerktuiging door het plaatselijk lijden ontftemd is, en de krachten ondersteuning behoeven. Uitwendig be-

bezige men, om de pijnen en de jeukte der ontvelde oppervlakte te bedaren, verzachtende pappen en omflagen: dunne uit bittere amandelen bereide emulsiën, afkookfels van *hb Malvae*, *radix altheus*, en *hb Hyosciami*. PEARSON raadt het gebruik van een *ceratum saturni* en GOSSET lijnolie met kalkwater aan. De diëet moet zachtvoedend en niet overvloedig zijn. Alle scherpe, gezoute en gerookte spijzen, bier, koffij en de geestrijke dranken zijn schadelijk. Steeds drage men zorg voor de noodige zuivering der huid door warme baden met slijmachtige toevoegfels, begunstige de genezing door loogzout- of zwavelbaden en zwavelbe-rookingen. Het linnen, het beddegoed en de kledingstukken, die in onmiddellijke aanraking met de huid komen, moeten dikwijls verwisfeld worden.

De geneeskundige behandeling dezer ziekte is in Eczema chroni-
nicum. het algemeen meer empirisch dan rationeel. Bij de schrijvers over dezelve, de beroemdste niet uitgezonderd, vindt men, zonder bepaalde aanwijzingen, vele en zeer verschillende geneesmiddelen aangeraden, terwijl zij nu het eene, dan het andere bezigen, zonder redenen van deze voorkeur te geven. Om eenige regelmatigheid in acht te nemen, zal ik in de eerste plaats spreken van de behandeling der oorzaken, ten andere van die der toevallen, en in de derde plaats het belangrijke der empirische behandeling mededeelen.

a. *Behandeling der oorzaken.*

Waar gastrische prikkels aanwezig zijn, en de verrigtingen der buksingewanden aan traagheid
lij-

lijden, waardoor de ziekelijke terugwerking der huid opgewekt en onderhouden wordt, beginnen de behandeling met verkoelende lakfeermiddelen, uit middelzouten, wei van melk met wijnsteen vervaardigd, eenige glazen Senglitzer of andere lakferende minerale wateren. Kan men, wegens de geringe aandoenlijkheid van het darmkanaal en traagheid in de verrigting der afscheidende buiksin-gewanden, met de genoemde middelen het doel niet bereiken, dan gaat men tot de sterker werkende lakfeermiddelen over, en geeft de *calomel* van 4 tot 6 greinen, met *aloës*, *resina jalappae*, de *gummi gutta*, het *scammonium* of het *extractum colocynthis*. Gedurende het geheele beloop der ziekte blijven deze middelen aangewezen, zoo lang de buikontlasting moet bevorderd worden, of eene krachtige afleiding van de huid naar het darmkanaal noodig is.

Ontsteking. Zoowel de ontsteking der huid, als de algemeene ontstekingstoestand der bewerktuiging, volbloedigheid en overtollige voeding, moeten in aanmerking genomen, eerst gematigd of opgeruimd worden, alvorens men tot andere middelen mag overgaan: aderlatingen, bloedzuigers of bloedige koppen zijn dan aangewezen. Men ondersteunt dezelve door verkoelende lakfeermiddelen, door dranken, met plantenzuren bereid, en schralen kost.

Uitwaseming. Bij eene drooge huid, ruwe oppervlakte, en nimmer of zeldzaam plaats vindend zweet, herstelle men de huidwerkdadigheid door zweetmidde-
len,

len, uit kleine giften *tartarus emeticus*, *spiritus mindereri*, aftreksels van de *flores sambuci* en afkookfels van de *sassaparilla*, *cichorei*, *rad. Bardanae*, *rad. graminis*, enz.

Waar de kenteekenen dezer ziekte aanwezig zijn, en het *eczema* daaruit deszelfs bestaan ontleent, zijn de *anti-scorbutica* aangewezen. Spoedig slaagt men alsdan in de genezing door het gebruik der minerale zuren, vooral van het zwavel- en salpeterzuur. Men geeft dezelve van eene halve tot heele drachma, gemengd in eene pint gerstewater of een ander slijmachtig vocht, binnen 24 uren te gebruiken. Bij groote gevoeligheid van de maag, worden de zuren nog meer verdund, of men laat het gebruik, telkens een glas gerste- of rijstwater drinken. Volgens BIËTT werkt het salpeterzuur het krachtigst, en verdient de voorkeur boven het zwavelzuur. Gelijktijdig geven men de versch uitgeperste sappen van *cichoreum*, *taraxacum*, waterkers en van soortgelijke anti-scorbutische planten. Mogten andere scherpten aanwezig zijn, de scrophuleuse, venerische, enz., dan moeten dezelve met de bekende middelen tegen die ziekten bestreden worden.

Dit behoort tot de hardnekkigste en langdurigste wijzigingen dezer ziekte. Het tast voornamelijk de onderste ledematen aan, heeft eene bruine of violet kleur, en gaat met de gewone verschijnselen der kwikziekten, vooral met aandoeningen van het tandvleesch en de speekselklieren gepaard. De zwavelbereidingen, de *flores sulphuris*, de
Hydrargyria.
Eczema mercuriale.
lac

lac sulphuris, de zwavellever en de minerale zwavelwateren zijn alsdan onze meestvermogende geneesmiddelen. Wanneer de minerale zwavelwateren niet goed verdragen worden, dan verdunt men dezelve met zoete melk, gerstewater of andere slijmachtinge vochten, in afnemende hoeveelheid toegevoegd, tot dat het water enkel verdragen wordt. Uitzwendig bezige men de zwavelbaden en de zwavelberookingen, echter niet voordat de verhoogde gevoeligheid der huid door verzachtende baden gematigd is. Van de berookingen gebruik makende, drage men zorg, de lijdende huiddeelen aan geene te groote hitte bloot te stellen.

De toevallen bij het *eczema chronicum*, welke eene bijzondere oplettenheid en eene gewijzigde behandeling vorderen, zijn:

a) De jeukte en pijn. Om deze lastige toevallen te matigen, is het gebruik van eenvoudige warme waterbaden, wasfchingen en omslagen nuttig. Met deze niet slagende, voege men slijmachtinge afkookfels van althea-wortel, van lijnzaad en zemen, of 6 tot 12 oncen dierlijke gelei bij ieder bad. Tot wasfchingen en stovingen verdient de *emulsie* van bittere amandelen bijzonder aanprijzing.

b) Overvloedige waterachtige afscheidingen en ontvellingen. Deze vorderen, in de eerste plaats, reiniging der lijdende deelen door baden en wasfchingen met warm water, vervolgens omslagen met *aqua goulardi*, *aqua vegeto-mineralis*, afkookfels van de *malvae* of aftrekfels van vlierbloemen met *acetas plumbi liquidum*. Van strooipoeders,

zamengesteld uit gelijke deelen *flores zinci* en *femen lycopodii* heb ik steeds boven alle andere middelen de meeste hulp erlangd, om de waterachtige afscheidingen der door *eczema* aangetaste deelen op te droogen. Bij groote zwakte en oplossing der vochten is het raadzaam gelijktijdig het zwavelzuur en den *cortex peruvianus* toe te dienen.

Empirische behandeling. Men neemt tot deze zijne toevlugt, wanneer de redenerende geneeswijze vruchteloos aangewend werd, of wanneer de oorzaken der ziekte, gelijk menigwerf plaats heeft, verborgen zijn.

a.) *Loogzouten.* Met een gunstig gevolg heeft men het *kali* en *natrum carbonicum* in hardnekkige gevallen, met hevige jeukte gepaard, aangewend. Men geeft dezelve inwendig: eene halve drachma in 24 uren, opgelost in een afkookfel van de *radix cichorei* of de *stipites dulcamarae*. Uitwendig in baden plaatselijk in stovingen en omflagen, waartoe men eene oplossing van ééne once in 16 oncen van slijmachtige afkookfels gebruikt.

b.) *Spaansche vliegentinctuur.* Men heeft deze, voornamelijk bij vrouwen, nuttig bevonden. Dezelve wordt om te beginnen, in giften van 3 druppels des morgens in een wijnglas met gerstewater of amandelmelk toegediend. Om den anderen dag wordt de gift met één' druppel vermeerderd, tot dat men tot het hoogste getal, namelijk van 25 tot 30 druppels daags geklommen is.

c. *Arsenicum album, acidum arsenicosum.* Rattenkruid, arsenik-zuur. Volgens BIËRT heeft men
van

van de arsenikbereidingen alleen nog hulp te verwachten tegen de hardnekkigste soorten van het slepende *eczema*, dat bij mannen aan het *scrotum*, bij vrouwen aan de borsten en tepels, bij beide geslachten aan de handen, de teeldeelen en de dijen, en bij kinderen op het behaarde hoofd (door ALBERT onder de benamingen van *tinea asbestina* en *furfuracea* beschreven) voorkomt.

De arsenikbereidingen, waarvan men zich bedient, zijn :

a.) De *Aziatische pillen*, (*) voornamelijk bij de Engelsche geneesheeren in gebruik. Men laat gedurende vier tot zes weken, dagelijks eene pil nemen. Bespeurt men, dat dezelve niet goed verdragen worden, zoo staakt men het gebruik gedurende eenigen tijd, om daarna in kleinere giften weder te beginnen.

b. De *solutie van FOWLER*. In deze is de basis arsenikzure potasch. Dezelve wordt op deze wijze bereid :

R. *arsenici albi*.

Sal. Tartari depurati aa gr. LXIV.

Aquae fontanae distillatae unc VI.

coque in balneo arenae usque ad solutionem

(*) *Aziatische pillen.*

R. *Protoxyd. Arsenic. gr. LV.*

pip. nigri. gr. IX.

f. pil. N. 800. d. s.

dagelijks ééne pil.

nem perfectam arsenici. Solutioni refrigeratae adde spiritus lavendulae compositae unc. β. aq. distillatae quantum requiritur ut efficiat omnis massa librum unum.

80 droppels zullen een $\frac{1}{2}$ grein arsenikzuur bevatten; volgens SACKS is deze hoeveelheid grooter. De oplossing van FOWLER is de krachtigste van alle arsenik-bereidingen; men geeft dezelve in giften van drie droppels des morgens nuchteren, gemengd met zuiver water; om de vijf of zes dagen vermeerderd men die gift met twee tot drie droppels. BIETT is nooit hooger geklommen dan tot vijftien droppels daags.

c) De solutie van PEARSON. Deze is zachter, en gemakkelijker te bereiden. Bij prikkelbare personen, bij vrouwen en bij kinderen kan men zich alleen van dezelve zonder gevaar bedienen, bekomt dezelve beter en wordt eerder dan de andere bereidingen verdragen. De basis is arsenikzure foda, ter hoeveelheid van $\frac{1}{8}$ grein in ééne drachma vocht. Men begint met vijf tot tien droppels, alengskens tot 20—60 opklimmende.

d.) De oplossing van BIETT, sedert 1818 in gebruik gebragt en met goed gevolg toegediend, staat gelijk met de oplossing van PEARSON en wordt op dezelfde wijs als gene aangewend. De basis is arsenik-zure ammonia.

Ik herhaal, wat ik reeds vroeger over het inwendige gebruik van den arsenik gezegd heb, namelijk, dat ik geene vrijheid vind, een zoo gevaarlijk middel inwendig toe te dienen. Die het

gebruiken wil, doe zulks steeds met de grootste voorzorg en schroomvallige omzigtigheid, denken- de aan de waarschuwing van SACKS, die zegt: „noch theorie, noch ervaring, noch empirie, regtvaardigen het inwendig gebruik van het ratten- kruid, en geven nimmer eene voldoende veront- schuldiging aan de hand.”

e.) De behandeling van LORRY. Hij hecht groo- te waarde aan de zweetmiddelen en raadt tot in- wendig gebruik *serum lactis*, hoender- en kalfs- bouillon, de versche sappn van *cichoreum*, *tarax- acum*, waterkers, enz.; in navolging der Griek- sche geneesheeren, aromatieke middelen, *calamus aromaticus*, saffraan, de *serpentaria*, de sandel- houten en den *helleborus*, zoowel inwendig als uit- wendig in baden. Uitwendig: waschingen met rozenwater, met *oxymel* van rozen-azijn, *aqua vegeto-mineralis* en waterbaden. Ook houdt hij het voor een gunstig verschijnsel, wanneer op de baden eene nieuwe of sterkere uitbotting volgt.

f.) De behandeling van JONATH. GREEN. Na voorafgegane algemeene en plaatselijke bloedontlas- tingen geve men een sterk werkend lakseermid- del, zuivere de huid door warme waterbaden, met bijvoeging van haver- of gerstenlijm of dierlijke gelei, wanneer de huiddeelen sterk ontstoken, zeer pijnlijk zijn en hevig jeuken. Deze toevallen ge- matigd zijnde, wordt er tot de zwavel-berookingen overgegaan, om den anderen dag af te wisselen met de straks genoemde baden. Waar het de verheffingen der toevallen vorderen, moeten de
bloed-

bloedontlastingen en de lakfeermiddelen herhaald worden. De spaarzame eetregel blijve tot ligt verteerbare, niet prikkelende voedfels bepaald. Het verblijf op het land dient tot natuur en duurzaammaking der genezing.

JONATHAN GREEN slaagde in de genezing van een zeer hardnekkig geval van *Eczema chronicum*, dat jaren lang aan alle geneeskundige pogingen tegenstand geboden had. De behandeling werd aangevangen met aderlatingen, bloedzuigers, warme baden en pappen uit wittebrood met *aqua gouldardi* op de aangedane deelen. Vervolgens dit lakfeermiddel gegeven.

R. *Extracti colocynthidis comper.* gr. x.

Pulver. Scammonii

Sapon. Venet ana gr. V

Syrupi rhamni q. s.

ut. f. *pilulae.* N. iv.

S. Des avonds bij het naar bed gaan in te nemen.

Daarna moest de lijderes des morgens en des avonds drie lepels van de volgende mixtuur nemen:

R. *Infusion. rad. Caryophyl.* unc. xii.

Tincturae Humuli unc. i.

Tartratrie potassae unc. i.

Tinct. Sennae. unc. β.

misce.

Uitwendig werden de zwavelberookingen in het werk gesteld, en de meest lijdende deelen met *ceratum saturni* gesmeerd.

Behandeling
van het ecze-
ma chroni-
cum locale.

Wanneer hetzelfde tot een klein gedeelte der huid bepaald blijft, slaagt men menigwerf in de genezing door enkel plaatselijk aangewende smeersels; zamengesteld uit ééne once ongezouten versche boter of reuzel en ééne drachma *mercurius praecipitatus albus* of *flores zinci*; somwijlen zelfs met inwrijvingen van kaarsongel.

Behandeling van het schubachtige hitteuitslag. (eczema furfuraceum). In dezen vorm, vooral op den rug der handen voorkomende, zijn de kwikbereidingen de krachtigste geneesmiddelen. Vooraf echter moet men zich wel overtuigd hebben, dat men met geen *eczema mercuriale* te doen heeft. Door BIETT en anderen worden de volgende voorschriften voornamelijk aangeprezen:

R. *Proto-Nitrat. Hydrargyri.* scr. i. dr. β.
axungiae porci. unc. i.
S.

R. *Proto-jodureti Hydrarg.* scr. i.
axung. porci. unc. i.
S.

R. *Deuto jodureti Hydrargyr.* gr. x—xii.
axung. porci. unc. i.
S.

Om op de met uitslag bezette huiddeelen in te wrijven.

Om de jeukte te matigen, kan tot ieder der ge-
gevene voorschriften 12 greinen kamfer worden
toegevoegd. Ook van waschingen met eene op-
lossing van *mercurius sublimatus corrosiv.*, één
grein op twee oncen rozenwater, heb ik mij me-
nig-

nigwerf met het beste gevolg bediend. Inwendig zijn de kwikmiddelen nutteloos en schadelijk, met uitzondering van die gevallen, waarin het *eczema* eenen venerifchen oorsprong heeft, of eene venerifche complicatie aanwezig is.

II. *Herpes*. Haarworm.

Aan een zeer groot getal van zeer verfchillende, zoowel ligte als hardnekkige huidziekten hebben de geneeskundigen van vroegeren en van lateren tijd, onder deze voornamelijk ALIBERT, den naam van *Herpes* gegeven: vele derzelven werden tot andere geflachten en foorten gebragt. Hierdoor ontstaat eene niet geringe moeilijkheid om met juistheid vast te ftellen, welke ziekten tot de Herpetifche behooren, en aan te wijzen, welke huidziekten de onderfcheidene fchrijvers onder den naam van *Herpes* bedoelen. ROB. WILLAN heeft deze moeilijkheden uit den weg geruimd, door den naam van *Herpes* tot een door blaasjes gekenschetst, niet zeer belangrijk geflacht van huidziekten te beperken, en de andere, onder dien naam voorkomende, naar aanleiding der gedaanten des uitflags tot hunne natuurlijke klasfen, orden en geflachten te brengen.

Op eene meer of min ontftokene oppervlakte van Bepaling, eenig huiddeel, grijpt de uitbotting van kleine, halfkogelvormige blaasjes plaats, die de grootte van een half hennipzaadje tot die van eene halve erwt hebben en een helder vocht bevatten. De blaasjes, die in fcherp afgeperkte hoopen of groe-

pen druiventrosvormig bij elkander staan, vormen onregelmatig kringvormige plekken, van elkander afgescheiden door grootere of kleinere tusschenruimten van gezonde huiddeelen. De blaasjes worden allengskens grooter, ondoorschijnend en eindigen door opdrooging in kleine zemelachtige roven of schilfers, binnen den tijd van 10 tot 21 dagen. De uitbotting gaat gewoonlijk met pijnlijke jeukte en kriebel gepaard, in meer zeldzaam voorkomende gevallen met diep zittende pijn in de lijdende deelen, die eerst met den afloop der ziekte verdwijnt.

Algemeene ziekteverschijnselen worden somwijlen, echter niet dikwijls waargenomen. De voorkomende bestaan in een kwalijk-bevinden, waaraan de lijder geen naam weet te geven, gepaard met gevoel van zwakte, gebrek aan eetlust en bedorvene spijsvertering zonder koorts. Alleen als toevallige complicatiën kunnen koortsaanvallen plaats hebben: tot het wezen der ziekte behooren dezelve niet.

De oorzaken bestaan of in uitwendige bekende schadelijkheden of in onbekende in de bewerktuiging verborgene gesteldheden. In beide gevallen grijpt eene eigendommelijke wederwerking in de algemeene bekleedselen plaats, waardoor de herpetische uitslag wordt voortgebracht.

De *Herpes* kan ook gelijktijdig met andere huidziekten verbonden voorkomen; de pleksgewijze opheoping der blaasjes op een ontstoken veld, maakt het echter ook in zoodanige gevallen gemakkelijk genoeg, de *Herpes* van eene andere, gelijktijdig

aan-

aanwezige huidziekte te onderkennen. De zetel, de gedaante en de kleur hebben aanleiding gegeven van de onderhavige ziekte als soorten aan te nemen:

I. *Herpes phlyctenodes*. De blaasvormige haarworm.

Nadat, gedurende eenige uren, een gevoel van flekende, brandende hitte en jeukte vooraf zijn gegaan, volgt eene uitbotting van kleine roode punten, die na verloop van eenige uren eene samenhangende roode vlek vormen. Allengskens verheffen zich harde blaasjes ter grootte van een half hennipzaadje tot die van eene halve erwt. Somwijlen komt slechts ééne, meerendeels verscheidene plekken gelijktijdig te voorschijn. Ieder derzelven is door eenen ontstokenen ring omgeven. De halfkogelvormige blaasjes zijn eerst helder en doorschijnend, maar worden spoedig melkachtig wit. Tusschen den derden en vijfden dag beginnen dezelve te rimpelen, en verdroogen binnen zeven of acht dagen tot dunne, bruine, schilferachtige roven; na verloop van eenige dagen vallen deze af, en laten roode, pijnlijke vlekken achter, die eerst na eenig tijdsverloop de natuurlijke kleur der huid terug erlangen. Eenige blaasjes gaan wel eens in oppervlakkige huidzweertjes over, bedekken zich met dikkere, bruine roven, die eerst na een langer tijdsverloop afvallen.

De blaasvormige haarworm is of eene geheel plaatfelijke, tot een enkel huiddeel beperkte ziek-

te, of meer algemeen over het ligchaam verbreid; namelijk, er komen gelijktijdig op meer dan op eene plaats pleksgewijze uitbottingen tot stand, of bij herhaling met tusfchenruimten van eenige dagen tot weken, en maken het beloop der ziekte langdurig. De met blaasjes bezette vlekken hebben alsdan den omtrek van eenen gulden tot dien eener handpalm, gaan met ontstekingstoevallen en koorts, ten gevolge der algemeene ziekelijke gesteldheid der bewerktuiging gepaard, waarvan de uitflag eene onvolkomene crisis uitmaakt; want de algemeene toevallen houden met de eerste uitbotting niet geheel op; de nachten blijven slapeloos, de jeukte, pijn en hitte duren voort, vermeerderen door de warmte in het bed en door iedere andere verwarming, verheffen zich vóór, en verminderen met iedere herhaalde uitbotting.

Jonge lieden zijn meer dan bejaarde aan den blaasvormigen haarworm onderworpen. Het voorhoofd, de ooren, de wangen, de neus, de hals, de borst en de armen zijn de gewone, de andere ligchaamsdeelen de meer zeldzame zitplaatsen van dit uitflag.

De voorbeschikkende, zoowel als de toevallige oorzaken zijn meerendeels duister en verborgen. Eene onregelmatige leefwijze, misbruik van geestrijke dranken, gastrische ophooping en aandoeeningen der buksingewanden, nederdrukkende gemoedsaandoeningen gaan vaak dezen uitflag vooraf, en fchijnen derhalve niet zonder invloed op deszelfs ontwikkeling te zijn.

De

De blaasvormige haarworm vertegenwoordigt den grondvorm der *Herpes*; de verscheidenheden, die de soorten opleveren, zijn slechts toevallige afwijkingen.

Deze niet belangrijke en met geen gevaar ver-Behandeling. bondene ziekte, vordert zelden eene werkdadige geneeskundige behandeling, maar veeleer eenen goeden, eenvoudigen leefregel, verdunnende zuurachtige dranken; bij gastrische ophooping en braakmiddel en verkoelende lakseermiddelen, uit *cremor tartari* en *flores sulphuris*, om gelijktijdig den bloedsomloop in de buksingewanden vrij te maken en op de huid te werken. Eene algemeene verbreiding des uitlags met ontwikkelde ontstekingstoevallen verbonden, kan algemeene en plaatselijke bloedontlastingen noodig maken. Om de jeukte en pijn te matigen, zijn stovingen met verzachtende vloeistoffen en warme baden dienstig. In langdurige gevallen heb ik steeds met het beste gevolg den uitslag, eenige keeren dagelijks, met *Ung. Neapolitanum* en *flores zinci* laten bestrijken. De plaatselijke toevallen worden daardoor spoedig tot bedaren gebragt en de genezing bevorderd.

II. *Herpes Labialis*. De Haarworm der Lippen.

De blaasvormige haarworm tot de lippen en derzelver omtrek beperkt, draagt dezen naam. Een pijnlijk brandend gevoel, voornamelijk ter plaatse, waar derzelver rood in de gewone kleur der huid

overgaat, met spanning en eene geringe glinsterende zwelling van het lijdende deel, gaan der uitbottiging eenige uren vooraf. Deze bestaat in kleine doorschijnende blaasjes, welke door ineenvloeiing de grootte eener halve erwt tot die van een' stui-ver kunnen erlangen. De eerst heldere, doorschijnende, in de blaasjes bevatte vloeistof wordt spoedig wit en troebel, vervolgens geel-etterachtig en verdroogt binnen vier tot zes dagen tot dunne, bruine, tamelijk vaste roven, welke na acht tot tien dagen los worden, afvallen en roode, gladde, glinsterende vlekken terug laren. Ontijdig afgestooten, of afgewreven, ontstaan er oppervlakkige, pijnlijke zweertjes en kloven, die eenigen tijd, tot niet geringen last voor den lijder, voortduren.

De gewone oorzaken van dezen uitslag zijn koude noord- en oostelijke winden, bij lieden, die eene teedere huid hebben en aan de vrije lucht niet gewend zijn; prikkelende spijsen en dranken, catharrale aandoeningen en koortsen. In het beloop der tuschenpoozende koortsen komt deze uitslag wel het menigvuldigst voor, en heeft meerendeels eene critische geaardheid.

Behandeling. Deze naauwelijks den naam eener ziekte verdienende uitlag vordert geene bijzondere behandeling. Men beschutte de lijdende deelen tegen de uitwendige schadelijke invloeden; bevochtige dezelve van tijd tot tijd met koud water om de jeukte en pijn te matigen; in het tijdperk der opdrooging bestrijke men dezelve met een mengsel uit zoeten room met krijt, of amandelolie en *flores zinci*, om de spanning

ning en barheid der lippen weg te nemen en de genezing te bespoedigen.

Behalve deze, komt er nog een uitslag aan de onderlip voor, die den naam van slependen haarworm verdient. Op de bovenste en voorste oppervlakte in het midden of eenigzins ter zijde, ontstaat een langwerpig doorschijnend blaasje, dat binnen weinige dagen tot eene bruine, dunne, zeer vastzittende roof verdroogt, die langdurig zitten blijft, en afvallend eene ontvelde oppervlakte terug laat, welke zich telkens weder met eene bruine roof bedekt, maanden en jaren op die wijze voortduurt, van zelve niet geneest en eene meer kunstige behandeling vordert. Daar dit gebrek bijna uitsluitend bij mannen van middelbaren en gevorderden leeftijd voorkomt, wordt het veelal aan het rooken uit uitgebrande, op de lippen klevende pijpen toegeschreven. Daar het echter ook bij lieden, die niet rooken voorkomt, en voortduurt nadat de lijders zich van rooken onthouden, zoo kan dit de oorzaak niet zijn; alhoewel ik erkennen moet, geene bepaalde oorzaken van dit gebrek te kennen.

De behandeling is bij anders gezonde lieden geheel plaatselijk, maar vordert inwendig het gebruik van kwik- en spiesglasbereidingen, met scheerling-extract, waar gelijktijdig scrophuleuze aandoeningen bestaan; kwikmiddelen bij voorafgegane venerische ziekten. Plaatselijk laat ik door pap uit kruim van wittebrood de korsten losmaken, en afgevallen zijnde, de ontvelde plek met zeezoutzuur of

of *lapis infernalis*, wanneer er eene ligte sponsige verheffing der lijdende oppervlakte plaats grijpt, bestrijken. Gewoonlijk slaagt men op deze wijze in de genezing, wanneer de lijder het noodige geduld heeft, en de geneesheer met volharding te werk gaat.

III. *Herpes praeputialis, genitalium*. De Haarworm der voorhuid en teeldeelen.

Aan de buitenste of binnenste oppervlakte der voorhuid bij mannen (nimmer op het hoofd der roede), en op de binnenste oppervlakte der groote en kleine lippen bij vrouwen, alhoewel zeldzamer dan bij mannen, ontwikkelen zich een of meer jeukende vlekjes van eenen kleinen omtrek, die spoedig in doorschijnende blaasjes overgaan, eenige dagen staan blijven, vervolgens bersten en met fijne schilfers opdroogen, afvallen en roode vlekjes achterlaten, die na eenige dagen verdwijnen. Gewoonlijk wordt de uitbotting door een prikkelend gevoel in het hoofd der roede en pijnlijkheid in het voorste gedeelte der pisbuis bij de waterlozing voorafgegaan; jeukte vergezelt de uitbotting, en brandende stekingen het opdroogen. Volwasfenen worden er uitfluitend door aangetast. De oorzaken zijn onzeker: scrophuleuze en aan aambeijen lijdenden, schijnen eene groote voorgeschiedheid te bezitten. Waar deze aanwezig zijn, kunnen onreinheid en scherpe vloeijingen uit de *urethra* en verzamelde afscheidingen tusschen het roedehoofd en de

de voorhuid opwekkende oorzaken opleveren. BATEMAN zegt, de oorzaken der *Herpes praeputialis* niet te kennen en geenszins met PEARSON overeen te stemmen, die dezelve in het gebruik van kwik meent gevonden te hebben.

Het is eene ligte, spoedig verloopende ziekte. Zij duurt zelden langer dan acht of tien dagen, maar keert gewoonlijk, zonder bekende oorzaken, van tijd tot tijd terug. Volgens BIETT kan dezelve in enkele gevallen slepend en zeer langdurig worden.

Uit hoofde van de mogelijke verwisfeling met venerifche ontvellingen en zweren, vordert deze ligte ziekte oplettendheid en een naauwkeurig onderzoek. Het blaasvormige des uitflags, afwezigheid van verettering, de ontbrekende fpekachtige randen der venerifche zweren, de spoedige ontwikkeling der blaasjes, die na den derden dag niet grooter worden, flets uitzien en spoedig verdroogen, terwijl er geene gelegenheid tot venerifche befmetting voorafging, — beveiligen tegen misgrepen in de kennis der ziekte. Sedert verfcheidene jaren ken ik eenen lijder met *Herpes praeputialis*, die jaarlijks twee- of meermalen terug keert, en altijd eene en dezelfde plaats aan de linkerzijde der binnenfte oppervlakte van de voorhuid inneemt, waar de lijder, voor meer dan dertig jaren, een' ligten chancker gehad heeft. Toen de lijder het gebrek voor den eerften keer ontdekte, hield hij hetzelfde voor venerifch, en wel voor het opbreken van den vorigen chancker, daar hij zich aan geene venerifche befmetting had blootgefteld; na eenige dagen zoet kwik gebruikt

bruikt te hebben, was het blaasje genezen. Dan daar hetzelfde na verloop van een half jaar terug keerde, en toen mijn oordeel gevraagd werd, verklaarde ik het voor *Herpes praeputalis*, beval reinheid en het bestrijken met een weinig kaarsvet des avonds. De genezing volgde spoedig. Bij iederen volgenden terugkeer bediende de lijder zich van hetzelfde middel, en altijd met den besten uitslag. De lijder geniet overigens de beste gezondheid, heeft gezonde kinderen, en is nu sedert meer dan één jaar van zijn gebrek verschoond gebleven.

De behandeling bepaalt zich tot reinheid van de lijdende deelen, door waschingen met laauw water of afkookfels van althea-wortel of lijnzaad. Daarna bestrijke men de blaasjes met althea-zalf of kaarsvet. Inwendig zijn geene geneesmiddelen noodig.

De lijder mijde scherpe en sterk gekruide spijzen, insgelijks gegiste en geestrijke dranken; terwijl gerstewater met citroensap of limonade tot drank worden aanbevolen.

IV. *Herpes zoster*.

(Onder den naam van *gordelroos* reeds afgehandeld: in het II Deel. 2 Afd. 1 Stuk. pag. 104).

V. *Herpes Circinatus*. De kringsgewijze haarworm. Ringworm.

Ringvormig bij elkander staande blaasjes met eene vrije plek in het midden, door eenen rooden kring, die zich verder dan de blaasjes uitstrekt, omgeven.

Op

Op ééne of op meer plaatfen komen roode kring- Beloop. of eironde vlekken van $\frac{1}{2}$ tot 2 duimen middellijn te voorschijn. Het middelpunt der kleine vlekken is minder hoog van kleur dan de omtrek, terwijl bij de groote in het midden de huid hare natuurlijke kleur behoudt. Op de hooger gekleurde kringen, die de vlekken omgeven, grijpt spoedig de uitbotting van kleine half-kogelvormige, dicht ineengedrongene, fomwijlen ineenvloeiende blaasjes plaats. Deze, die eerst helder en doorschijnend zijn, worden spoedig troebel, bersten en ontlasten de bevatte vochten, die spoedig tot dunne, schubachtige, bruine plaatjes opdroogen; deze afgevallen zijnde, blijft er eene roode, langzaam verdwijnende vlek terug. Wanneer de blaasjes zonder te bersten, door opflorping der bevatte vochten verdroogen, dan grijpt er alleen afschilfering der opperhuid plaats. Het geheele beloop der ziekte gaat met pijnlijke steking en een brandend gevoel gepaard, zonder aanmerkelijke verhooging van de huidwarmte der aangedane deelen.

De duur dezer ziekte is gewoonlijk van acht tot tien dagen, wanneer de uitbotting in eens gelijktijdig plaats heeft, de vlekken geene groote uitgebreidheid hebben en niet talrijk zijn. Wanneer het tegendeel plaats heeft, dan verloopen er drie en meer weken, alvorens de genezing tot stand komt. In de heete gewesten der aarde bestaat deze ziekte in eene gewijzigde gedaante, die zich door langdurigheid en belangrijkheid onderscheidt. Er grijpen telkens op nieuw uitbottingen plaats, de vlekken
zijn

zijn grooter en gaan in langdurige zweren over. Tot zetel kunnen alle deelen der huid verftrekken; het menigvuldigst echter ziet men dezelve in het aangezigt, aan den hals, op de borst, de fchou- ders en de armen. Bij jongelingen en meisjes komt fomwijlen niet meer dan ééne vlek, ter grootte van een vijffstuivers-ftukje, op de wangen of de kin te voorfchijn.

Oorzaken. Kinderen, jonge lieden en vrouwen, die eene witte, doorschijnende, zeer teedere en weeke huid hebben, zijn meer dan andere lieden aan den ring- worm onderhevig. Ook komt hij menigvuldiger in de heete dan in de koude gewesten voor. Aan- gaande de opwekkende oorzaken beweert men, dat koude, die bepaald op een bepaald ligchaamsdeel inwerkt, fcherpe waschwaters en andere prikke- lende ftoffen, bij den beftaanden aanleg, dezen uitflag kunnen opwekken. Meer dan uit deze uit- wendige fchadelijkheden, fchijnt dezelve uit inwen- dige, alhoewel onbekende oorzaken te ontftaan, vooral in die gevallen, waarin door herhaalde uit- botting de ziekte langdurig en fleepend wordt. Bij kinderen heeft men de *Herpes circinatus* wel eens voor befmettend gehouden. BATEMAN trekt zulks in twijfel, en fchrijft het aan algemeene invloeden toe, wanneer kinderen, die ééne en dezelfde fchool bezoeken, of tot ééne familie behooren, gelijktij- dig of achtereenvolgend aangetast worden.

Onderschei- dingsteeke- nen.

Het blaasvormige des uitlags, de kringen, die de vlekken omgeven en het vrije middelpunt onder- fcheiden dezen uitflag zeer kennelijk van alle ande-

re huidziekten. Alleen met het schildvormige hoofd-
zeer (*porrigo scutulata*) waaraan in navolging der
Engelfchen insgelijks den naam van Ringworm ge-
geven wordt, zoude er, wegens den naam, eene
verwifeling kunnen plaats grijpen. Daar deze
echter tot de natrofige huidziekten behoort, en
uitfluitend het behaarde hoofd en het voorhoofd
tot zetel heeft, is deze verwifeling, wat het we-
zen der ziekte betreft, niet wel mogelijk.

Daar de ringvormige haarworm, in zijne eenvou- Behandeling.
digfte gedaante, binnen een zeker tijdsverloop door
de natuur alleen genezen wordt, en wij den weg
niet kennen, om de genezing door de kunst te be-
fpoedigen, zoo blijft het raadzaam, de behandeling
tot die uitwendige middelen te beperken, welke de
toevallen matigen, zonder den gang der natuur te
ftoren. Om de jeukte en hitte te matigen, zijn
wasfchingen met koud water en oplosfingen van
koolzurige loogzouten of zwavelzure zink, eene
drachma op ééne pint fchoon water, dienftig. Ligt
prikkelende en zamentrekkende middelen, als op-
losfingen van borax en aluin, begunftigen de op-
drooging der blaasjes, en bedaren de jeukte en de
ftekingen in de meer gevorderde tijdperken der ziekte.

In de meer langdurige gevallen, veroorzaakt
door de zich telkens herhalende uitbottingen, en
waarin de uitflag eene groote uitgebreidheid heeft
verkregen, geve men van tijd tot tijd een verkoe-
lend lakfeermiddel, en bezige loogbaden. Ontdekt
men bijzondere oorzaken, dan trachte men dezelve
op eene doelmatige wijze op te ruimen. Als volks-

middelen zijn bij den ringworm des aangezigts de bevochtiging met het nuchtere speekfel des lijders, en, zoo men wil, niet zonder vrucht om de jeukte te matigen, alsmede het bestrijken der vlekken met inkt of, met oplosfingen van koper-, ijzer- en zinkzouten.

VI. *Herpes Iris*. De regenboog-vormige Haarworm.

Bepaling. Kleine, met blaasjes bedekte, in kringen van verschillende kleuren afgeperkte vlekken.

Beloop. Zonder algemeene ziekte-verschijnselen komen er kleine vlekken te voorschijn, om binnen den tijd van acht tot tien dagen de grootte van eenen gulden en hunne volkomene ontwikkeling te bereiken. Zoo- wel in het midden, als in den omtrek zijn de vlekken door blaasjes, met wei gevuld, bezet; de zwelling en spanning zijn gering. Na verloop van eenige dagen nemen de blaasjes in omvang af, en verdroogen na verloop van acht dagen geheel. Het blaasje, dat het middelpunt van de vlek maakt, heeft eene geheel witte kleur; de eerste, hetzelfde omgevende ring is donker of bruinrood, de tweede geel of vuil wit, de derde donkerblauw, de vierde bleekrood of rozenkleurig, welke laatste zich allengs in gewone kleur der huid verliest. Door deze schakering vertoont zich de vlek in haar geheel als eene veelkleurige kokarde.

WILLAN en BATEMAN hebben de *Herpes iris* het eerst van andere huidziekten onderscheiden en goed beschreven. De zeldzaamheid dezer ziekte mag wel de voornaamste oorzaak geweest zijn, waarom dezelve niet vroeger oplettendheid der geneeskundigen tot zich getrokken heeft. Binnen eene reeks van jaren kwam

de-

dezelve slechts drie of vier malen in het beroemde hospitaal *St. Louis* te *Parijs*, uitsluitend voor de behandeling van huidziekten ingerigt, voor.

De wei, in de blaasjes bevat, wodt gewoonlijk weder opgeslorpt en door eene ligte afschilfering der opperhuid gevolgd. Waar zulks geen plaats vindt, bersten de blaasjes, en de uitgestorte wei verdroogt tot dunne schubachtige roven, die spoedig afvallen. Somwijlen keert de uitslag na de opdrooging op dezelfde plekken terug en volgt hetzelfde beloop als de eerste uitbotting.

De *Herpes iris* kan op alle deelen des ligchaams voorkomen; het menigvuldigst komt dezelve in het aangezicht, aan den hals, op de handen, de vingers, op den rug des voets en aan de enklaauwen voor. Somwijlen gelijktijdig met *Herpes labialis*, hetzij ten gevolge van een oorzakelijk verband, of als toevallige complicatie.

Kinderen, het vrouwelijk geslacht, blonde en Oorzaken, die eene teedere huid hebben, schijnen meer dan andere voorwerpen aan deze ziekte onderhevig. De opwekkende oorzaken kennen wij niet. Volgens BATEMAN zag men *Herpes iris* in eenige gevallen na zware zinkingachtige aandoeningen met heescheid.

Deze ligte, weinig beteekenende ziekte vordert in haar gewoon beloop geene bijzondere behandeling; waar het noodig is, handele men op dezelfde wijze als bij de *Herpes circinatus*. Behandeling.

III. *Scabies*. *Schurft*.

Deze, door de vroegere geneeskundigen onder de puistige huidziekten gerangschikt, is door BIE TT,

volgens den grondvorm des uitflags, onder de blaasjes, waartoe zij behoort, gebragt. De oudere Latijnsche fchrijvers hebben onder den naam van *scabies* niet alleen de fchurft, maar ook vele andere jeukende huidziekten befchreven. Hetzelfde heeft plaats met de benaming *psora*, bij de Grieksche fchrijvers in gebruik. Onder de latere geneeskundigen zijn er, die *scabies* en *psora* als fynonimen befchouwen en gebruiken. In navolging der beste fchrijvers van lateren tijd, behouden wij den naam van *scabies*.

Bepaling. De fchurft is eene befmettelijke huidziekte, beftaande in kleine blaasjes van de grootte eener gierstkorrel tot eene halve erwt. De blaasjes ftaan afgezonderd, hebben eene harde, ligtrood gekleurde grondvlakte, met eene witte, doorschijnende punt. Zij gaan gepaard met hevige, echter niet onaangename jeukte. De doorgekrabde blaasjes verdroogen tot dunne affchilferende roofjes, of gaan in oppervlakkige zweertjes over.

Zetel. De geheele oppervlakte des ligchaams, met uitzondering van het aangezigt, kan door de fchurft worden ingenomen; zelden echter worden de handpalmen en de voetzolen, bij voorkeur de handwortel, de ruimte tufchen de vingers, de buiging van den elleboog en de kniegewrichten, de omtrek der enklaauwen, der gewrichten in het algemeen en de buigzijde der ledematen aangetast. Over de borst, den buik en den rug bereidt zich de uitflag eerst dan uit, wanneer de ziekte, door onverschilligheid der lijders, door onreinheid of eene

ondoelmatige behandeling, langdurig en algemeen geworden is. Het aangezicht, dat in alle gewone gevallen vrij blijft, kan, volgens waarnemingen van geloofwaardige geneeskundigen, in zeldzame gevallen besmet worden; dan namelijk, wanneer hetzelfde langdurig in aanraking gehouden wordt met kleedingstukken, die met smetstof beladen zijn, of wanneer het dikwijls in aanraking komt met lichaamsdeelen, die met schurftblaasjes overdekt zijn, zoo als dit met zuigelingen bij het zuigen het geval is.

De schurft is eene der meest voorkomende huidziekten; — bij ons behoort dezelve tot de meest algemeen verbreid van allen. Zonder onderscheid van jaren en geslacht, doch meer bij mannen dan bij vrouwen, vindt men deze ziekte in alle jaargetijden; menigvuldiger in het voor- en najaar dan in den winter, het menigvuldigst in den zomer; in de warme en heete gewesten meer algemeen dan in de koude, mits de uitwendige betrekkingen, waarin de menschen leven, gelijk staan. Alhoewel de schurft geen' stand verschoont, komt zij toch menigvuldiger bij behoeftige en in onreinheid levende lieden, bij de zoodanigen, die zich met geringe en slechte spijsen voeden, die onregelmatig leven, misbruik van sterke dranken maken en de noodige verwisseling van linnengoed ontberen, dan bij den volksstand, die onder meer gunstige betrekkingen leeft. De schurft ontstaat en plant zich alleen door besmetting voort. Één scabieuze kan aanleiding geven, dat duizend gezonde personen besmet wor-

den. Nimmer ontstaat zij uit algemeene oorzaken, en kan dien ten gevolge noch epidemisch, noch endemisch heerschen. Doch dezelve kan daar, waar vele menschen opgehoopt in eene bekrompene ruimte leven, waar tevens de noodige reinheid, gezond voedsel, doelmatigheid in de geneeskundige behandeling en verpleging ontbreken, in gevangenhuizen, op schepen, in kazernen en legerplaatsen eene staande ziekte (*morbus stationarius*) worden, en den schijn eener epidemische of endemische aannemen. In *Polen* en in *Bretagne* in *Frankrijk* heeft dit bij de geringe volksklasse werkelijk plaats. In *Lithauwen* vindt men, volgens ooggetuigen, weinige familiën, die van deze ziekte vrij zijn, noch gedurende hun leven er van bevrijd blijven. De ongelooflijke morfigheid van het landvolk in *Polen*, vooral bij de Joden, die in grooten getale dat land bewonen, hunne onverschilligheid omtrent deze ziekte, die zij tot instandhouding der gezondheid eerder voor heilzaam dan schadelijk houden, doet hun zelfs de gewone huismiddelen, bij alle andere volken in gebruik, versmaden.

De manschappen van armeën door eenen ongelukkigen veldtocht ontmoedigd, door zware marschen en slechte kwartieren afgemat, zijn gewoonlijk met schurft besmet, en verbreiden deze ziekte over alle gewesten, die zij doortrekken. In de jaren 1813—15 waren alle armeën besmet, en hebben de besmetting over de meeste landen van *Europa* verbreid. Ook na miasmatische epidemiën van tusfschenpoozende koortsen, komt de schurft in de

kazernen en hospitalen vaak algemeen verbreid voor. De verhoogde aandoenlijkheid der huid na die koortsen vergroot de vatbaarheid voor de besmetting, en verklaart de oorzaak der algemeene verbreiding dezer ziekte, beter dan de vooronderstelde critische *scabies*, aan welker uitbotting men de genezing der koorts wilde toeschrijven.

De uitbotting volgt niet onmiddellijk op de besmetting, en het verloop van tijd tusfchen beiden levert belangrijke verscheidenheden op. Bij kinderen bedraagt het van één tot zes dagen, bij volwasfenen van acht tot twaalf in het voorjaar en den zomer, van zestien tot twintig dagen in den winter, en bij hoogbejaarde lieden van twintig tot dertig. Bij gezonde, sterke, volbloedige, tot ontsteking voorgeschiedte personen, bij het bloedrijke en galachtige temperament volgt de uitbotting op de besmetting spoediger dan bij zwakke en ziekelijke lieden en bij het melancholische en phlegmatifche temperament. De meerdere of mindere vastheid van weeffel, de hooger of lager gestemde prikkelbaarheid en gevoeligheid, waardoor de huid spoediger of langzamer die uitwendige prikkels opneemt en daarop terug werkt, fchijnen de oorzaken te zijn, waarom de uitbotting vroeger of later op de plaats gehad hebbende besmetting volgt. De daadzaak, dat lieden, welke door inwendige ontstekingen of andere ziekten zijn aangetast, zóó lang van de uitbotting vrij blijven, tot dat die ziekten zijn opgeruimd, pleit voor het gestelde.

De eerste uitbotting heeft op die deelen plaats,

welke eene fijne en weeke opperhuid hebben, en ruim met weivaten bedeed zijn, alsmede tusfchen de vingers en de buiging der gewrichten. De amachten en de beroepsbezigheden, zoowel als de offen, die verwerkt worden, geven tot eenige afwijking aanleiding. Bij fmeden, koperflagers, flotemakers, verwers en bij alle personen, welke door hunnen arbeid eene harde en vereelte opperhuid aan de handen hebben, grijpt de eerfte uitbotting niet aan de handen en tusfchen de vingers, maar op andere deelen, op de binnenvlakte van den voorarm en de knieholte plaats. Bij kleermakers, naaifters, beddemakers en bij alle arbeidslieden, die ftoffen hanteren, welke de fmetstof ligt opnemen en lang bewaren, zijn het altijd de handen, die het eerst aangetast worden. Bij mannen wordt in het algemeen de regterhand vroeger dan de linker met uitflag bedekt, ten gevolge der bij ons algemeen aangenomene gewoonte, elkander door het geven der regterhand te begroeten.

Beloop en
toevallen.

Op de plaats, waar de befmetting heeft plaats gehad, ontftaat eerst jeukte, die des avonds en des nachts bij het warm worden in het bed toeneemt: het hevigst na het gebruik van geestrijke dranken, gerookte, gezouten en fterk gekruide fpijzen. Spoedig ontwikkelen zich kleine, harde, naauwelijks voelbare peukeltjes, die na een kort tijdsverloop tot blaasjes overgaan, welke, gedurende de eerfte dagen der uitbotting enkel, en van elkander afgezonderd ftaan; vervolgens worden dezelve grooter, hun getal vermeerdert en zij breiden

den zich meer en meer eerst over de ledematen en vervolgens over de andere deelen des ligchaams uit. Bij gezonde, volbloedige en jonge lieden komen de blaasjes spoediger tot rijpheid dan bij zwakke, ziekelijke en oude personen. De grondvlakte der puntig verhevene, met een helder, doorschijnend, kleverig vocht gevulde blaasjes is alsdan ligt ontstoken en heeft eene rozenroode kleur. De uitslag kan over de geheele oppervlakte des ligchaams algemeen verbreid zijn, of tot enkele deelen bepaald blijven, en somwijlen slechts met enkele blaasjes tusfchen de vingers en de binnenzijde van het handgewricht te voorschijn komen. Meerendeels, echter niet altijd, is de hevigheid der jeukte aan het getal der fchurftblaasjes geëvenredigd. Zij is doorgaans het zwaarst bij lieden, die eene teedere en zeer gevoelige huid hebben, echter niet pijnlijk, in den beginne meer aangenaam, J. P. FRANK zegt: met eene wellustige gewaarwording verbonden. Door het gedurig krabben worden de blaasjes spoedig opengescheurd, en de daarin bevatte vochten uitgestort, welke tot dunne fchilferachtige roofjes verdroogen, doormengd met vele, kleine, zwarte, aan de randen ontstokene stippen. Alhoewel de huidontsteking in het gewone beloop van de fchurft niet groot is, zoo kan dezelve toch bij jonge, volbloedige lieden door fouten in den leefregel en andere bijkomende fchadelijkheden tot eene hooger trap worden opgevoerd, en aanleiding geven tot complicatiën met *eczema* en *impetigo*.

De fchurft veroorzaakt nimmer, zelfs bij de

grootste uitbreiding, die gevaarlijke toevallen, welke men, wanneer zij spoedig genezen werd, vroeger algemeen daaraan toefschreef, en ook nu nog door onderscheidene geneesheeren daaraan toegeschreven worden. Want de inwendige ontstekingen, beroerten, aamborstigheid, tering, waterzucht, vallende ziekte, enz., welke aan het terug treden van de schurft toefschrijft, zijn niet anders dan toevallige complicatiën, welke ten allen tijde kunnen worden voorkomen, en met de voorafgegane schurft in geen noodzakelijk verband staan.

Oorzaken. De jeugd, het bloedrijke temperament, het mannelijk geslacht, de werklieden in wollen stoffen, het voorjaar, de zomer, de warme en heete gewesten begunstigen de mededeeling en uitbreiding der *scabies*, en kunnen betrekkelijke voorbeschikkende oorzaken genoemd worden.

Dat zoo vele kinderen en jonge lieden door deze huidziekte aangetast worden, meent BIETT alleen gegrond te zijn in het groot aantal voorwerpen in die leeftijden. Dat er meer mannen dan vrouwen door lijden, is aan den aard der werkzaamheden en het meerdere verkeer in de maatschappij toe te schrijven. Ten aanzien van het temperament zal men, naar aanleiding der nationale en landeigene verscheidenheden der ingezetenen, bevinden: dat de meeste lieden van het heerschende temperament, gelijk dit natuurlijk niet anders zijn kan, aangetast worden.

De voorgeschiedtheid is minder ontwikkeld bij bakkers, molenaars, meelverkoopers, grutters;
bij

bij lieden, die in branderijen en stokerijen van geestrijke dranken arbeiden; bij koetsiers, stalknechts en personen, die veel met paarden omgaan. Dat geneesheeren, die de scabieuzen in de hospitalen behandelen, — de oppassers en alle die lieden, welke zich voortdurend in de ziekenzalen ophouden, zelden of nimmer door de schurft besmet worden, mag niet in de mindere voorgeschiedtheid dier lieden, maar moet veeleer in den dampkring, waarin zij ademen en leven en die met zwaveldampen beladen is, gezocht worden.

Deze heeft haar bestaan in eene eigenaardige smetstof, die tot de meest vaste behoort. Onoplosbaar in den dampkring, kan dezelve op eenigen afstand niet worden overgeplant, maar alleen door onmiddellijke aanraking van schurftlijders, van kleedingsstukken en andere met smetstof beladen stoffen van de eene op de andere personen overgebracht worden. Aangaande de natuur en de scheikundige bestanddeelen en hoedanigheden verkeerren wij ten aanzien van deze in dezelfde onwetendheid, waarin wij ons ten aanzien van andere smetstoffen bevinden. Dat dezelve van eene zure, loogzoutachtige, scherpe of gistende hoedanigheid wezen zoude, zijn altemaal hypothesen, zonder nut en zonder waarde.

Naaste oorzaak.

Meer belangstelling verdient de aanwezigheid van een infekt in de schurftblaasjes (*acarus exulcerans*, *sarcoptus scabiei*). De twist over het al of niet bestaan dezer infekten is nog niet beslist. Het schurft-infekt is het eerst door AVENZOAR, later door

door INGRASSIAS en JOUBERT en na deze door MOUFET uitvoerig beschreven, door HAUPTMAN naar de natuur afgebeeld, eindelijk heeft FRANS REDI in de 17e eeuw deszelfs ontwikkeling en de wijze hoe het deschurftblaasjes voortbrengt, naauwkeurig onderzocht en beschreven. LINNEUS, DE GEER, FABRICIUS en LATRELLE hebben hetzelfde natuurkundig onderzocht en in de natuurlijke historie eene plaats aangewezen. Onaangezien alle deze, zoo veel gezag voor zich hebbende bewijzen voor het bestaan van het schurft-insekt of de schurftmijt, bleven nog altijd vele geneeskundigen deszelfs bestaan in twijfel trekken. In het jaaa 1812 hervatte GALES, voormalig apotheker in het hospitaal *St. Louis* te *Parijs* het onderzoek, en slaagde daarmede naar zijne verzekering zoo volkomen, dat het bestaan der schurftmijt eene bewezen zaak scheen te zijn. In het bijzijn van beroemde mannen, onderzocht GALES meer dan 300 mijten, toonde hare paring, het eijerleggen en de geheele voortteling aan: deze resultaten zijner nasporingen golden voor voldoende bewijzen, en naauwelijks durfde men het wagen, het bestaan der schurftmijt meer in twijfel te trekken. Men herhaalde intusschen het onderzoek van GALES in *Frankrijk*, *Engeland* en *Duitschland*, en, zonderling! men verkreeg tegenstrijdige uitkomsten. De beroemde ALIBERT, BATEMAN, BIETT en NEUMAN konden bij alle mogelijke naauwkeurigheid, bij hun onderzoek in acht genomen, en er niet in slagen, om de gezochte infekten te vinden. BIETT zegt:

zegt: aan het bestaan der schurftmijt geen geloof te hechten, zonder daarom anderen te willen logenstraffen; maar het daarvoor te houden, dat men meerendeels de luisziekte met *scabies* verwisfelde; dat ook het geval, door MORGAGNI verhaald, hiertoe behoord heeft. JONATH. GREEN houdt het mede daarvoor, dat de afgebeelde *acarus* en *sarcoptus scabiei* niet anders dan verdwaalde luizen of kaasmijten geweest zijn. Hij voegt er echter bij: nieuwe nasporingen schijnen evenwel het bestaan van den *acarus* buiten twijfel te stellen. Ook ALIBERT, die door de ontkennende uitkomsten, welke het onderzoek, dat hij door een' bekwaam' man in het jaar 1813 in het werk had doen stellen, heeft opgeleverd, het bestaan der schurftmijt ontkende, is later van gevoelen veranderd.

Onder de menigte schrijvers hebben KRUGER, RASPAIL, HANSSEN en EMERY het bestaan der schurftmijt in bescherming genomen. Intusschen blijft dit verschil onbeslist: aan beide zijden staan beoemde en geloofwaardige mannen; doch welke der twistende partijen de misleide is, zullen verdere nasporingen moeten aanwijzen. De praktische geneesheer kan dit gerust afwachten, daar het bestaan of niet bestaan der mijt voor de behandeling en genezing der schurft van weinig of geen belang mag beschouwd worden.

Alhoewel de schurft door den praktisch geoefen-Kenteekenen de ligt te kennen en te onderscheiden is, kan de-^{(Diagnosis).} zelve toch met eenige niet besmettelijke huidziekten verwisfeld worden. Het is vaak voor den lijder

der en geneesheer van belang niet te dwalen; ongunstige beoordeelingen en nadeelige gevolgen kunnen voor beiden daaruit geboren worden. Door de ziekte te miskennen, stelt men geheele familiën aan de besmetting bloot en veroorzaakt de algemeene verbreiding.

Onderseheidingssteekenen.

a.) De huidjeukte (*Prurigo*) is het voornamelijk, die menigwerf met schurft verwisseld wordt.

De *prurigo* behoort tot de peukels en niet tot de blaasjes, is niet besmettelijk en de haar vergezellende jeukte is brandend en bijtend. De rug, de schouders en de uitstrekzijde der ledematen zijn de voornaamste zitplaatsen der *prurigo*. Hare peukels, opengekrabt zijnde, ontlasten een fijn druppeltje bloed, dat op de punt der peukels tot eene kleine zwarte stip opdroogt.

b.) Eenvoudig huidmos (*lichen simplex*). De peukels, waaruit deze uitslag bestaat, behouden de natuurlijke kleur der huid en bevinden zich dicht bij elkander opgehoopt; de jeukte is minder hevig en niet pijnlijk. Deze uitslag is niet besmettelijk, en komt bijna alleen op de uitstreksels der ledematen en op den rug der hand voor.

c.) *Lichen urticans*. De netelzucht-aardige huidmos. De peukels zijn grooter, breeder en zijn meermalen in het aangezicht en aan den hals, dan op andere deelen aanwezig. Dezelve zijn buldig, even als de netelroos en de porselein-uitslag, ontstoken en verdwijnen spoedig.

d.) *Eczema simplex* (zie pag. 13).

e.) Complicatiën met andere huidziekten kunnen plaats

plaats hebben, wanneer jonge, gezonde, volbloedige, zeer prikkelbare personen door de schurft worden aangetast. Ter plaatse, waar de schurftblaasjes in grooten getale opgehoopt bij elkander staan, ziet men alsdan natrovig uitflag (*impetigo*) en etterpuisten (*ecthyma*) te voorschijn treden. Fouten in den leefregel, het hevige schuren en krabben en andere toevallige schadelijkheden kunnen de ontstekings der huid tot eenen zoo hoogen trap opvoeren, dat zij zich aan het celweeffel mededeelt en tot bloed- en andere langdurige zweren (*ulcera scabiosa*) aanleiding geeft. Onder deze omstandigheden ziet men somwijlen gelijktijdig schurftblaasjes, natrovig uitflag, etterpuisten, bloed- en andere zweren van verschillende grootte, het geheele ligchaam overdekken.

Complicatiën met ontsteking der ingewanden komen bij de *scabies* somwijlen als toevallige ziekten voor, en zijn evenmin als de ontstekingen van het slijmvlies der maag, van de darmen of van eenig ander deel aan de gelijktijdig opdroogende schurft toe te schrijven; want de onderdrukte wederwerking der huid is een antagonistisch gevolg der plaats gehad hebbende ontstekingen.

Bij aandoenlijke gestellen stoort de jeukte, hevig zijnde, de noodige rust en den slaap des lijders; het aangezicht wordt bleek en neemt eene ziekelijke kleur aan; de eetlust gaat verloren, de voeding heeft niet naar behooren plaats, al de reproductieve verrigtingen geraken in eenen kwijnenden toestand; en verklaren beter de ziekelijkheid, waartoe langdu-

durige schurftlijders ten laatste vervallen, dan de vroeger vooronderstelde opneming der schurft-smetstof in het bloed.

Bij de schurft zijn complicatiën met de *syphilis*, de krop-klierziekten en de scheurbuik niet zelden, en oefenen wederkeerig een' meer of minder wijzigenden invloed op elkander uit. Bruine koperkleurige vlekken en ontaarding der schurftblaasjes in vuile, vretende zweren, grijpen bij de complicatie met *syphilis*, — zwellingen en verhardingen der watervaatklieren bij die met de krop-klierziekte plaats. Bij de scheurbuik worden de schurftblaasjes bleek, loodverwig of blaauw, ontlasten door bloed geverwde vochten en ontaarden ligtelijk in langdurige, scheurbuikige zweren. Tusschen de schurftblaasjes komen blaauwe vlekken en *petechiae* te voorschijn.

Verdeeling. Men heeft verschillende soorten van schurft aangenomen, en als zoodanige de peukelvormige (*scabies papuliformis*), de vochtige (*scabies lymphatica, humida*), de etterende (*scabies purulenta*) en de kwaadsappige (*scabies cachectica*) onderscheiden. Daar echter deze en meer andere voorkomende verdeelingen geene wezenlijke, maar slechts toevallige verscheidenheden opleveren, zoo is het genoeg, dezelve hier aangestipt te hebben, om bij de geneeskundige behandeling, waar het noodig is, de gevorderde wijzigingen in de toepassing der geneeswijze kenbaar te maken.

Voorzegging De schurft behoort tot de ligte, zonder gevaar
(Prognosis). verloopende huidziekten, maar vordert, om genezen

zen te worden , eene werkdadige en doelmatig ingerigte geneeskundige behandeling. Aan zich zelve overgelaten , geneest de fchurft niet , maar duurt maanden en jaren , ja door het geheele leven heen voort. Ook kan de genezing door plaats hebbende complicatiën met andere ziekten vertraagd worden. Door eene , naar aanleiding der omftandigheden doelmatig toegepaste geneeswijze , kan deze ziekte in een tijdsverloop van acht tot twintig dagen , zonder eenig gevaar voor de lijders genezen worden. De fchurft verdwijnt niet plotseling , gaat in geene andere ziekten over , en komt nimmer als crisis van heete of fleepende ziekten voor.

De geaardheden der plaats hebbende complicatiën van de fchurft met andere ziekten kunnen tot meer of min belangrijke en zelfs tot gevaarlijke omftandigheden aanleiding geven , welke voor de voorzegging van groot belang zijn. Zij moeten ons oordeel over het beloop en waarschijnlijk einde der ziekte befturen en wijzigen.

Daar de fchurft eene zuiver plaatselijke huidziekte is , zoo kan dezelve ook alleen door uitwendige middelen genezen worden. Aderlatingen en lakfeermiddelen , bloedzuiverende dranken en andere middelen , om fcherpten , die men onderftelde in het ligchaam aanwezig te zijn , weg te nemen , werden vroeger algemeen , thans nog door vele geneeskundigen voor onmisbaar gehouden , om de fchurft naar de kunst doelmatig te behandelen. De meest gezag hebbende mannen in het vak ftemmen tegenwoordig daarin overeen , dat die behandeling niet al-

Geneeskundige behandeling.

leen niets wezenliks tot de genezing van de schurft bijdraagt, ten minste genomen overbodig, maar meerendeels schadelijk is. Alleen dan kunnen de genoemde middelen te pas komen, wanneer de individueele gesteldheden der lijdens zulks vorderen, complicatiën of gelijktijdig andere ziekten aanwezig zijn. Alhoewel deelen in het gevoelen van WICHMAN, J. P. FRANK, BATEMAN, ALIBERT, BIETT, GREEN, NEUMAN en vele anderen, namelijk, dat het inslaan der *scabies* geene plaats vindt, en dat de ziekten daaraan toegeschreven, toevallige complicatiën zijn, zoo komen er toch, volgens mijne ervaring, gevallen voor, waarin het niet raadzaam is, de schurft langs den kortsten weg te genezen. Bij cachectische en aan slepende ziekten der ingewanden lijdende personen, kan de afleiding, die de schurft naar de huid maakt en onderhoudt, als plaatsvervangende tegenwerking, eenen gunstigen invloed op de bestaande ziekte uitoefenen; want deze nemen eene ongunstige wending, wanneer de opgewekte huidwerkdadigheid door de spoedigste genezing van de schurft onderdrukt wordt zonder in de behoefte der natuur door opwekking van andere verrigtingen te hebben voorzien. Het is derhalve raadzaam bij cachectische en aan slepende ziekten lijdende scabieuzen, vóór men tot de uitwendige behandeling overgaat, eene kunstzweer op den arm te plaatsen, de afscheidingen, die gestoord mogten zijn, te regelen, en gepaste middelen aan te wenden, om de bestaande ziekten te verbeteren of, zoo mogelijk, op te ruimen, en de

ge-

genezing der schurft niet dan langzaam tot stand te brengen. Bij koortsen en andere spoedig verloopende ziekten, bij welker ontwikkeling de schurft vaak opdroogt, behoeft men geene bijzondere voorzorgen te gebruiken; want de schurft keert terug, zoodra de als complicatiën ontstane ziekten, door eene doelmatige behandeling genezen zijn. De raadgeving, om in soortgelijke gevallen door inënting met schurftsmetstof eene nieuwe besmetting te bewerken, behoort tot de geneeskundige vooroordeelen verwezen te worden.

Bij jonge, volbloedige, tot ontstekingen voorgeschiedte personen, kan de algemeen verbreide uitflag en de hevige jeukte de ontsteking in de huid tot eene hoogte opvoeren, die bloedontlasting door aderlating en bloedzuigers vordert, alvorens men tot de plaatselijke behandeling kan overgaan. Trage en verstopte buikontlasting, bij lieden tot ophooping in de eerste wegen genegen, vorderen het gebruik van lakseermiddelen zelfs bij herhaling gedurende de geheele behandeling. Het inwendig gebruik der zwavelbloemen is bij die lijdens aangevezen, die eene drooge, dorre huid hebben, aan leveraandoeningen en aanbeijen lijden, en de zeer drooge drekstoffen moeilijk ontlasten.

De uitwendige of plaatselijke geneesmiddelen tegen de schurft aangeraden en met meer of minder goed gevolg gebruikt, zijn zoo talrijk, dat men in een werk als het onderhavige niet van allen spreken kan. Ik zal mij derhalve tot die bepalen, welke waarde ik uit eigene ervaring eenigermate kan beoordeelen.

a.) *De Kwikbereidingen.* Genoegzaam zonder uitzondering heeft men deze, zoowel de scherpe als de zachte, tegen de schurft aangewend, en daarmede het voorgestelde doel bereikt; want het is buiten kijf, dat het kwik in alle pharmaceutische bereidingen de schurft geneest.

Daar echter de kwikmiddelen vaak eenen schadelijken invloed op de bewerktuiging uitoefenen, en de kunst onschadelijke middelen bezit, welke de schurft zeker en spoedig genezen, zoo behooren de eerste alleen tot bijzondere gevallen beperkt te blijven en niet algemeen te worden aangewend. Deze gevallen zijn: wanneer eene zeer verouderde schurft aan andere middelen tegenstand biedt; wanneer eene syphilitische complicatie aanwezig is; wanneer de schurft versch en weinig verbreid is, de omstandigheden der lijders eene spoedige genezing vorderen door middelen, welke zich door hunnen reuk niet verraden, en de schurft door eene geringe hoeveelheid kwik kan genezen worden. De verkieslijkste middelen zijn: de oplossing van sublimaat (*urias deutoxydi hydrargyri*), één grein op twee oncen gedistilleerd water, om dagelijks tweemaal de schurftblaasjes mede te betten; de zalf met roode kwik-praecipitaat (*deutoxydum hydrargyri nitratum*), van een scrupel tot een drachma op eene once versehe ongezuuten boter of reuzel; de zalf uit de witte praecipitaat (*urias protoxydi hydrargyri praecipitatum*) en de spiauter-bloemen (*oxydum zinci*), van ieder een halve drachma op eene once versehe boter, om dagelijks des morgens en

en des avonds , de met schurftblaasjes bezette deelen goed inwrijvend te smeren , na voorafgegane afwasfching met fop van witte zeep bereid , des morgens. Bij lieden , die eene teedere huid hebben , en door het gebruik van uitwendige middelen ligtelijk hitte-uitflag (*eczema*) bekomen ; bij kinderen , en waar de reuk der zwavelzalven gevreesd wordt , kan men zich van de laafte zalf met een gevolg , dat aan alle verwachting beantwoordt , bedienen. Alhoewel ik het gebruik der kwikmiddelen tegen de fchurft niet fchuw , zoo befchouw ik het gebruik derzelve als uitzondering , toepasfelijk in de aangewezen omftandigheden , en deel voor het overige in het gevoelen van BIETT , wanneer hij zegt : „ De kwikmiddelen verwekken „ meestendeels toevallen , welke , door zachtere „ middelen aan te wenden , kunnen verhoed worden. Behalve de toevallige uitflagziekten , die de „ kwikbereidingen te weeg brengen , veroorzaken „ dezelve kwijling met al hare onaangename gevolgen , en geven tot ongunstige , de zedelijkheid „ der lijders in verdenking brengende oordeelvellingen , aanleiding.”

b.) *Rattenkruid* (*Arsenicum*). Voor zoo verre mij bekend is , wordt dit middel uitwendig tegen de eenvoudige fchurft door geene geneeskundigen aangeraden. Onder de geheime middelen , welke door kwakzalvers gebruikt worden , zijn er , welke rattenkruid bevatten , en gebruikt wordende , de fchromelijkfte gevolgen na zich fleepen ; want het uitwendig gebruik van het rattenkruid in groote

hoeveelheid , oefent eenen niet minder verderfelijken invloed uit op de bewerktuiging , dan wanneer hetzelfde inwendig gebruikt wordt. Een treurig voorval door éénen mijner vrienden waargenomen en mij medegedeeld , wil ik hier niet terug houden , daar het in verschillende opzigten waardeerbare wenken geeft. In het jaar 1816 stierven er in eene buurt , waarin de schurft algemeen verbreid was , twee kinderen kort achter elkander na eene korte ongesteldheid , en met verschijnselen , die verdenking van vergiftiging verwekten. Er werden nasporingen gedaan om te ontdekken of — hoe — en waardoor eene vergiftiging zou kunnen plaats gehad hebben ; want aan eene opzettelijke misdaad was niet te denken. Het bleek dan ook spoedig , dat de overledene kinderen wegens de schurft met eene zalf gesmeerd waren , die als een geheim verkocht werd en rattenkruid bevatte. Het bleek verder , dat verscheidene andere personen , die dezelfde zalf gebruikt hadden , door min of meer hevige verschijnselen van vergiftiging waren aangetast geworden.

c.) De zwavel (*sulphur*). Zonder schadelijke gevolgen te verwekken , geneest de zwavel de schurft zeker en spoedig. Onder den grooten voorraad van geneesmiddelen tegen deze ziekte in gebruik , is er geen , dat met de zwavel en derzelver bereidingen kan vergeleken worden.

Veertig jaren geleden , volgde men in de Hollandfche of destijds Bataaffche armee , ten gevolge der toenmalig minder doelmatige kazernering , klee-
ding

ding en verpleging zeer ruim met scabieuze lijders voorzien , met de beste uitkomsten , bij allezins ongunstige omstandigheden , deze eenvoudige behandeling. Des morgens en des avonds liet men de lijders een' paplepel vol bloem van zwavel innemen , en met eene zalf , uit één deel zwavel met twee deelen reuzel zamengesteld , smeren ; en wel in dezer voege : Op de binnenzijde van den regterarm , vooral in de gewrichten en tusschen de vingers , en in die van het linkerbeen , werden des morgens twee drachmen tot eene halve once zalf ingewreven ; des avonds geschiedde zulks aan den linkerarm en het regterbeen op dezelfde wijze. Vóór de inwrijving des morgens , moest zich de lijder met warm zeepsoep waschen en reinigen. Linnen en beddegoed werden zoo dikwijls ververscht , als de omstandigheden toelieten. Nog steeds volg ik deze behandeling met een allezins aanprijzinswaardig gevolg. Het kan zijn , dat het inwendig gebruik der zwavelbloemen overbodig is , en dit stemt met mijne ervaring in gevallen van ligte en versche schurft overeen ; maar bij algemeene verbreiding des uitlags en in verouderde gevallen , blijf ik intusschen aan het inwendig gebruik der zwavelbloemen waarde hechten.

Van de zwavelbereidingen , door onderscheidene geneesheeren aangewend , zal ik eenige dergenen aanwijzen , welke met vrucht gebruikt worden.

De zalf van JADELOT.

R. *Sulphureti potassae* , unc. vi
saponis albi lib. ii

E 4

olei

olei papaver. lib. iv
olei thyac. aether dr. ii
 m. S.

des morgens en des avonds ééne once op de deelen,
 met fchurftblaasjes bezet, in te wrijven.

Gemiddeld komt de genezing in veertien dagen tot
 stand. Bij de goede hoedanigheden, die deze zalf
 bezit, heeft zij het onaangename van dikwijls een
 toevalligen uitflag te verwekken.

De wasfching van DUPUYTREN.

R. *Sulphureti potassae unc iv*
aq. commun. lib. ii β
acid. sulphurici unc β
 m. S.

om de deelen met fchurftblaasjes bezet tweemaal
 daags te wasfchen.

De gemiddelde tijd der genezing is zestien dagen.
 Dit middel is verkieslijk bij lieden, die zalven
 fchuwen of dezelve niet kunnen verdragen. Lie-
 den, die eene zeer prikkelbare en gevoelige huid
 hebben, kunnen dit middel, wegens de pijnlijke
 branding, die het kenmerkt, niet verdragen.

De zalf van HELMERICH.

R. *Flor. sulphuris unc ii*
subcarbonat. potassae unc i
axung. porci unc viii
 m. S.

Eene halve once van deze zalf wordt des mor-
 gens en des avonds op alle met fchurftblaasjes be-
 zette deelen ingewreven. Dagelijks of om den an-
 deren dag laat men den lijder een warm bad nemen.

Deze

Deze behandeling heeft veel bijval gevonden. Ook BIETT geeft aan dezelve de voorkeur. Zij verwekt geenen toevalligen uitflag, en heeft gemiddeld twaalf dagen voor de genezing noodig.

De engelsche methode.

R. *Subcarbon. potass.* dr. i
Flor. sulphuris dr. II—III
axung. porci lib. i
 m. S.

R. *Flor. sulphur.* unc i
pulv. rad. hell. alb. dr. i
nitrat. potassae gr. x
sap. nigri
axung. porci â unc I—I ß
 m. S.

R. *Sulphuris loti* unc ß
subcarbon. sodae
muriat ammon â dr ß
muriatis protoxyd. hydrargyri praec. scr. i
unc. simpl. unc i
adde potest vel omitti:
olei terebenth. dr. I—II
 m. S.

Met de eene of andere van deze zalven laat men de fabieuze lijders voor het vuur gezeten, des avonds, door een' anderen persoon met eene toereikende hoeveelheid zalf, het geheele ligchaam inwrijven. Dit geschied zijnde, trekt de lijder eene oude onderbroek, sokken, handschoenen en eenen nachtjapon van calicot aan, of rolt zich in eene wollen deken en gaat naar bed. Na verloop van

twalf tot achteen uren staat hij op en reemt, om het lichaam van de zalf te reinigen, een warm zeepbad. Gewoonlijk is ééne inwrijving toereikend om den lijder te genezen. Dit het geval niet zijnde, zal eene tweede inwrijving genoeg zijn, om alle verdere geneeskundige hulp onnoodig te maken.

De behandeling van EMMERY.

R. *Saponis nigri* lib. viii
muriat. sodae
sulphuris à lib. iv
aceti lib. ii
chlorureti calcis lib. β
 m. S.

Dagelijks wordt tweemaal eene halve once in de handen en voeten ingewreven, en gelijktijdig warme zwavelbaden gebruikt. De gemiddelde duur der genezing van de hardnekkigste schurft is acht dagen.

De zalf van JASSER in de daarmede overeenkomende schurftzalf der Belgische apotheek

R. *Florum sulphuris*
Vitrioli albi
puly. Buccara Lauri à unc ii
miscis fiant cum olei Lini vel
olivarum ung.

S.

R. *Sulphur. subl. venal* unc ii
sulphat. zinci unc i
olei Laurini unc iii
axung. porci unc vi
 m. S.

Een

Een brokje ter grootte eener hazelnoot in de handpalmen sterk in te wrijven.

Deze zalven verwekken ligt uitflag en de genezing vordert meer tijd dan eene der vorige wijzen van behandeling.

NEUMAN roemt het volgende voorschrift als het beste van allen; echter heeft hetzelfde niets bij de andere zalven vooruit, en verwekt door de *sal. ammoniac* en de groene zeep ligtelijk uitflag, zoodat men er mede moet ophouden.

R. *Muriat ammon.* lib. i
sulphuris depurati lib. vi
sapon. domest. nig. lib. xvi.

m.

De Zwavelbaden. De natuurlijke, zoowel als kunstmatig bereide, bezitten het vermogen, om de ligte en versche schurft alleen, zonder medehulp van andere middelen te genezen. Bij kinderen en bij lieden, die eene teedere, weeke huid hebben, verdienen dezelve aanprijzing; want zij verwekken geene lastige of onaangename toevallen; maar de genezing vordert meer tijd dan de behandeling met zwavelzalven; gemiddeld niet minder dan vijf en twintig dagen.

De zwavelberookingen. De uitkomsten, welke de behandeling van de schurft met zwavelbereidingen oplevert, beantwoorden geenszins aan de groote verwachtingen, waartoe de uitbundige loftuitingen, aan dezelve toegezwaid, hadden aanleiding gegeven.

Om van dezelve gebruik te maken, plaatst men
 den

den ontkleeden lijder in eenen toestel of eene kast, in dier voege, dat het hoofd vrij blijft en geene zwaveldampen kunnen ingeädemd worden. Met eene berooking daags duurt de behandeling drie en dertig dagen. Vele lijders kunnen dezelve niet verduren en worden er hevig door aangedaan. Met regt vraagt BIETT: „wat zal men van den raad zeggen, dagelijks twee berookingen in het werk te stellen, om de genezing te bespoedigen?” Het moet derhalve bevreemden, dat JON. GREEN drie berookingen dagelijks aanraadt. Hij beweert, dat deze behandeling bij gegoede lieden, die het gebruik van zalven schuwen, de voorkeur verdient. De moeite, die het inheeft, eenen doelmatigen toestel te erlangen, de groote onkosten, die deze veroorzaakt, de omflag met deszelfs gebruik verbonden, de lastige uitflag, die spoedig op de berooking volgt en de langdurigheid der behandeling, maken de zwavelberookingen voor mij niet prijzenswaardig.

De loogzout- en de warmwater-baden zijn dienstig om de huid te zuiveren, de jeukte te matigen en alzoo de genezing te bespoedigen. Zonder andere uitwendige middelen zijn dezelve ontoereikend om de schurft te genezen.

De nieswortel-zalf.

R. *Pulv. Hellebori alb.* dr. 1

axungiae porci unc 1

m. S.

Om de schurftblaasjes dagelijks tweemaal mede in te wrijven.

De proeven, door BIETT met deze zalf genomen,

men, hebben gunstige uitkomsten opgeleverd: zonder onaangename toevallen kwam de genezing gemiddeld in dertien en een' halven dag tot stand.

Wanneer gedurende eenigen tijd nadat de genezing daar schijnt, telkens hier en daar versche schurftblaasjes uitbotten, dan is het raadzaam, de middelen, welke men voor de behandeling gekozen heeft, nog eenigen tijd vol te houden of met andere te verwisfelen.

Bij complicatiën met *eczema*, *impetigo* en *ecthyma* zijn alle prikkelende zalven, wasfchingen en berookingen nadeelig. Om den geprikkelden toestand der huid te bedaren, zijn verzachtende ftofvingen noodig, waartoe afkookfels van zemelen, maluwbladen, lijnzaad, heemstwortel of eene dunne emulfie van bittere amandelen, met bijvoeging van *flores zinci* of *acetis plumbi liquidae concentratae* kunnen gebruikt worden. Inwendig geve men van tijd tot tijd een lakfeermiddel en dranken uit plantenzuren bereid. Andere complicatiën moeten geëvenredigd aan derzelver geäardheden behandeld worden. Bij fyphilitifche complicatiën kan men de genezing zonder kwikbereidingen niet tot stand brengen. Bij de fcheurbuikige zijn de bekende anti-fcorbutica, vooral de kina en de minerale zuren onmisbaar. Ook de flepene fchurft na tusfchenpoozende koortfen vordert doorgaans deze behandeling.

Gedurende de geheele behandeling moet de reinheid door baden, wasfchingen en het dikwijls verwisfelen van linnen- en beddegoed onderhouden worden. Om nieuwe befmetting voor te komen, is het noodig,

dig, al de kleedingsstukken en het beddegoed, dat de lijder gebruikt heeft, te waschen, te bleeken of in de vrije lucht goed te zuiveren, door zwavelberookingen te ontsmetten, of, door dezelve aan eenen hoogen graad van kunsthitte bloot te stellen, de smetstof te vernietigen. De keuze dezer middelen moet geregeld worden naar den aard der stoffen, waaruit die goederen zijn vervaardigd.

Overtuigd, dat er geene spijsen noch dranken zijn, die schurft kunnen voortbrengen, kan ik geene voorschriften betrekkelijk den leefregel geven. Ik schrijf aan mijne lijders geene hongerkuur voor; want, naar mijne ervaring, genezen zij, die hun genoegen eten, doorgaans spoediger dan diegenen, welke tot eene strenge diët verplicht worden. Geestrijke dranken, gerookte, gezouten en zeer vette spijsen rade ik aan achterwege te laten. Versche voedsels uit het dieren- en plantenrijk verbied ik niet; zelfs vind ik geene reden, om het schapen- en varkensvleesch uit te sluiten. Door den behoeftigen volksstand wordt het varkensvleesch het minst, door de arme Joden in het geheel niet gegeten, en toch vindt men de meeste schurftlijders onder de behoeftigen, maar het allermeeft onder die der Joden. Dit zoude toch anders moeten zijn, indien het varkensvleesch zoo schadelijk was, als velen willen.

3^e Orde. *Bullae*. *Blazen*.

Bepaling. De blazen (*Bullae*) ontstaan op dezelfde wijze als de blaasjes (*Vesiculae*) door het los worden
der

der opperhuid op eene meer of minder ontstokene oppervlakte. De eerste zijn alleen door grooteren omvang van de laatste onderscheiden, hebben de grootte van eene erwten, tot die van een ganzenei, eene halfkogelvormige gedaante met eene breede grondvlakte, en bevatten eene heldere, waterachtige of etterachtige vloeistof.

Tot deze orde behooren twee soorten van ziekten: Soorten.

a. *Pemphigus* (die reeds in het II Deel 2 Afd. 2 ft. p. 1065 is afgehandeld.

b. *Rupia*, *Rypia*, *Rhypia*. De vuile blaas, vuile roof, vuile haarworm.

Blazen van verschillende grootte, met eene breedte, ligt ontstokene grondvlakte; zij zijn niet talrijk, staan afgezonderd en vloeijen nimmer in een. Het vocht, dat zij bevatten, is eerst waterachtig, wordt vervolgens etterachtig, niet zelden door bijgemengd bloed rood, blaauw of bruinachtig geleverd; hetzelfde verdroogt tot dikke eenigzins doorschijnende korsten of roven, welke meer of min diepe zweeren bedekken. Bepaling.

Men onderscheidt de eenvoudige bruine blaas Verdeeling. (*Rhypia simplex*), de verhevene of schulpvormige (*Rhypia prominens*) en de knagende of invretende (*Rhypia escharotica*).

a.) De eenvoudige vuile blaas. *Rhypia simplex*.

Zij is doorgaans eene toevallige, zelden eene Geaardheid. eigenlijdlige ziekte, die bij ons zeer zelden voorkomt. Gewoonlijk ontstaat zij bij zwakke, ziekelijke, aan kwaadsappigheid lijdende personen ten gevolge van gebrek en ellende. Zij heerscht noch epi-

epidemisch noch endemisch , maar komt somwijlen na voorafgegane heete huidziekten , het meest na de *pemphigus* voor. Eene geringe ontsteking gaat de uitbotting der blazen vooraf of vergezelt dezelve. De platte , niet talrijke , ver van elkander verwijderd staande blazen , hebben één' duim middellijn. De vloeistof , die zij bevatten , is wit , doorschijnend en waterachtig , maar wordt spoedig ondoorschijnend en gekleurd door bijgemengde etter en bloed , gelijk bij de *ecthyma*. Binnen een kort tijdsverloop worden de blazen fletsch ; het daarin bevatte vocht verdroogt met de opperhuid tot bruine roven , die in het middelpunt het dikste en eenigzins verheven zijn , en eene ruwe oppervlakte hebben ; waar de omtrek der roven met de oppervlakte vereenigd is , wordt deze een weinig opgeligt. Onder iedere roof bestaat gewoonlijk eene oppervlakkige zweer ; na verloop van weinige dagen vallen de roven af , en de bloot gekomene zweren genezen spoedig. Somwijlen echter gebeurt het , dat na het afvallen der roven bij herhaling nienwe gevormd worden , en de genezing dus vertraagd wordt. Gewoonlijk verandert de huid op de genezene zweren in bruine vlekken , welke langdurig staan blijven , maar allengskens verdwijnen. De gewone zetels dezer huidziekte zijn de onderste ledematen , zelden de lendenen en bijna nimmer de andere deelen des ligchaams. In de eenvoudigste gedaante is de duur dezer ziekte van veertien tot een en twintig dagen. Slepender worden zijnde , kan zij maanden tot haar verloop noodig hebben.

b.) De

b.) De verhevene of schulpvormige bruine blaas of roof. (*Rhyphia prominens*).

Enkelstaande, niet talrijke, nimmer zamenvloeiende blazen, door een' ontstoken ring omgeven, gevuld met een troebel vocht, dat met de opperhuid spoedig tot eene meer of min dikke, bruin gekleurde roof verdroogt, dikker in het midden, dunner aan de randen, van de gedaante eener oesterfchelp of van de schelp, het schoteltje (*patella*) genaamd.

In deze gedaante komt de *Rhyphia* gewoonlijk bij kwaadsappige, uitgeputte, oude, onregelmatig levende en bij slecht gevoede lieden voor. De onderste ledematen en de billen verstrekken haar tot zetel. Spoedig of langzaam grijpt de uitbotting op eene vooraf ontstokene plek der huid plaats, naar mate het afgescheide waterachtige of gekleurde vocht de opperhuid losmaakt en oplicht. Doordien de opflorping spoedig plaats grijpt, zoo zijn de roven eerst klein en dun, maar nemen, naar mate de afgescheidene vochten verdroogen, in omvang en dikte toe. De omtrek der roven is door een' ontstoken' ring omgeven, en de opperhuid opgetrokken. Geëvenredigd aan den toenemenden omtrek der roven, breidt zich de ontstoken ring verder uit, totdat de roof hare volkomene ontwikkeling bereikt. Gewoonlijk wordt daartoe een tijdsverloop van twee tot tien en meer dagen gevorderd. De bruinkleurige schelpvormige roof, op hare oppervlakte met ringsgewijze verhevenheden, ten gevolge der schubsgewijze opdrooging, geteekend,

Gevaarlijk
en beloop.

kend, blijft eenen geruimen tijd, somwijlen maanden, vast met de huid vereenigd, zoodat zij niet dan met moeite en somwijlen in het geheel niet kunnen losgemaakt worden. Onder de roven bestaat altijd eene zwerende oppervlakte; ondiep zijnde, bedekt zich dezelve telkens met nieuwe roven; dieper in het weeffel der huid ingedrongen zijnde, veroorzaakt het wegnemen der roven, vuile zweren met loodvormige, ligt bloedende randen, die om genezen te worden, niet minder tijd vorderen dan zij moeite veroorzaken. Na de genezing blijven paarsche vlekken terug, die eerst na een geruim tijdsverloop verdwijnen.

c.) De knagende of invretende vuile blaas of roof. (*Rhyphia escharotica*.)

Bepaling. De blazen verschillen onderling in grootte, hebben geene ronde, maar eene onregelmatige gedaante, omgeven met eenen paarschen rand of kring, gevuld met een gekleurd vocht, dat alle schakeringen van ligtrood tot zwart oplevert. De blazen gaan in kwaadaardige zweren over.

Beloop. Op loodkleurige, eenigzins verhevene vlekken, ontstaan blazen, die spoedig berften, althans vroeger dan er roven kunnen gevormd worden; de opperhuid laat los en de ontbloote huid gaat tot rotachtige zweren over, welke eenen flecht bereiden en stinkenden scherpen etter afscheiden. Meermaalen grijpen uitbottingen van scherpe blazen, die hetzelfde beloop volgen als de eerste, plaats. De zweren zijn langdurig en moeilijk te genezen. Algemeen lijden der bewerktuiging en koorts ver-

ge.

gezellen steeds de onderhavige soort der vuile blaas, en maken dezelve tot eene gevaarlijke, vaak doodelijke ziekte. Op alle deelen des ligchaams komt dezelve voor; doch voornamelijk zijn het de onderste ledematen de lenden, de hals, het bovenste gedeelte der borst, de onderbuik en de balzak, die er door aangetast worden.

Kinderen van weinige dagen tot twee jaren Oorzaken. oud, zijn bijna uitsluitend aan deze ziekte onderhevig. Kwaadsappigheden, van de ouders geërfd, of door slechte voeding, verwaarloozing en onreinheid der kinderen veroorzaakt, geholpen door ongunstige weersgesteldheden, zijn de bekende oorzaken, welke deze ziekte voortbrengen.

De vuile blaas kan met de blaaskoorts (*pemphigus*) en etterpuisten (*ecthyma*) verwisfeld worden. Onderscheidingsteekenen (Diagnosis). Zij onderscheidt zich van de eerste door de minder regelmatige gedaante der blazen; door het bevatte vocht, dat bij de *pemphigus* helder en doorschijnend, bij de *rhypia* troebel en gekleurd is; verder daardoor, dat bij de *pemphigus* geene korstachtige roven, en zelden oppervlakkige, maar geene vuile dieper invretende zweren ontstaan. Het geheele beloop der ziekte, de gedaante der korstachtige roven en zweren, de blazen der *rhypia* en de met etter gevulde puisten der *ecthyma* leveren kentekenen genoeg, om deze ziekten niet met elkander te verwisfelen.

De eenvoudige, zoowel als de schulpvormige Voorzegging. vuile blaas zijn gevaarlooze ziekten; de knagende daarentegen gaat steeds met gevaar verzeld. De

leeftijd der lijdens, de gesteldheid der krachten, de geaardheid der aanwezige kwaadsappigheden, de uitgebreidheid der zweren en het verlies van vochten, dat zij veroorzaken, moeten den geneesheer leiden, om de hoop en het gevaar naar waarde te schatten, en het waarschijnlijke einde der ziekte te voorspellen.

Behandeling. Naar aanleiding der algemeene gesteldheden der lijdens en de voorafgegane schadelijkheden, moet de inwendige behandeling bestuurd worden.

Door gezonde, voedende en versterkende spijs en drank, door de reinheid in alle deelen te bevorderen, door eene doelmatige verpleging in alle betrekkingen, ligging en kleeding daaronder begrepen, en door beweging in de vrije lucht, trachte men de vochten te verbeteren, de zwakte tegen te gaan en de verlorene veerkracht te herstellen. Men ondersteune den voorgeschreven leefregel, waar het noodig is, door afkookfels der kina met sassaaparillen-wortel en minerale zuren of aluin. Wanneer bijzondere kwaadsappigheden aanwezig zijn, rigte men de behandeling zoodanig in, dat zij daaraan beantwoorde en gelijktijdig de oorzaken wegneemt, welke die kwaadsappigheden hebben voortgebracht of nog onderhouden. Bij zuigende en nog zeer jonge kinderen, houde men de minnen en de oppasters in het oog, opdat geene ziekten van deze op hare voedsterlingen worden overgedragen.

Uitwendige behandeling. Bij de eenvoudige *rhyphia* zijn verzachtende omslagen en pappen aangewezen om de pijnen te lenigen en de ontsteking te matigen. Dit geschiedt
zijn-

zijnde, bezige men omflagen met *aqua goulardi*, of bestrijke de ontbloote en zwerende plekken met *ceratum saturni*. Volgt hierop geene genezing, dan verwisfele men de aangewende middelen met een mengfel uit honig en mijrrhe, en bestrijke de randen der zweren met hellschen steen. Bij de schulpvormige *rhypia* bedekke men de roven met eene pap van wittebrood met *aqua goulardi* bereid, ten einde dezelve los te maken en de pijnen te lenigen. Om de verettering der blootkomende zweren te verbeteren en de genezing te bevorderen, zijn pappen met rooden wijn bereid of stovingen met enkelen wijn heilzaam. Met deze behandeling niet slagen- de, bestrijke men de zweren met hellschen steen, zeezout- of falpeterzuur. JONATH. GREEN geeft den raad, de zwerende oppervlakte met wijnsteen te bestrooijen, en prijst zwaveldampbaden en wasfchingen met zwavellever in het water opgelost aan. Gevallen, welke aan al deze middelen hardnekkigen tegenstand bieden, vorderen het uitwendig gebruik der onverdunde minerale zuren of de oplossing van falpeterzuur kwik in falpeterzuur. BIETT heeft met goed gevolg gebruik gemaakt van eene zalf uit één scrupel *protojoduretum Hydrargyri*, of vijftien greinen *deutojoduretum Hydrargyri* met ééne once vet. In een mij voorgekomen geval bij eenen bejaarden man, vielen de korsten door inwrijvingen met *ung. neapolit*, spoedig af en de genezing volgde, zonder andere middelen noodig gehad te hebben. Wanneer, gelijk gewoonlijk, de onderste ledematen de zetel der ziekte zijn,

wordt de genezing door het uitdrijvend verband bevorderd.

De knagende *rhypia* behandelde met insgelijks bij aanwezige ontsteking eerst met verzachtende pappen, daarna met rooden wijn, afkookfels van kina met aluin of andere *tonica* met minerale zuren. Het volstrooijen der zweren met poeder van arnicawortel of afkookfels van dit middel met minerale zuren, heb ik niet zonder vrucht gebezigd.

4^e. Orde.

Puisten. Pustulae.

Bepaling. Kleine, aan de randen harde, in het midden weeke, etter bevattende verhevenheden, rond of onregelmatig van gedaante, met eene doorsnede van ééne tot twee lijnen. Zij ontstaan wanneer ten gevolge van ontsteking en veranderde afscheiding de opperhuid van het slijmnet loslaat. De bevatte etter verdroogt tot dunne schilfers en roven, die afvallen en eene drooge, roode vlek terug laten. Zelden geven dezelve tot zweren aanleiding.

Algemeene
eigenschap-
pen.

De puistige huidziekten komen op alle deelen des ligchaams voor, over deszelfs geheele oppervlakte verbreid, tot enkele deelen of slechts tot eenige weinige punten bepaald. Het beloop dezer ziekten is haastig of slepend; de eerste zijn reeds als *exanthemata* afgehandeld; — de laatste stellen de volgende soorten daar:

- a.) *Ecthyma*. Etterende puisten, de etterende haarworm.
- b.) *Impetigo*. Natte roof.
- c.) *Acne*. Vinnen.

d.) *Men-*

d.) *Mentagra, sycosis*. Baardschurft.

e.) *Porrigo*. Hoofdzeer.

De puisten, welke deze ziekten kenschetsen, hebben niet altijd eene en dezelfde, maar eene der vier volgende verschillende gedaanten.

1. De puisten zijn grooter in omtrek dan de volgende, verheffen zich op eene harde kringvormig roode, ontstokene grondvlakte, en verdroogen tot harde, donkerkleurige roven. (Ware etterpuisten, *Pustulae phlysiacae*).

2. Kleine, onregelmatige puisten, weinig boven de huid verheven, met eenen niet naauwkeurig beperkten omtrek, geringe roodheid en ontsteking der grondvlakte, die eenen dunnen waterachtigen etter overvloedig ontlasten en met dunne schilferige roven opdroogen. (Waterachtige etterpuisten, *Pustulae psudraciae*).

3. Kleine, puntige puisten, op eene weinig of geheel niet ontstokene oppervlakte, die eene gele, dunne, kleverige, honigaardige etterstof bevatten en met gele roven opdroogen. (Weiaardige etterpuisten, *achores*).

4. Grootere dan de voorgaande, vlakke, niet puntige, maar in haar middelpunt ingedrukte puisten, op eene weinig ontstokene grondvlakte, van onregelmatige gedaante. De puisten bevatten eene dikke kleverige etterstof, die tot ligtgele, halfdoorschijnende, honigraat- of beschuitvormige roven opdroogt. (Honigraatvormige etterpuisten, *favi*).

a.) *Ecthyma*. Etterpuisten, Etterende Haarworm.

Bepaling. Met ontsteking der huid gepaarde, ware etterpuisten (*phlysaciae*), die eene harde grondvlakte en de grootte van eene groene tot die van eene graauwe erwten hebben, altijd van elkander afgezonderd staan, en zelden in grootte getallen aanwezig zijn.

Zij komen op alle deelen des ligchaams voor, doch voornamelijk op de ledematen, de schouders en den rug, verdroogen tot roven van verschillende kleur en dikte; afgevallen zijnde, blijven er roode vlekken terug, die allengskens verdwijnen of in oppervlakkige likteekenen overgaan, welke laatste met die der koepokken overeenkomst hebben en daarmede kunnen verwisseld worden. Deze uitflag verloopt zonder koorts en is niet besmettend.

Beloop en
toevallen.

De uitbotting wordt zelden door voorboden aangekondigd; somwijlen echter gevoelen zich de lijders eenige dagen te voren afgemat, hebben weinig of geen eetlust en eene slechte spijsvertering; vervolgens komen kleine, roode, ontstokene stippen te voorschijn, welke binnen weinige dagen boven de huid uitkomen, harder en grooter worden, eerst aan de punt en vervolgens in hun geheel tot verettering overgaan, terwijl de grondvlakte hard en ontstoken blijft. Binnen drie tot vijf dagen bereikt de verettering haar einde, en de puisten verdroogen tot roven van verschillende dikte en kleur, die afvallen, roode vlekken, likteekens en somwijlen zwerende ontvellingen terug laten. De uitbotting kan in eens meer algemeen over het ligchaam verbreid, of tot enkele deelen bepaald zijn,

zijn , of wel achtereenvolgend op verschillende deelen plaats grijpen. De puisten hebben gewoonlijk de grootte eener erwt , maar kunnen ook den omtrek van eenen halven gulden bereiken ; zij staan van elkander verwijderd , of pleksgewijs opgehoopt bij elkander. Evenredig aan de ontsteking , gaat de ontwikkeling der puisten met geringe of hevige pijn gepaard , die eerst met de spoediger of langzamer tot stand komende verettering , verdwijnt. Wanneer de punt der puisten alleen verettert , dan blijft de grondvlakte hard en ontfoken , om na den afloop der verettering door oplossing te verdwijnen. Verettert de geheele puist , dan wordt de opperhuid blaasvormig opgeligt en met etter gevuld. In beide gevallen verdroogt de etter tot bruine roven , die vast zitten , maar in dikte en omvang verschillen. De vlekken , welke na het afvallen der roven achterblijven , geven aan de huid een eigenaardig getijgerd aanzien. Soms grijpen er onder de roven dieper in de huid indringende zweren plaats , die een onzuiver , bloederig aanzien hebben , zeer pijnlijk zijn , eenen flechten etter afscheiden en zeer langzaam genezen ; zoodat de gewone duur dezer ziekte , die van drie tot vier weken bedraagt , verre overschreden wordt.

Deze bestaan of in uitwendige , bekende schadelijkheden , of in inwendige , welke geaardheid nog bijna geheel in het duister ligt. Tot de eersten behooren inwrijvingen met scherpe stoffen ; de zalven en pleisters met braakwijnsteen ; oplossingen van dit middel en van het bijtende kwik , tot was-

schingen gebezigd; de inwrijvingen met *veratrine*, *delphine*, *aconitine*. etc., de croton-olie, het langdurig bearbeiden van suiker, kalk en andere scherpe stoffen, en het inwendig gebruik van het bijtende kwik, langdurig en in groote hoeveelheid gebruikt. De *ecthyma*-puisten, door uitwendig gebruik van den braakwijnsteen ontstaan, bevinden zich dicht op een gedrongen bij elkander, ontwikkelen zich met ontsteking en pijn, hebben in haar midden eenen deuk of navel, en in haar geheel voorkomen eene groote gelijkenis met de koepokken. Derzelver beloop duurt van zes tot acht dagen.

Het *ecthyma*, dat door geene bekende uitwendige oorzaken is ontstaan, schijnt uit eene eigenaardige gesteldheid der bewerktuiging voort te spruiten. Eene buitensporige, de krachten uitputtende leefwijze, slechte voeding, overmatige inspanning der ligchaamskrachten en geestvermogens, onreinheid, enz., oefenen blijkbaar grooten invloed daarop uit. Het kan derhalve in alle leeftijden, in alle seizoenen en in alle landstreken voorkomen. Het voorjaar, de zomer, de jongelingsjaren, de mannelijke leeftijd en de zwangerschap schijnen bovendien eenen invloed uit te oefenen, die de ontwikkeling van dezen uitslag begunstigt. Slepende aandoeningen der lever en der buksingewanden gaan menigmaal met *ecthyma* gepaard, en schijnen in een oorzakelijk verband met elkander te staan. Ook de heete en slepende huidziekten, het roodvonk, de mazelen, de pokken, het huidmos, de huidjeukte en de schurft hebben dikwijls *ecthyma* in hun gevolg of gaan daarmede

gepaard. Van eene critifche geëardheid fchijnt hetzelfde te zijn, wanneer de uitbotting in het critifche tijdperk van *typheufe* koortfen met het rotachtige karakter plaats heeft, alsmede in de *gastro-enteritis acuta*, volgens BIETT.

De gedaante, de geëardheid en het geheele be-
 loop der etterpuisten geven kenteekenen genoeg aan <sup>Onderschei-
 dings-teeke-
 nen.</sup> de hand, om dezelve van de andere puistige huid-
 ziekten te onderscheiden. De individuele gesteld-
 heden der lijders, het beloop der ziekte, de aan-
 wezigheid van andere ziekte-toevallen en derzelver
 geëardheid stellen den oordeelkundigen waarnemer
 in de gelegenheid om de gewone etterpuisten van
 de fyphilitifche te onderscheiden. Nog minder is
 het mogelijk, dat men de *ecthyma* met de fchurft
 en de bloedzweren verwisfelt: de omvang der puis-
 ten, de verettering van de eerfte, de blaasjes, de
 zitplaats en de jeukte bij de fchurft maken het niet
 moeilijk, zelfs bij *voorkomende complicatiën* mis-
 flagen te verhoeden. De bloedzweer kenschetst zich
 door haren grooteren omvang, diepere ligging in
 de huid, harden omtrek, door de ontwikkeling der
 ontfteking van uit de diepte naar buiten en door
 de kern, die altijd door de verettering moet ontlast
 worden.

Op zich zelve staande, is de etterpuist geene ^{voorzegging.}
 gevaarlijke ziekte. Verbonden met belangrijke on-
 gesteldheden der ingewanden, floornisfen in de
 verrigtingen, en als critifche natuurbewerkingen in
 heete ziekten, kan dezelve dienen om dreigende
 gevaren te voorzien en te leeren kennen, zoowel
 als

als om eene gunstige verandering te voorspellen.

Verdeeling. 1. *Ecthyma vulgare*. De gemeene etterpuist. In deze gewone en eenvoudige gedaante komen de puisten aan de ledematen, aan den hals en zeer dikwijls op de schouderbladen en den rug voor. De uitbotting duurt zelden langer dan drie dagen, de punten der puisten gaan spoedig tot verettering over en breken open, terwijl de grondvlakte nog hard en ontstoken blijft; de ontlaste etter verdroogt tot bruine roven, die afvallen en roode vlekken terug laten, welke eenigen tijd staan blijven. De geheele duur der ziekte is van twaalf tot twintig dagen.

2. *Ecthyma infantile*. De etterpuisten der kinderen.

Deze onderscheiden zich, voor zoo verre het de gedaante en het beloop der puisten betreft, niet van de voorgaande; maar er grijpen bij herhaling uitbottingen plaats, de puisten verbreiden zich over het geheele ligchaam, zelfs het aangezicht en het behaarde hoofd niet uitgesloten. Gewoonlijk ont-aarden de etterpuisten der kinderen in eene lang-wijlige ongesteldheid; ten gevolge der zich telkens herhalende uitbottingen, kan derzelver duur maanden lang gerekt worden. Koorts is er intusfchen zelden aanwezig; de ontsteking en pijn zijn niet hevig, uitgezonderd die gevallen, waarin de puisten met algemeene oorzaken in verband staan, meer dan gewoon groot en hard zijn, eene loodkleurige grond-vlakte hebben en dieper in de huid inzweren. Er blijven alsdan witte, eenigzins gepunteerde liktee-

ke.

kenen terug. Kinderen van zwakke gesteldheid, die nog zuigen, die geen genoegzaam of slecht voedsel erlangen en eene doelmatige verpleging missen, als ook jonge lieden, voornamelijk in het voorjaar en den zomer, na vermoeijng en verhitte, ontoereikende voeding en bedorvene voedingstoffen, worden uitsluitend door deze ziekte aangetast.

3. *Ecthyma luridum*. De wankleurige etterpuisten.

De puisten zijn grooter, hare grondvlakte is harder, boven de huid verheven en wankleurig. Met uitzondering van het aangezicht, komen dezelve op alle lichaamsdeelen voor en zijn zeer langdurig.

Afgematheid, lusteloosheid, gebrek aan eetlust, bedorvene spijsvertering, onregelmatige; veelal verstopte buiksondasting, pijn in den rug en de ledematen, gaan der uitbotting vooraf. Bejaarden worden er voornamelijk door aangetast, en wel voornamelijk in den winter, na voorafgegane vermoeijens en krachttuitputting door langdurigen zwaren arbeid, verhitte, onmatig gebruik van spijs en drank, van slecht en bedorven voedsel; — somwijlen ook na plaatselijk op de huid inwerkende schadelijkheden.

De ontwikkeling en verettering der puisten gaat langzaam voort: eerst na verloop van tien tot veertien dagen komen dezelve tot rijpheid, bersten en ontlasten veel gesचितten en bloedigen etter; de uitgezworene puisten worden spoedig met dikke, har-

harde en bruine roven bedekt, en behouden eenen harden en ontstoken' rand, zoo lang tot dat de roven afvallen, hetwelk eerst na verloop van eenige weken plaats vindt. Neemt men dezelve gewelddadig weg, dan ontstaan langdurige, vuile, eenen flechten etter overvloedig afscheidende zweren met harde randen.

Symptomatisch komt het *ecthyma luridum* in bijna alle cachexiën voor, verbonden met de eigendommelijke verschijnselen en teekenen der onderscheidene vochtverbasteringen. De pijnen zijn meer dan gewoon hevig, de watervaatklieren in de nabijheid der puisten worden pijnlijk ontstoken en zwellen; de roven zijn dik, zeer vastzittend en laten langzaam los; — volkomene genezing komt eerst tot stand na de opruiming der algemeene oorzaken.

Behandeling. Deze vordert verschillende wijzingen:

1.) Het *ecthyma vulgare* is gewoonlijk eene ligte, min beteekenende ziekte, die, wanneer geene algemeene ongesteldheden plaats hebben, en de opwekkende oorzaken alleen in de uitwendige prikkels gelegen zijn, alleen eenen goeden leefregel, en geene geneesmiddelen vordert, en na het opruimen der oorzaken door de natuur alleen genezen wordt. Zijn er algemeene ziekteverschijnselen aanwezig, zoo behandle men dezelve volgens hunne geëardheid. Gastrische ophooping en trage buikontlasting vorderen braak- en lakseermiddelen. Bereikt de ontsteking bij jonge volbloedige lieden eenen hooger trap, zoodat het geheele vaatstelsel in de

de reactie deel neemt, dan kunnen bloedzuigers en zelfs eene aderlating noodig worden. Zijn de lijders zwak en uitgeput, terwijl eene flechte en overvloedige verettering de krachten ondermijnt, dan is de versterkende geneeswijze, vooral de kina, verbonden met fassaparilla, en de minerale zuren, aangewezen. Steeds ondersteune men de behandeling door eene goede verpleging, doelmatige voeding en matige beweging inde vrije lucht. De puisten verbindt men met *ceratum saturni*, of houde dezelve met *aqua goulardi* vochtig.

2.) *Ecthyma infantile*. Bij zuigelingen zorg men in de eerste plaats voor eene goede, gezonde minne, en, waar deze niet te bekomen is, voor eene doelmatige en toereikende voeding en goede verpleging. Men geve, wanneer de krachten afnemen, dagelijks eenige lepels wijn; waar dezelve eene meer krachtige hulpbieding vorderen, afkooksel van kina of ijzerbereidingen. Bij kinderen, die reeds meer in leeftijd gevorderd zijn, en bij jongelingen, handele men op dezelfde wijze als bij het *ecthyma vulgare*. In langdurige gevallen zonder bekende oorzaken, zijn poeders, zamengesteld uit *flores sulphuris*, *cremortart.*, *magn alb.* à dr. III, *antimonii crudi* dr. I, drie of viermaal daags een eijerlepeltje vol, eenigen tijd volgehouden, en inwrijvingen der harde puisten met *ung. neap.* en *ung. althaeae* à *part. aeq.*, aanbevelenswaardig.

3.) *Ecthyma luridum*, *symptomaticum*, *cachecticum*. Men besture de behandeling volgens de algemeene aanwijzingen. Lakseermiddelen zijn in het eerste tijdperk der ziekte, en bij herhaling, veel-

veelal noodig; — aderlatingen, daarentegen, komen zelden en slechts spaarzaam te pas. Spoediger wordt het noodig tot saspaparillen, *dulc. amara*, kina, enz., over te gaan, met opium verbonden, wanneer de pijnen hevig zijn en den lijder de noodige rust ontnemen. De bijzondere cachexiën vorderen die behandeling, welke aan hare bijzondere geëardheden beantwoordt: de venerische vordert kwikmiddelen; het *ecthyma*, dat na het uitwendig gebruik van de sublimaat ontstaat, zwavel en deszelfs bereidingen, zoowel inwendig als uitwendig in baden en berookingen; — de scorbutische vochtverbastering vereischt de bekende anti-scorbutica, voornamelijk de delfstofzuren. Het *ecthyma*, dat in de gevolgen van pokken, mazelen, roodvonk en rotkoortsen voorkomt, bestrijde men met versterkende, de vochten verbeterende en opwekkende middelen. Ook hier zijn het wederom de kina, de saspaparillen, de minerale zuren, de serpentaria en de wijn, waarvan men het meeste te wachten heeft.

Niet minder dan bij de voorgaande wijzigingen dezer ziekte, vordert de onderhavige eenen goeden leefregel en eene doelmatige verpleging, warmwater-, loog- en zeewaterbaden zijn, naar gelang der ziektegeëardheden, hulpmiddelen, om de genezing te begunstigen. De zweren, welke op de verettering der *ecthyma*-puisten somwijlen volgen, behandel men in het tijdperk der ontsteking en prikkeling met verzachtende omslagen en pappen, daarna met de gewone *tonica*. Bij langeren duur en

en groote werkeloosheid, zijn sterke afkookfels van kina, wilgen- of eikenbast met myrrhe en rooden wijn aangewezen. Volgt de genezing niet, dan bestrijke men de randen der zweren met blaauwe vitriool of hellschen steen, de geheele zwerende oppervlakte met zeezoutzuur, wanneer men eene nog grootere prikkeling noodig acht. Dat men bij de uitwendige behandeling de geaardheden der oorzaken niet uit het oog mag verliezen, behoeft geen nader betoog.

b.) *Impetigo. Natte roof.*

Deze uitslag is gekenschetst door kleine puisten Bepaling. (*psudraciae*), die van elkander afgescheiden of groepsgewijze bij elkander staan. De etter, die zich uit de geopende puisten ontlast, verdroogt tot dikke, oneffene, geel-bruinachtige roven. Gewoonlijk verloopt deze uitslag zonder koorts; dezelve is niet besmettend en kan door inenting niet overgeplant worden. Het aangezicht en de ledematen worden er het menigvuldigst door aangetast.

Reeds bij de oudste geneeskundige schrijvers vindt men het woord *impetigo*. Niet allen echter hebben daarmede eene en dezelfde, maar vaak zeer verschillende ziekten bedoeld, zoodat er geene overeenstemming in hunne beschrijvingen bestaat, en er bijna geene slepende huidziekte te noemen is, die niet bij den eenen of anderen schrijver den naam van *Impetigo* draagt.

Algemeene
eigenaardig-
heden.

J. P. FRANK en anderen hebben alle slepende
III Deel. G huid-

huidziekten in het algemeen den naam van *Impetigo* gegeven, in onderscheiding van de heete huidziekten, *Exanthemata* genoemd. R. WILLAN was ook hier weder de eerste, die aan deze verwarring een einde maakte, door aan eene soort der puistige huidziekten den naam van *Impetigo* toe te kennen. Bijna alle hem opvolgende schrijvers over de huidziekten hebben die indeeling, gelijk ook hier geschiedt, aangenomen.

- Verdeeling.
1. *Impetigo figurata*. De afgeperkte natte roof. (*Herpes crustaceus flavescens*, *Aliberti*).
 2. *Impetigo sparsa*. De verstrooide natte roof.
 3. *Impetigo larvata*. De momvormige natte roof.
 4. *Impetigo erysipelatodes*. De roosaardige natte roof.
 5. *Impetigo scabida*. De korstige natte roof.
 6. *Impetigo rodens*. De knagende natte roof.

I.) *Impetigo figurata*. De afgeperkte natte roof.

Bepaling. Groepsgewijs uitbottende en samenhangende puistten in ronde of eironde plekken, die van elkander afgezonderd zijn, en eenen grooteren of kleineren omtrek des ligchaams bedekken.

De geheele oppervlakte des ligchaams kan de zetel van dezen uitslag zijn; meerendeels echter komt dezelve in het aangezicht, de bovenste ledematen en de dijen voor. Noch leeftijd, noch geslacht,

flacht, noch jaargetijden beveiligen tegen deze ziekte. Bij kinderen, gedurende de tandontwikkeling; bij jonge lieden, gedurende het manbaar worden; bij voorwerpen van het vrouwelijk geslacht, die eene zeer teedere en fijne huid hebben; bij lieden, die aan scrophuleuze aandoeningen lijden, en bij personen van het bloedrijke en phlegmatische temperament is de voorgeschiktheid meer dan bij anderen ontwikkeld.

De *impetigo figurata* komt als eene heete ziekte voor, met een tijdsverloop van drie tot vier weken; of zij neemt de slepende geaardheid aan en wordt zeer langdurig, doordien van tijd tot tijd nieuwe uitbottingen plaats grijpen. Somwijlen geschiedt zulks ieder voorjaar, jaren achter elkander.

Niet altijd, doch meerendeels, wordt de uit- Voorboden.
botting gedurende eenige dagen door spanning der huid en lastige jeukte voorafgegaan, spoedig gevolgd door glinsterende roodheid en hitte; een gevoel van kwalijkbevinden en hoofdpijn zijn aanwezig; de eetlust ontbreekt, en de spijsvertering geschiedt gebrekkig.

Binnen den tijd van een tot drie dagen, botten Beloop en
op de kring- of eivormige roode vlekken kleine toevallen.
gele, platte, weinig boven de huid verhevene puisten uit. Zij behooren tot de *psudraciae*, vloeijen spoedig door nieuwe uitbottingen groeps- wijze ineen, of blijven, waar deze geene plaats hebben, afgezonderd staan, en zijn door eenen rooden ring omgeven. De uitbotting, zoowel als

de voortgaande ontwikkeling van dezen uitslag gaat met spanning, pijn en hevige jeukte gepaard. Reeds na verloop van weinige dagen bersten de puisten en ontlasten eene groote hoeveelheid van een dun, geel, kleverig ettervocht, dat in den tijd van weinige uren tot brosfe, halfdoorschijnende korsten verdroogt. Deze zijn geel van kleur, en hebben eenige gelijkenis met uitgedroogde honigraten en met de gom, die op de takken der kerfen- en pruimboomen uitzweet. De voortdurende afscheiding der vochten onder de roven, doet deze in omtrek toenemen en tot de dikte van eenige lijnen aangroeijen. De omtrek der korsten is rood en ontstoken, en op denzelfden botten van tijd tot tijd enkele puisten uit. Neemt men de roven weg, dan vindt men eene roode, ontstokene, van hare opperhuid ontbloote huidvlakte, die door eene menigte fijne poriën vochten uitzweeten. Onaangeroerd, aan zich zelven overgelaten, blijven de korsten met geringe veranderingen van twee tot vier weken in denzelfden toestand, pleksgewijs afvallende, naar mate de vochtasscheiding onder dezelve heeft opgehouden. De blootkomende huiddeelen zijn droog, rood, glinsterend en zeer gevoelig; door herhaalde afschilfering der opperhuid verdwijnen de sporen des uitlags, zonder likteekens terug te laten. Niet altijd volgt de *impetigo figurata* dit regelmatige beloop, maar er grijpen van tijd tot tijd nieuwe uitbottingen plaats, die aan dezelve eene slepende geaardheid geven. Het weeffel der huid en het daaronder gelegen cel-

wijs-

wijsweeffel ontaarden; er ontstaan kloven en zwe-
ren van aanzienlijken omvang, die zich met kor-
sten bedekken, meermalen afvallen, maar telkens
op nieuw gevormd worden. In het aangezigt,
vooral bij kinderen, komt de *impetigo figurata*,
met uitfluiting der wangen, menigwerf in eene
eigenaardige wijziging voor. Op de oogleden,
op de bovenlip, onder den neus, aan de hoeken
der neusvleugels en rondom de kin ontwikkelt
zich de ziekte slechts in eenen kleinen omtrek; de
korsten worden spoedig droog en hard, blijven
lang vastzitten, en worden telkens op nieuw ge-
vormd, tot dat zij afgestooten worden door op-
drooging der uitzweetende vochten. Bij kinderen
komt deze wijziging der *impetigo* onder den naam
van rozijnenbaard (*Impetigo figurata faciei*) me-
nigvuldig voor, en is ligter van geaardheid en
korter van duur, dan die wijzigingen, welke on-
der de benamingen van *dartre crustacée stalacti-
forme* (*Herpes crustaceus procumbens*) en *dartre
crustacée en forme de souris* (*Herpes crustaceus
musciformis*) door ALIBERT beschreven zijn.

II. *Impetigo sparsa*. De verstrooide natte roof.

Alleen door hare uitwendige gedaante, onder-
scheidt zich deze van de voorgaande wijziging der
impetigo. De puisten komen met onregelmatige
plekken van elkander afgezonderd op één deel,
of over meer van elkander afgelegene deelen te
voorschijn. De uitbotting, ontwikkeling en het

verdere beloop der puisten heeft op dezelfde wijze plaats; dezelve jeuken hevig, bersten spoedig, en de verdroogende vochten vormen dunne, gele roven. De *impetigo sparsa* komt het meest in het najaar voor, duurt den geheelen winter voort en verdwijnt in de lente, zoodra het jaargetijde gunstiger wordt. Zij komt op alle deelen des lichaams, doch meerendeels aan de onderste ledematen vóór. Zij is hardnekkiger en lastiger dan de *impetigo figurata*: bij oude, zwakke, kwaadsappige lieden; bij hypochondristen en hysterische vrouwen ontaarden de geopende puisten en ontvellingen ligtelijk in diepe, onregelmatige zweren, met paarsche randen; gelijktijdig grijpt er zuchtige zwelling der beenen plaats.

III. *Impetigo larvata*, *Crusta lactea*, *Lactumina*. Melkkorst. Dauwworm.

Algemeene
geaardheid.

In deze gedaante tast de *impetigo* voornamelijk het aangezicht en het hoofd aan, zonder echter de andere deelen te verschoonen. Zij is uitsluitend aan den kinderlijken leeftijd eigen; maar komt, offchoon zelden, in meer gevorderden leeftijd, bij volwasfenen — echter alleen als overblijffel uit de kindschheid — voor; niet meer als eene eenvoudige, maar als eene met de andere *impetigo*-soorten, met *eczema* en met *porrigo favosa* zamengefelde huidziekte.

De geelbruine kleur der korsten en roven, gelijkende naar op het vuur uitgedroogde melk, heeft aanleiding gegeven, deze ziekte *crustea lac-*

tea

tea, melkkorst te noemen; terwijl de uitbreiding der korsten over een gedeelte of over de gansche oppervlakte van het aangezigt, als of hetzelfde met eene maske of mom bedekt ware, de benaming van *impetigo larvata*, de momvormige natte roof heeft doen ontstaan.

Men onderscheidt de drie volgende wijzigingen:

- a.) *Crusta lactea*. Melkkorst.
- b.) *Crusta serpigiosa*. Dauwworm.
- c.) *Crusta lactea puerperarum*. Melkkorst der kraamvrouwen.

- a.) *Crusta lactea*, *Lactumina*. (*Tinea muciflua faciei*, *Tinea mucosa*, *Aliberti*) Melkkorst.

Reeds eenige dagen vroeger dan de uitbotting plaats grijpt, krijgt een of ander deel des aangezigts, vooral de wangen en het voorhoofd eene hoogroode, glinsterende kleur; de opperhuid is op die deelen droog, schilferachtig en door ondiepe lijnen in straalsgewijze rigtingen gegroefd. Op deze met hitte en geringe jeukte gepaarde vlekken, botten de *impetigo*-puisten, met geringe zwelling van het aangezigt, groepsgewijs en dicht bij eikander staande uit. Zij vloeijen spoedig ineen, en bersten binnen twee tot drie dagen, zoo zij niet reeds vroeger door de lijders worden opengekrabd. De ontlaste vochten hebben eenen laffen, onaangename reuk en verdroogen tot geelbruine korsten, die door telkens bijkomende puisten eene grootere uitbreiding erlangen, eerst enkele

Beloop en
toevallen.

deelen , later het geheele aangezigt , met uitzondering van de oogleden en den neus , bedekken , even alsof (gelijk JAHN zegt) het geheele aangezigt met roven van de zamenvloeiende kinderpokken bedekt ware. De eerst dunne roven worden door de voortdurende afscheiding en verdrooging der vochten dikker , zijn door roode randen omgeven , en groeijen tot harde , brosfe korsten aan ; deze scheuren en bersten , en brokkelen hier en daar af. De blootkomende huid is rood en gelijk aan het *eczema* , met eene menigte fijne gaatjes voorzien , uit welke aanhoudend eene groote hoeveelheid weiachtig vocht zijpelt , dat tot nieuwe roven verdroogt of de reeds aanwezige tot korsten verdikt. Somwijlen komen hier en daar grootere , naar *ecthyma* gelijkende etterpuisten te voorschijn , voornamelijk in de kuilen achter de ooren en rondom den mond , die zeer veel vocht van zich geven , en meer dan gewoon dikke korsten vormen. Alhoewel de neus en de oogleden gewoonlijk vrij blijven , zoo gebeurt het toch somwijlen , dat ook deze deelen aangetast worden , en zelfs het bindvlies der oogleden en des oogbols in de ontsteking deel nemen , dicht kleven en met moeite zijn open te houden , — zonder dat echter het oog daarbij lijdt , noch het gezigt in de gevolgen benadeeld wordt.

De witte sprouwachtige puisten , welke op de lippen en in de mondholte voorkomen , zijn of eene complicatie met sprouw , of de beginselen van waterkanker , of het gevolg van gebruikte kwikbe-

bereidingen, en geenszins eene uitbotting der melkkorst op die deelen.

Meermalen gebeurt het, dat het behaarde hoofd aangetast wordt, en de uitslag zich van het aanzigt over den hals en de borst uitbreidt, of ook wel op de vóorarmen, de dijen, zelden op andere ligchaamsdeelen, uitbot. In deze gevallen kan de ziekte niet meer den naam van melkkorst dragen; want zij gaat op het hoofd in *porrigo favosa* over, en behoort op de andere deelen tot de *impetigo figurata* en *sparsa*.

Veelal gaat de melkkorst met scrophuleuze ongesteldheden gepaard; de watervaatklieren aan den hals zijn alsdan gezwollen, hard en pijnlijk, of het geheele watervaatstelsel neemt daarin deel, de verrigtingen der darmfcheelklieren worden gestoord, de chyl wordt slecht toeberied; er ontstaan uitputtende buikloop, spoedig toenemende vermagering en uitputting der krachten.

De melkkorst is eene koortsvrije ziekte; echter kan het gebeuren, dat de aanhoudende jeukte en onrust der lijders, het vaatstelsel medelijdend tot koortsachtige reactie opwekt. Zoo kan ook het groote verlies van weivochten heftische koortsbewegingen veroorzaken. Overigens kunnen als complicatiën alle koortsen bij de melkkorst voorkomen. Doorgaans is de spijsvertering goed, maar de buiksonstlasting traag, de urin melkachtig wit met eenen eigenaardigen reuk, niet ongelijk aan dien van de urin der katten.

b.) *Crusta serpiginosa*. Dauwworm.

Nog voortdurend blijven de gevoelens der geneeskundigen over het bestaan en de geaardheid van deze ziekte verdeeld. Terwijl de eene dezelve voor eene wezenlijk op zich zelve bestaande huidziekte, van alle andere in liet aangezigt voorkomende verschillende, beschouwen, zijn er anderen, welke haar voor eenzelvig met de *crusta lactea* en *impetigo figurata* en *sparsa* houden, ten hoogste een trapsgewijs verschil toegeven en de *crusta serpiginosa* als de zwaarste gevallen van *crusta lactea* aanzien. De Fransche en Engelsche Schrijvers over de huidziekten, maken er weinig of geen gewag van; de Duitschers daarentegen, vooral sedert WICHMAN het wezenlijk onderscheid van beide die ziekten in zijne diagnostiek heeft aangewezen, houden het afzonderlijk bestaan van beide ziekten vast.

Waarschijnlijk komt het mij voor, dat de *impetigo figurata* en *sparsa*, die in het aangezigt voorkomt, de *crusta lactea* en de *crusta serpiginosa* zeer na aan elkander verwante ziekten zijn, die zich alleen dan van elkander laten onderscheiden en erkennen, wanneer zij in hun oorspronkelijke gedaante volkomen zuiver ontwikkeld zijn; maar dat in verreweg de meeste der voorkomende gevallen, onderlinge complicatiën plaats vinden, welke het eigendommelijke aan de ziekteverschijnselen ontnemen en wijzigingen doen geboren worden, welke het hoogst moeilijk maken

ken stellig te bepalen, met welke van de drie ziekten men te doen heeft.

De *crusta serpiginosa* of dauwworm komt menigwerf bij zuigelingen, menigvuldiger na het sphen en niet zelden bij volwasfenen voor. De ontwikkeling en het beloop dezer ziekte hebben op dezelfde wijze plaats als bij de *crusta lactea*, maar met meer hevigheid en met dat onderscheid, dat de neus en de oogleden niet vrij blijven, de puisten kleiner en minder boven de huid verheven zijn dan bij de *crusta lactea*, eene gele of licht-bruine kleur hebben en buitengewoon jeuken, hetwelk de lijdens tot onophoudelijk krabben met de handen en tot schuren met het aangezigt op het beddegoed of de kleeding, wanneer hun de handen gebonden worden, noodzaakt. De afscheiding der weivochten, wordt daardoor zeer vermeerderd, en gelijktijdig ontlast zich uit de opengeretene huidvaatjes veel bloed. Deze vochten zijn zeer fcherp, en verwekken ontvellingen op die deelen, langs welke zij afvloeijen. Onder de spoedig loswordende en afvallende roven is de huid rood en ontstoken, en uit talrijke gaatjes zweeten de vochten en bedekken de oppervlakte als met dauwdroppels. Telkens op nieuw plaats grijpende uitbottingen hebben ten gevolge, dat zich deze ziekte, voortkruipende over eene veel grootere oppervlakte uitbreidt en zeer langdurig wordt, zoodat er maanden en jaren verloopfen, alvorens de genezing tot stand komt. Twee gevallen heb ik gelegenheid gehad waar te nemen, die

van het tweede tot het zestiende en achttiende levensjaar voortduurden; al dien tijd waren het aangezigt, het hoofd en den hals tot op de schouders met roven bedekt. In beide gevallen werden de lijders eindelijk door de natuur genezen. De eene, thans een gezonde, sterke man, oefent het beroep van voermansknecht uit, en verduurt al de moeilijkheden met dien stand verbonden.

Niet altijd is de afloop in langdurige gevallen gunstig: slapelooze nachten, gebrek aan de noodige rust, het groote en aanhoudende verlies van vochten, putten de krachten allengskens uit, de lijders vermageren, van tijd tot tijd grijpt er buikloop plaats en ontwikkelt zich een hectische toestand. Met scrophuleuze aandoeningen gepaard gaande, zwellen de oksel- en liesklieren, en er ontstaan kwaadaardige zweren. In dusdanige gevallen neemt de ziekte somwijlen een doodelijk einde.

c.) *Crusta lactea puerperarum*. De melk-
korst der kraamvrouwen.

Deze zeer zelden voorkomende uitslag schijnt met stoornissen in de zogaffcheiding, gebrekkige kraamzuivering en gastrische ophooping in een oorzakelijk verband te staan. Niet alleen het aangezigt, maar ook andere deelen des ligchaams worden er door aangetast: op eene ligt ontstokene en gezwollene oppervlakte botten geelwitte puisten uit, die hevig jeuken, spoedig bersten en tot roven verdroogen. De gewone duur is van veertien da-

dagen tot drie weken; doch langer, wanneer er complicatiën met andere ziekten plaats vinden. Aanwezige fcherpten geven tot diep invretende, langdurige zweren aanleiding. Wordt de uitflag door eene ondoelmatige verpleging en behandeling in zijne ontwikkeling tegengewerkt of in zijn be-loop onderdrukt, dan kunnen er verplaatsingen volgen, vergezeld met ftuipen, beroerte en ontstekingen der ingewanden. Bij koortfen van een bepaald karakter komt deze uitflag ook kritisch voor; — in alle voorkomende gevallen vordert dezelve groote oplettendheid.

IV. *Impetigo erysipelatodes*. De roos-aardige natte roof.

In deze wijziging gaat de natte roof in haar begin met de gewone verschijnselen der roos gepaard. Het aangezicht is rood en opgezet, onder de oogen zuchtig gezwollen; — koortsachtige aandoeningen geven zich te kennen door afwisselende koude rillingen en vliegende hitte; de verrigtingen van de werktuigen der spijsvertering zijn meer of minder gestoord. De aangedane huidoppervlakte is minder glad dan bij de roos, maar ruw. De spoedig uitbottende puisten zijn genoeg gekenschetst, om dezelve van de groote onregelmatige blazen op de sterk gezwollene en hooggekleurde huid bij de roos aanwezig, te onderscheiden. De uitbotting gaat met pijn en jeukte gepaard, grijpt het eerst onder de oogen plaats, breidt zich spoedig over het grootste gedeelte des aangezigts, somwijlen

len ook over den hals en de borst uit. De vloeistof, die de puisten bij het bersten ontlasten, is zeer scherp, verwekt hevige jeukte en geeft tot pijnlijke ontvellingen aanleiding. Eerst na verloop van acht tot veertien dagen vermindert de vochtontlasting, de toevallen bedaren, en dunne gele roven bedekken de lijdende oppervlakte. Tusschen deze roven grijpen telkens nieuwe uitbottingen van puisten plaats, met verheffing der eerst bedaarde toevallen, en maken deze ziekte langdurig, zoodat er twee tot drie maanden verloopen, voor de roven afvallen. Op de gewone roode vlekken blijft de opperhuid droog en ruw; zij scheurt en schilfert af. Men vindt lieden, bij welke deze ziekte bij herhaling in het voor- of najaar terug komt. Somwijlen paart zij zich met de andere soorten der *impetigo*, en breidt zich over een groot gedeelte des ligchaams, en, gelijk BATEMAN gezien heeft, van het hoofd tot de voetzolen uit.

V. *Impetigo scabida*. De korstige
natte roof.

Deze is de zwaarste, langdurigste, echter ook de zeldzaamste soort der *impetigo*. Zij schijnt uit eene eigenaardige verbastering der vochten voort te komen, waarschijnlijk gegrond in de vereeniging der syphilitische en leproze smetstoffen.

De *impetigo scabida* tast uitsluitend de ledematen aan, en bedekt een of meer van dezelve, met dikke, geelachtige korsten als de schors van eenen boom, de beweging der lijdende deelen wordt er
door

belemmerd en zeer pijnlijk, verbonden met ondragelijke jeukte en pijn. Gelijk bij de andere wijzigingen der *impetigo* ontstaan de korsten door uitzweeting en verdrooging van kleverige vochten, gewoonlijk eerst drie of vier weken na de uitsetting. De volkomen gevormde korsten bedekken den geheelen arm van den elleboog tot aan den handwortel, en van de knie tot aan de enkels en de voetzolen. Somwijlen breiden zij zich over de vingers en de teenen uit; de nagels nemen dan in de ziekelijke aandoening deel, bederven, worden dik, onregelmatig van gedaante en buigen om even als bij de *lepra* en de *psoriasis*, vallen af, en de nieuwe uitgroeiende ondergaan dezelfde veranderingen. De eerst geelachtige korsten nemen eene donkere, roodblauwe, ten laatste eene grijze kleur aan, bersten, scheuren, krijgen kloven en vallen bij gedeelten af. Op de ontbloote huiddeelen worden de scherpe weivochten overvloedig afgescheiden; deze droogen spoedig op tot nieuwe roven, welke de ledige ruimten en kloven aanvullen en de overgeblevene korsten laagsgewijze verdikken. Aan de onderste ledematen is deze ziekte het hardnekkigst, verwekt zuchtige zwellingen, en ontaart menigwerf tot diep invretende kwaadaardige zweren.

VI. *Impetigo rodens*. De knagende natte roof.

Ook in deze wijziging behoort de *impetigo* tot de zeldzaamste, hardnekkigste en kwaadaardigste
soor-

soorten. Volgens BATEMAN is dezelve waarschijnlijk van eene kankerachtige geëardheid. Deze ziekte begint met groepsgewijs vereenigde puisten, gemengd met spoedig berstende blaasjes, uit welke, even als uit eene menigte kleine gaatjes, gedurende eenen geruimen tijd eene groote hoeveelheid vochten uitzijpelt, en vervolgens tot onregelmatig gevormde korsten opdroogt. Zelden is de geheele oppervlakte der lijdende deelen, maar alleen derzelve midden door korsten bedekt met zwerende randen, die de huid wegknagen, en tot in het celweeffel doordringen. De deels met roven bedekte, deels door diepe zweren weggeknaagde, door tusschengelegene ontaarde huidstroken van elkander afgescheiden, lijdende huiddeelen, geven aan deze ziekte een hoogst afzigtelijk aanzien. Groote gevoeligheid en hevige pijnen gaan er mede gepaard. Gewoonlijk heeft deze ziekte aan de zijde van den tronk haren zetel en breidt zich allengskens meer en meer uit. BATEMAN zegt: geen voorbeeld van deze ziekte gezien te hebben, en voegt daarbij: dezelve zal, gelijk men zegt, altijd doodelijk zijn, en geene geneesmiddelen, noch uit- noch inwendige, zijn met gelukkig gevolg gebruikt. Naar het mij toefschijnt, kan deze ziekte zoo zeldzaam niet zijn, als velen beweren; althans ik heb gelegenheid gehad, dezelve drie maal waar te nemen, en wel telkens bij vrouwen. Twee stierven in gevorderden leeftijd door krachtnitputting, na jaren geleden te hebben; de derde is in den loop van dit jaar aan eene beklem-

klemde breuk overleden, nadat kort te voren alle zweren genezen waren. Vier jaren lang had zij zonder vrucht vele geneesmiddelen gebruikt. Van tijd tot tijd genazen wel eenige zweren, maar werden telkens door nieuwe vervangen. Waarschijnlijk zoude ook deze lijderes door krachttuitputting ten laatste bezweken zijn. Het verdient, mijns bedunkens, opmerking, dat deze drie voorwerpen van het vrouwelijk geslacht waren, en dat bij allen, deels door eigene onregelmatige leefwijze, deels door die der ouders, verdenking van venerische besmetting bestond, terwijl zij tevens aan scrophuleuze aandoeningen en kwaadaardig hoofdzeer leden.

Behalve de dus verre afgehandelde wijzigingen der *impetigo*, vindt men nog gewag gemaakt van de *impetigo rorans*, de dauwaardige natte roof, dus genaamd wegens de groote hoeveelheid weivochten, die droppelsgewijs uitzweeten en de lijdende deelen als met dauw overdekken. Daar zij overigens geene kenfchetfende verschijnselen oplevert, kan zij niet als eene bijzondere foort, maar alleen als eene wijziging der andere foorten, beschouwd worden. Die foorten toch komen niet altijd fcherp gekenfchetst voor, maar vereenigen veeleer met elkander verschijnselen en toevallen, welke aan verschillende foorten toebehooren; zoodat zij tusfchenfoorten en wijzigingen daarstellen, die de overgangen van de eene in de andere aanwijzen, en welke men zich wel wachten moet voor nieuwe foorten op te nemen.

Daar de *impetigo* in het algemeen aan geen vast Duur.
 III. Deel. H be-

beloop gebonden is , zoo laat zich haar duur niet nauwkeurig bepalen. Eene heete geaardheid hebbende , kan zij binnen drie tot vier weken tot genezing komen , heeft zij daarentegen van haar begin af eene meer slepende geaardheid te kennen gegeven , dan verloopen er maanden , somwijlen jaren , voor zij haar einde bereikt. Haar duur is langer , wanneer zij met andere ziektegesteldheden , vooral de scrophuleuze verbonden is ; korter , waar zij geheel op zich zelve staat. De *impetigo figurata* , de *sparsa* , en van de *larvata* , de melkkorst , verloopen binnen drie tot vier weken , maar zijn genegen meermalen in het voor- en najaar terug te keeren. De *impetigo erysipelatodes* rekt haren duur van twee tot drie maanden ; de *crusta serpigiosa* duurt maanden en jaren ; de *impetigo scabida* is buitengewoon langdurig ; de *rodens* duurt levenslang voort.

Oorzaken

De aanleg of voorgeschiedheid , om door *impetigo* aangetast te worden , is in het voor- en najaar meer dan in andere jaargetijden ontwikkeld ; zuigelingen en kinderen in het algemeen , vooral in het tijdperk der tandontwikkeling ; vrouwen in den leeftijd , waarin de maandstonden achterwege blijven ; lieden van de lymphatische en sanguinische temperamenten , zij , die eene fijne huid en frische aangezigtskleur hebben , bezitten eene grootere voorgeschiedheid dan anderen. Ook kan de aanleg der ouders op de kinderen overerven ; met de *crusta lactea* althans schijnt het zeker te zijn ; want men ziet doorgaans , dat kinderen , wier ouders die ziekte gehad hebben , wanneer zij een

zeker levenstijdperk bereikt hebben, met zeldzame uitzonderingen er door aangetast worden. Ook zijn kinderen van scrophuleuze ouders geboren, meer dan andere aan die ziekte onderhevig.

De toevallige oorzaken kunnen in enkel uitwendige schadelijkheden gelegen zijn: de langdurige bearbeiding van scherpe zelfstandigheden, waardoor de huid van hare opperhuid ontbloot wordt, kan eene ligte soort van *impetigo* bewerken. Onmatigheid, overtollige voeding, de krachten overschrijdende ligchamelijke inspanningen en hevige gemoedsaandoeningen, vooral vrees en verdriet, begunstigen menigwerf de ontwikkeling dezer ziekte; nog meer echter vochtige, ongezonde woningen, gebrek aan de noodige reinheid, het gebruik van bedorvene voedingsstoffen en die gesteldheden der bewerktuiging, welke onder de benaming van scherpte en vochtverbastering bekend zijn. De gelegenheid gevende oorzaken der *impetigo larvata* in hare verschillende wijzigingen heeft men gezocht in congestiën naar het hoofd, in overmatige voeding, bij zuigelingen in het gebruik van oud en vet zog, in verwaarloozing en onreinheid, in het tandenkrijgen, in het gebruik maken van scherpe waschwaters, in zuur, verslijming en ophooping in de eerste wegen, in de slechte toebereiding van de chijl en van het bloed. Wanneer men echter in aanmerking neemt, — waartoe zich aan den practischen geneesheer dagelijks de gelegenheid aanbiedt, — dat niet alleen kwalijk gevoede en slecht verpleegde, maar dat ook op de doelmatigste wijze in allen deele verzorgde, gezonde,

de, sterke en vette, zoowel als magere, zwakke en uitgemergelde kinderen, aangetast worden; wanneer wij zien, dat zoowel kinderen, die met zog, als die, welke met andere voedfels opgekweekt worden, dat zelfs onder de kinderen van dezelfde ouders, onder gelijke omstandigheden levende, en op eene en dezelfde wijze verpleegd, het eene aangetast wordt en het andere verschoond blijft; — wanneer men verder ziet, dat de *impetigo larvata*, bij eenige familiën zich nimmer voordoet, terwijl in andere geen kind verschoond blijft, dan is het beter te erkennen, dat ons de voortbrengende oorzaken dezer ziekte zoo niet geheel, dan toch grootendeels onbekend zijn, en geen en veiligen leidraad aan de hand geven om de geneeskundige behandeling te besturen. Het gevoelen van WENDT, namelijk, dat wanneer eene en dezelfde minne twee of drie kinderen achtereenvolgend laat zuigen, het laatste steeds door de melkkorst zoude aangetast worden, wordt door de dagelijksche ervaring tegengesproken.

Naaste oorzaak.

In het algemeen schijnt de naaste oorzaak der *impetigo* in eigenaardige ziekelijke gesteldheden der bewerktuiging, en des huidweeffels in het bijzonder gegrond te zijn. Wij kennen, even als dit bij de meeste andere huidziekten het geval is, derzelver bestaan uit de gewrochten, maar geenszins door opsporing der stoffelijke geaardheden. Bij de *crusta lactea* en *serpiginosa* bestaan gelijktijdig, hetzij verworven of geërfd, stoornissen in de reproductieve verrigtingen, meerendeels met scrophu-

leuze.

leuze aandoeningen gepaard. Zelden ziet men lijders, bij welke hoegenaamd geene scrophuleuze toevallen voorkomen; de buitengewone vetheid, bij die lijders menigwerf waar te nemen, behoort tot de kenteekenen, die de aanwezigheid der scrophuleuze scherpte verraad.

Of de *impetigo*-soorten zich door eene eigene smetstof aan gezonden kunnen mededeelen en voortplanten, is hoogst onwaarschijnlijk. Omtrent de *crusta lactea* en *serpiginosa* stemmen de meeste moeders in het gevoelen van besmettelijkheid overeen, waarom zij met de grootste zorgvuldigheid alle kleedingstukken, welke hare, door die ziekte aangetaste kinderen gedragen hebben, vernietigen; en in der daad, het is niet te ontkennen, dat er gevallen voorkomen, die in deze voor de plaats gehad hebbende besmetting pleiten.

De *impetigo* is geene gevaarlijke, het leven regt-Voorzeggingstreeks bedreigende ziekte, maar walgelijk, lastig en hoogst onaangenaam. Men wachte zich voor eene te gunstige voorzegging, want vaak worden de vooruitzigten op spoedige genezing te leur gesteld; onder de schijnbaar gunstigste omstandigheden neemt de ziekte eene slepende geëardheid aan; toevallig bijkomende schadelijkheden kunnen tot gevaarlijke complicatiën aanleiding geven, en de ontijdige opdrooging des uitslags ontstekingen en andere aandoeningen der ingewanden verwekken. Men heeft geene spoedige genezing te wachten: wanneer de ziekte reeds verouderd, of bij herhaling is wedergekeerd; wanneer de lijders door kwaadsap-

pigheid zijn aangetast, door hoogen ouderdom of buitensporige leefwijze zijn uitgeput. De genezing mag men verwachten: wanneer de uitzijpeling der vochten afneemt, en mitsdien de korsten droog worden; wanneer de laatste, afvallende, door steeds dunner plaatjes worden vervangen, terwijl de huid op de plaatsen, waar de korsten zijn afgevallen, alsmede in derzelver omtrek, bleeker wordt, en er eindelijk geene nieuwe korsten meer ontstaan.

De *impetigo figurata*, *sparsa* en *larvata* worden in de eerste gevallen door de natuur alleen, zonder ondersteuning der kunst, genezen. Door ontijdige en te active hulpbieding wordt de natuur in de ontvouwing harer geneeskrachten bemoeijelijkt, en er wordt zoowel tot gedaantewisselingen, als tot verplaatfing naar inwendige deelen aanleiding gegeven, hetwelk het leven in gevaar kan brengen. Lijders, door de *impetigo* aangetast, worden bijna nimmer, namelijk zoo lang deze ziekte duurt, door kinderpokken, mazelen, of roodvonk besmet; de inenting der eersten slaagt zelden op eene voldoende wijze, maar geeft tot langdurige zweren aanleiding. In het algemeen schijnen *impetigo*-lijders zeldzaam door andere ziekten te worden aangetast; waar dit echter plaats heeft, wordt de uitflag spoedig droog of verdwijnt, en de bijgekome ne ziekten volgen een min gunstig beloop. Ook wil men opgemerkt hebben, dat kinderen, die in hunne jeugd aan melkkorst of dauwworm geleden hebben, zeer fchoon

schoon worden en de meest regelmatig gelaats-trekken bekomen.

De groepsgewijze of verstrooide ontwikkeling van *psydracische* puisten, gevolgd door dikke, ruwe, gele, roodbruine, brosse, korstige roven, zijn gewoonlijk toereikend om de *impetigo* van de andere puistige en van de blaasvormige huidziekten te onderscheiden. Onderseheidskennetee-
kenen. (Dia-
gnosis.)

Mentagra, sycofis. Bij deze zijn de puisten grooter, korrelachtig van elkander afgezonderd, meer verheven en donkerder van kleur, dan bij de *impetigo*; zij zijn gewoonlijk alleen tot het behaarde deel des aangezigts beperkt; de vochtaffcheiding is geringer, er ontstaan geene korsten, maar kleine, ronde roven.

Porrigo of *Tinea Lupinosa*. De enkel staande puisten liggen dieper in de huid, verheffen zich naauwelijks boven dezelve, geven een kleverig vocht van zich, dat spoedig tot ligtgele, drooge, bekervormige korsten overgaat. Deze ziekte is besmettend en doet de haren uitvallen. Bij eenige oplettendheid kan dezelve evenmin als de volgende met *impetigo* verwisfeld worden.

Porrigo of *Tinea Scutulata*. De puisten zijn talrijker, staan dicht bij elkander, vloeijen in een, en vormen groote, dikke, bolronde, boven de huid verhevene korsten. Ook deze ziekte is besmettend en doet de haren uitvallen.

Daar de oorzaken der *impetigo* meerendeels in het verborgen schuilen, zoo is men zelden in de gelegenheid dezelve regtstreeks te bestrijden. Waar

Geneeskundi-
ge behande-
ling.

uitwendige schadelijkheden aanwezig zijn, welke door hare scherpte de huid prikkelen, den uitslag opwekken en onderhouden, trachte men dezelve uit den weg te ruimen; men zuivere de huid van alle onreinheden door warme waterbaden en waschingen, late het linnengoed dikwijls verwisfelen, en alle kleedingstukken rein houden. Men ont-rade den lijder de bearbeiding van zelfstandighe-den, welke, met de huid in aanraking komende, deze door hare scherpte aandoen. De inwendige behandeling befture men volgens de voorschriften der algemeene ziektekunde. In het eerste tijdperk der ziekte, gedurende de uitbotting en ontwikke-ling des uitlags, zoo lang de huid in eenen ge-prikkelden toestand verkeert, ontftoken en zeer pijnlijk is, handele men antiphlogistisch. Bij jonge, volbloedige, even min door andere ziek-ten, als door onregelmatige leefwijze uitgeputte lieden, met eenen harden en vollen pols, kan eene aderlating noodig en nuttig zijn tot inleiding der behandeling; bloedontlastingen door bloedzuigers of koppen zijn daár aangewezen, waar de ont-fteking plaatselijk beperkt is zonder algemeene te-rugwerking. Inwendig geve men de verkoelende middenzouten, *nitrum*, *cremor tartari*, enz. Zijn er gastrifche ophoopingten aanwezig, dan moeten dezelve door braak- of lakfeermiddelen op-geruimd worden. Bij mindere ontwikkeling der ontfteking, trage buiksontlasting en werkeloosheid der huid, moet men gene bevorderen en deze op-beuren: de *cremor tartari* verbonden met *flores*
ful-

sulphuris en *antimonium* zijn alsdan aangewezen, met bijvoeging van rhabarber of jalappe, naar mate men meer afleiding naar het darmkanaal bedoelt, en de buiksondasting bevorderen wil. Gedurende het geheele beloop der ziekte is het noodig van tijd tot tijd een lakseermiddel te geven. Zoodra de uitslag volkomen tot stand is, en dien ten gevolge de opgewekte wederwerking der huid, zoowel als de toevallen der algemeene ontsteking geweken zijn, en door het langer volhouden der ontsteking-werende geneeswijze de ziekte in haar verder beloop zoude gestoord worden, verwisfele men dezelve met afkookfels van het guajac-hout, sassafras, sassaaparilla-wortel, de *dulcamara*-ranken en het kruid der driekleurige violen. Vooral het laatste verdient aanprijzing, want niet alleen in de melkkorst en den dauwworm, maar in al de andere *impetigo* soorten — de *scabida* en de *rodens* uitgezonderd — bezit hetzelfde uitmuntende geneeskrachten. Indien de afscheiding der weivochten op de aangedane deelen zeer overvloedig is, en deze duurzaam nat blijven, zoodat de verdrooging tot roven en korsten in het geheel niet, of zeer onvolkomen plaats heeft, terwijl de krachten afnemen, teekenen van kwaadsappigheid te voorschijn treden en koortsbewegingen aanwezig zijn, is het raadzaam tot het gebruik der kina in afkookfels of extract met minerale zuren over te gaan. Bij ontbrekenden eetlust, kwijnende spijsvertering en trage buiksondasting, doen de zwa-

vel.

velbleemen , verbonden met het poeder van den gentiaanwortel , goede diensten.

Niet altijd slaagt men , door opvolging der aangewezenen behandeling , in de genezing ; er komen niet alleen gevallen voor , die hardnekkig tegenstand bieden , maar waarin de uitslag voortgaat , zich meer en meer uit te breiden. De bereedene geneeswijze heeft alsdan gewoonlijk hare grenzen bereikt , en de geneesheer zoekt het heil der lijders in de symptomatische en empirische geneeswijze. Bij geringe terugwerking des vaatstelsels , bij drooge en dorre huid , laat men dagelijks eenige glazen van een natuurlijk zwavelwater , met of zonder melk , gebruiken. De Engelschen gebruiken het water van *Harrowgate* , de Duitschers van *Aken* en *Nenndorf* , de Franschen die van *Barrèges* , *Enghien* , *Bouvines* , enz. Is de werkdadigheid der huid meer opgewekt , de uitslag zeer vochtig , en zijn het klier- en water vaatstelsel mede in het lijden betrokken , dan zijn de kwik- en antimoniaal-bereidingen , de driekleurige violen , de *hb. sabinæ* en de bittere extracta aangewezen. Ook de loogzouten kunnen alsdan inwendig beproefd worden. In de genezing nog niet slagende , bediene men zich van de *graphit* in dit voorschrift :

R. *Plumbaginis* dr. ii.
puly. gmm. arab. dr. i.
Extr. gentianæ q. s.
ut f. pil N^o. 60 consp.

puly.

puly. liquir.

D. S. 's morgens en 's avonds vijf pillen.

Grootere giften noodig achtende, geve men tweemaal daags tot eene halve drachma telkens, met suiker of siroop. De *graphit* behoort tot de langzaam werkende geneesmiddelen, waarmede men eenen geruimen tijd moet volhouden; en daar dezelfde geen schadelijken invloed op de bewerktuiging uitoefent, zoo kan zulks veilig geschieden. De Berlijnsche geneesheer HEIM heeft aan eene dame twee pond laten gebruiken, tot dat de genezing tot stand kwam.

Alles vruchteloos blijvende, zoo raden BIETT en GREEN het gebruik der *arsenik* bevattende tincturen van PEARSON en FOWLER aan. BIETT voegt er bij, dat de tinctuur van PEARSON eene spoedige en zekere genezing bewerkt.

De uitwendige behandeling vordert verschillende wijzigingen. In het eerste tijdperk der ziekte, met duidelijk ontwikkelde ontsteking, zijn alle prikkelende, uitwendige middelen schadelijk: zij vermeerderen de spanning, jeukte en pijn, zonder eenig nut te stichten, en begunstigen den overgang in de slepende geëardheid. Men bepale zich derhalve in het begin der ziekte tot baden, stovingen en wasschingen, naar gelang der deelen, welke met uitslag bezet zijn. Tegen zeer hevige jeukte en pijn, bezige men afkookfels van de slaapbollen, bilsenkruid, maluw of althea-bladen met *acidum hydrocyanicum*, ééne halve once op vier en twintig oncen vocht, of make gebruik van eene emulsie uit

uit bittere amandelen bereid, een zeer voldoende middel, veiliger dan het mengfel met *acidum hydro-cyanicum* te gebruiken. Verhindert de groote vochtigheid der lijdende deelen de opdrooging der korften, dan kan men met omzigtigheid tot middelen overgaan, welke de affcheiding der vochten matigen, en gebruik maken van de *aqua distillata sambuci* of *rosarum* met eene kleine hoeveelheid *acetum lithargyri*, van de zalven met *flores zinci* of *mercurius praecipitatus albus* en reuzel bereid. Verkeert de huid in eenen atonifchen toestand, bij groote hardheid en droogte der korften, dan zijn meer opwekkende en prikkelende middelen aangewezen, als daar zijn: de loog- en zwavelbaden, de zeebaden, eerst warm, later koud, en de berookingen met zwavel of cinnaber. Wanneer deze middelen niets baten, en de ziekte in haren fleependen loop blijft voortgaan, moet men de toevlugt nemen tot nog krachtiger middelen, gefchikt om de vitaliteit te veranderen en tot eene gewijzigde terugwerking aan te fporen. Alvorens tot die middelen over te gaan, is het noodig, de dikke en harde korften, vooral bij de *impetigo scabida*, door weekmakende pappen, omslagen, baden en inwrijvingen met olie of andere vette zelfftandigheden los te maken, en de zwerende oppervlakte te zuiveren. Hiermede geflaagd zijnde, kan men de oplosfing van fublimaat, één tot vier greinen op vier oncen water, tot betten en wafchen aanwenden, of men kan de zalf van de roode kwik-praecipitaat, één fcrupel tot ééne drach-

drachma op ééne once reuzel, de zalf uit twee drachma *graphit* met ééne once vet, dagelijks twee malen laten inwrijven. Andere geneeskundigen raden, de *graphit* met kwikmiddelen te verbinden; ten zij door de *graphit* met *unguent. neapolitanum*, in plaats van met vet te mengen, of het levende kwik met *graphit* dood te wrijven, of de laatste met *mercurius dulcis* te mengen en met vet tot eene zalf te maken. Waar eene nog sterkere opwekking gevorderd wordt, bedekke men de lijdende deelen met vliegenpleisters, onderhoude de verettering eenige dagen, en trachte dan de genezing door opdroogende middelen te bespoedigen. Ook hiermede niet slagende, wordt het bestrijken met *lapis infernalis*, of met eene oplossing van één tot vier greinen *nitras argenti* in ééne once gedistilleerd water opgelost, door middel van een penfeel of de veder eener pen, aangeraden. In de plaats dezer bijtmiddelen, heeft men ook het zeezoutzuur en het salpeterzuur aangewend. Bij het gebruik der laatste middelen, tracht men een te diep indringen te verhoeden, door de pas bestreken deelen bij herhaling met laauw water te begieten en af te spoelen.

Gedurende de geheele behandeling moet de lijder eene regelmatige leefwijze in acht nemen, alle scherpe en prikkelende spijsen en dranken achterwege laten, de noodige reinheid van ligchaam en kleeding onderhouden, en alle voorschriften der gezondheidsleer, zoo veel zijne omstandigheden toelaten, in acht nemen.

Daar

Daar van al de *impetigo* foorten geene zoo menigvuldig voorkomt als de *larvata*, zoo kan het niet ongepast zijn van hare behandeling in het bijzonder te spreken.

Crusta lactea. In de gewone, zeer talrijk voorkomende gevallen, waarin de melkkorst overigens welvarende kinderen aantast en in geen en deele hunne gezondheid benadeelt, volge men het voorbeeld der voornaamste geneeskundigen, en late de ziekte geheel aan de natuur over, besture den leefregel in dier voege, dat alle schadelijke invloeden vermeden, de lijder goed verpleegd en de reinheid in acht genomen worde. Zijn de korsten, die de lijdende deelen bedekken, zeer dik, hard en droog, zoodat zij de beweging moeilijk en pijnlijk maken, dan trachte men door verzachtende oplegfels, stovingen of waschingen met warm water en melk de korsten te verweeken en het afvallen te bevorderen. Wanneer door het aanhoudend krabben en schuren de korsten telkens afgescheurd worden, of de zeer overvloedige vocht afscheiding de vorming van korsten verhindert, zoodat de ontbloote huid voortdurend aan den invloed van uitwendige schadelijkheden bloot staat, dan bestrijke men die deelen met zoete room, gemengd met een weinig fijn geschraapt krijt. Alle andere uitwendige middelen, zoowel de vette als de metaalbereidingen, zijn schadelijk.

Oefent de melkkorst eenen schadelijken invloed op de gezondheid der lijders uit, dan is het eerste, wat men te doen heeft, de oorzaken der ziekte, die

de

de natuur alleen niet kan overwinnen, op te sporen en uit den weg te ruimen. Aan zeer vette, overtollig gevoed wordende kinderen, onthoude men een gedeelte van hun voedsel, of verwisfele hetzelfde met minder voedende zelfstandigheden; ontzegge aan de moeders en minnen, zoo lang zij zogen, al te sterk voedende spijszen en dranken, vet vleesch, bier, chocolaad, meel- en melkspijszen, veroorlove alleen mager vleesch van oude dieren in matige hoeveelheden, groenten en vruchten; tot drank, koud water en een weinig wijn. Ziekelijke moeders en minnen, verwisfele men met gezonde minnen, of voorziet op eene andere wijze in de voeding der lijders. Lijden de kinderen aan zuur in de maag, men tempere hetzelfde door magnesia of kreeftsoogen; is de buik verstopt, dan bevordere men de ontlasting door rhabarber of jalappe met *mercurius dulcis*. Bloedzuigers en aderlatingen om de ontsteking te matigen en congestiën te verhoeden, worden door vele geneeskundigen aangeraden, maar dezelve zijn zelden noodig. In mijne veeljarige en niet eng beperkte praktijk zijn mij geene gevallen voorgekomen, waarin aanwijzingen tot bloedontlastingen bestonden.

Bij scrophuleuze aandoeningen, welke in de meer ontwikkelde en hardnekkige gevallen der melk-
 korst bijna altijd aanwezig zijn, moet de behandeling voornamelijk deze complicatie ten doel hebben. Men geve de kwik- en spiesglasbereidingen, en houde daarmede eenen geruimen tijd vol. De *mercurius dulcis* met *sulphur auratum* of de *aethiops*

antimonialis, in giften aan den leeftijd der lijdens geëvenredigd, verbonden met het poeder der driekleurige viool, voldoen in alle deelen aan deze aanwijzing.

Als middelen, waaraan men eigendommelijke geneeskrachten in de melkkorst toekent, vindt men er onderscheidene uit het plantenrijk aangeprezen: voornamelijk de *tusfilago farfara*, de *primula veris*, de *sassaparilla* en de *viola tricolor* of *herba jaceae*. Er zijn geneesheeren, welke aan het laatste middel eene specifieke werking tegen de melkkorst toekennen, terwijl andere aan hetzelfde geene of slechts zeer geringe krachten toeschrijven. Volgens mijne op ervaring gegronde overtuiging, is het er verre af, dat de melkkorst in ieder voorkomend geval door de driekleurige viool zoude genezen worden; maar tevens is het van de andere zijde waar, dat wij geen ander middel bezitten, hetwelk met betrekking tot deze ziekte haar in geneeskrachten gelijk komt. Zij oefent buitendien geenen schadelijken invloed op de bewerktuiging uit, en kan langdurig gebruikt worden. Men geeft dezelfde op verschillende wijzen: gedroogd in poeder van ééne halve drachma tot twee drachmen daags, geëvenredigd aan den ouderdom der lijdens, in afkookfels, aftreksels, en verbonden met andere, gelijktijdig aangewezen geneesmiddelen. Men kan van de volgende voorschriften gebruik maken:

R. Pulv.

R. *Pulv. hb. Jaceae*

Sacchar. lactis à dr. III

Sulphur praecip.

Subcarbon. magnes. à dr β

m. f. pulv. S. om de twee of drie uren een
eijerlepelkje. (JAHN).

R. *Herbae Jaceae recent.* m. I

coque in lactis vaccini lib. I

post brevem ebullitionem coletur. S.

de eene helft des morgens, de andere des
avonds te gebruiken. (STRACK).

R. *Radic. sassapar.* unc β

coq. c. f. q. aq. comm.

ut. f. decoct. sub. finem coctionis infunde

Herbae Jaceae dr. I—III

colat. adde

sacchar. alb. unc β

m. d. S.

in 24 uren te gebruiken. (WENDT.)

R. *Hb. Jaceae* dr. II

infunde c. aq. ferv. q. S.

repone ad refrig.

colat. unc III *adde*

Vini stibiati scr. I

syr. alth. unc β

m. S.

om de twee uren een' paplepel. (JAHN).

Bij trage buiksonstlasting kan men de *manna*, de
tinctura rhei aquosa of een ander lakfeermiddel
toevoegen; want de lakferende en buikloop ver-

wekkende eigenschap der driekleurige viool, waarvan J. P. FRANK en JOERG spreken, heb ik nimmer waargenomen.

Mijne wijze van de viool te gebruiken, bestaat hierin: Eene handvol versche klein gesneden planten wordt in een' trekpots met twaalf oncen kokend water opgegoten en op eene stoof met vuur getrokken; voorts, met een weinig melk en suiker gemengd, te drinken gegeven. De meeste kinderen gebruiken ze op deze wijze gaarne. Eerst dan, wanneer er geene versche planten meer te bekomen zijn, bedien ik mij van de gedroogde. Ook schijnt het mij toe, dat de in het wild en op drooge plaatsen groeiende planten niets vooruit hebben boven die, welke in tuinen gekweekt worden.

De witte melkachtige urin neemt onder het gebruik der violen eenen eigenaardigen reuk aan, met dien van kattenurin overeenkomende; dezelve is kritisch; althans waar dit verschijnsel plaats heeft, kan men met tamelijke zekerheid op eene doeltreffende uitwerking vertrouwen. Daar echter die eigenaardige reuk der urin bij melkkorst-lidders reeds voorkomt, voor de driekleurige violen gebruikt worden, zoo zie ik niet, hoe men daaraan veel waarde hechten kan.

Komen er gevallen voor, en dit vindt meermaalen plaats, waarin de overmatig gewordene afscheiding der vochten de krachten uitputten, dan is het raadzaam eene fontanel tot afleiding te plaatsen, en een afkooksel der kina met zwavelzuur toe te dienen. Overmatige buiksonstlastingen tempere men met

met *saleb*, arabifche gom of andere flijmachtige, zacht ftoppende middelen; ontftaat er buikloop met witte melkachtige ontlastingen, dan heeft er eene *scrophuleuze* aandoening der darmfcheeklieren plaats, waartegen zich geene middelen zoo heilzaam betoonen, dan de *calomel* met *opium*, en de eikelkoffij tot drank. Uitwendige middelen komen mij in deze melkkorst fteeds verdacht, meerendeels openbaar fchadelijk voor. Het is buiten tegenfpraak, dat men door kwik-, lood-, fpijauter- en zwavelbereidingen den uitflag fpoedig, ja binnen weinige dagen kan opdroogen, maar niet zonder groot nadeel der lijders: de *hydrocephalus acutus*, doodelijke ontstekingen der ademhalings-werktuigen en uitputtende buikloop met darmzweertjes, zijn vaak de gevolgen der uitwendige middelen. Waar intusfchen iets dergelijks mogt plaats vinden, trachte men den uitflag door fpaanfche-vliegenpleisters of inwrijvingen met de braakwijnfteenzalf te herftellen.

Aangaande de behandeling van den dauwworm (*crusta ferpiginosa*), deel ik niet in het gevoelen van andere geneesheeren, namelijk, dat dezelve op eene meer doortastende wijze zoude moeten behandeld worden, maar ben van oordeel, dat men geene andere behandeling dan de aangeradene tegen de melkkorst behoeft.

Bij de melkkorst der kraamvrouwen, drage men zorg voor reinheid en zuiverheid der lucht in het vertrek der zieke, vermijde alles, wat fchadelijk kan zijn, vooral togt en koude; — men regele de

zogaſſcheiding en kraamzuivering , en ruime door lakfeermiddelen gaſtriſche ophoopingſen uit den weg. Vervolgens onderhoude en bevordere men de uitbotting door middelen , welke de werkdadigheid der huid opwekken , en zoo het noodig is , onderſteune men de krachten door eenen voedenden niet prikkelenden leefregel ; men geve het IJslandſche mos en de kina , wanneer hecetiſche koortſen dreigen , plaatſen eene fontanel , wanneer er zweren terug blijven , en trachte deze alſdan door opdroogende middelen te genezen.

c. *Acne*. Vinnen.

Naam en
rangſchik-
king.

De naam *Acne* is aan deze ziekte gegeven , omdat zij bij voorkeur jonge lieden van beide geſlachten , van het tijdperk der manbaarwording tot den vijf en dertig- en veertigjarigen ouderdom aantast , doch menigvuldiger bij jonge ongehuwde mannen , dan bij ongehuwde vrouwen voorkomt , en als een bewijs van jeugdige kracht en ſterkte beſchouwd wordt.

WILLAN en BATEMAN hebben dezelve onder de knobbels (*Tuberculae*) gerangſchikt , terwijl ALIBERT haar onder de puisten geplaatst , en onder de benamingen van *dartre pustuleuse* en *couperose* beſchreven en afgebeeld , maar in zijne latere verdeeling *varus difſeminatus* genoemd en onder de *dermatoses dartreuses* eene plaats aangewezen heeft. RUST en BLASIUS houden het voor eene dwaling , de *acne* onder de puisten en niet onder de *tuberculae* te plaatſen , onder welke dezelve naar hun oordeel behooren.

Bepaling. Kleine , harde , afgezonderd ſtaande puisten met eene ontſtokene , roode grondvlakte , die behalve een

een weinig waterachtig vocht, eene kleine hoeveelheid vetachtig smeer bevatten. Na het opdroogen der puisten blijven dikwijls harde, ronde, onpijnlijke, rood- blaauwachtige peukels terug, die zeer langzaam opgelost worden, en klein blijvende likteekens achterlaten. De *acne* is eene langdurige, hardnekkige, puisterige huidziekte, bestaande in eene slepende ontsteking der smeerbeursjes (*folliculi sebacei* en des celweeffels, dat dezelve omgeeft.

Gewoonlijk is het aangezigt de zitplaats der Zetel-
vinnen; meestentijds het voorhoofd, de slapen, de kin en de punt en de vleugels van den neus; zeldzamer de hals, de schouders en het bovenste gedeelte der borst; volgens BIETT ook het achterste en bovenste gedeelte van den tronk, somwijlen ook de geheele rug. Bij vele voorwerpen vindt men de *acne* op deze deelen, terwijl het aangezigt vrij blijft; maar hoogst zelden in het aangezigt alleen, zonder dat er hier en daar enkele puisten op den rug aanwezig zijn. De ledematen blijven gewoonlijk geheel van uitslag bevrijd; alleen bij de meest algemeene uitbreiding des uitlags, vindt men enkele puisten op de achterste oppervlakte van den opperarm.

De uitbotting der puisten vindt nimmer op alle Algemeen-
deelen gelijktijdig, maar allengskens en achtereenvolgend plaats, zoodat men puisten in alle trappen van ontwikkeling naast elkander vindt. beloop.

Gewoonlijk onderscheidt men vier soorten van Verdeeling
acne, waarvan de drie eerste meer trapsgewijze

verschillende wijzigingen dan bijzondere foorten daarstellen. Er bestaan geene scherpe grenzen van afscheiding; de eene gaat in de andere over, en zij zijn alle gelijktijdig aanwezig. De vierde foort wordt, mijns inziens, te onregte *acne* genoemd, daar zij aangaande hare oorzaken, haren zetel, haar beloop en hare gedaante, zoowel als ten aanzien der personen, die zij aantast, en het levenstijdperk, waarin zij voorkomt, zeer groote en wezenlijke verscheidenheden oplevert.

Bepaling. I. *Acne simplex*. De eenvoudige vinnen. — Kleine, harde, afgezonderd staande, niet zeer talrijke puisten, die binneneen onbepaald tijdsverloop ruw worden, met dunne plaatjes afschilferen en verdroogen, of zonder afschilfering verdwijnen en geene blijvende teekenen teruglaten.

Beloop. Op kleine, roode, onpijnlijke vlekken in het aangezicht, aan den hals, op de borst en de schouders, ontwaart men kleine, harde peukels, niet grooter dan een speldeknop, die gedurende drie of vier dagen in omvang toenemen, omgeven door eenen rooden, ligt ontstokenen ring; — tusfchen den zesden en achtsten dag hebben de puisten hare volkomene ontwikkeling bereikt, zijn boven de huid verheven, rood, glad, glinsterend, hard en bij het aanraken ligt pijnlijk. Twee of drie dagen later worden de punten der puisten, ten gevolge der verettering, geelachtig wit, bersten, ontlasten de geringe hoeveelheid ettervocht, die zij bevatten, om tot dunne, gele, schilferachtige roofjes te verdroogen. De puisten worden nu kleiner en
wee-

weaker, de roode omtrek bleek, de rooſjes laten in den omtrek los en vallen vervolgens af. Van het begin der uitbotting tot aan het einde der opdrooging verloop en twee tot drie weken. Grijpen er bij herhaling uitbottingen plaats, dan wordt de ziekte langduriger; want ieder derzelve volgt het aangewezen beloop, ten zij dat de ontwikkeling en verettering der puisten verhinderd wordt en de ontſteking der ſmeerbeursjes door oploſing verdwijnt. Somwijlen vloeijen eenige puistjes in een en vormen harde knobbels; de overgang in *acne indurata* grijpt dan plaats.

Bijna uitſluitend zijn het jonge lieden, die door de *acne simplex* worden aangetast: jongelingen, in het tijdperk der manbaarwording; meisjes, bij de eerſte intrede der maandſtonden; jonge vrouwen, in het eerſte tijdperk der zwangerheid; — in het algemeen echter is het mannelijke geſlacht meer dan het vrouwelijke aan deze ziekte onderhevig.

Zonder algemeen lijden der bewerktuiging, zonder ziekelijke geſteldheden van een of ander ingewand, en zonder eenigen de gezondheid ſtorenden invloed, grijpen menigmaal nieuwe uitbottingen plaats, en maken deze ziekte vaak zeer langdurig, zoodat zij tot den dertigjarigen ouderdom en langer kan voortduren.

Met de geſlachtsontwikkeling en de verrigtingen der teeldeelen ſtaat de *acne* kennelijk in verband, zonder dat men het wezenlijke van deze ſympathiſche en conſenſuëele betrekkingen kan door-

gronden. Zonderling moet het intusfchen voor komen, en toch is het door ervaring bewezen, dat onanisten en kuisch levende personen de gewone lijders aan deze ziekte zijn; terwijl daarentegen diegenen, welke op den weg, door de natuur verordend, de teeldrift bevredigen, verschoond blijven. Het huwelijksbed is voor jonge mannen en vrouwen het zekerste geneesmiddel dezer ziekte.

2. *Acne punctata*. De gepunte vinnen.

Bepaling. Kleine, aan de randen naauwelijke boven de huid verhevene puistjes met eene zwarte punt, zeer gelijkende op de zwarte stippen, welke het indringen der buskruidkorrels in de huid veroorzaken. Op het voorhoofd, op de punt en de vleugels van den neus en aan de kin komen dezelve het menigvuldigst voor; echter kunnen ook alle deelen, welke aan de andere soorten der vinnen tot zetel verstrekken, door deze worden ingenomen. De *acne punctata* tast, even als de *simplex*, uitfluitend jonge lieden aan, maar gewoonlijk vroeger, reeds in de jaren der kindschheid. De puisten bevatten eene witte, vette, kaasachtige zelfstandigheid, die zich in de gedaante van eenen dunnen draad ontlast, wanneer de puisten van beide zijden zamengedrukt worden. In verband met het zwarte stipje, in het midden der puisten aanwezig, biedt de uitgedrukte stof groote gelijkenis aan met eene mijt; dit gaf aanleiding, dat men dezelve voor kleine worpjes hield, en ze den naam van *comedones* (mede-eters), ook *jonthus* gegeven heeft.

De puïsten der *acne punctata* zijn niet anders dan de gezwollene smeerbeursjes der huid, ten gevolge eener naauwelijks waarneembare ontsteking en daardoor vermeerderde afscheiding van het huid-smeer; gedeeltelijk wordt dit ontlast, en geeft aan de huid een vetachtig, glinsterend aanzien, gedeeltelijk wordt hetzelfde in de smeerbuisjes terug gehouden, en verdroogt aan de openingen door de inwerking der lucht tot zwarte stippen. Klimt de ontsteking tot eenen hooger trap, dan volgt er verettering, doorgaans slechts van enkele puïsten, terwijl de meeste onveranderd staan blijven, tot dat zij verdroogen, afschilferen en naauwelijks zichtbare roode stippen voor eenigen tijd terug laten.

De *acne punctata* kan gelijktijdig met de *simplex* en *indurata* voorkomen.

3. *Acne indurata*. De verharde vinnen.

Het aangezicht en de rug zijn de gewone zitplaatsen dezer vinnen. De puïsten zijn grooter dan die der *acne simplex*, hard, rood, van eene omgekeerde kegelvormige gedaante en volgen een zeer langzaam beloop. Somwijlen is het getal der puïsten gering, en er worden slechts enkele hier en daar op de wangen, den neus en de kin gezien; — in andere gevallen is het getal groot: het aangezicht of de rug, of beide deelen te gelijk zijn er mede bedekt. Somwijlen vloeijen eenige puïsten ineen, en vormen grootere harde gezwelletjes, die het aanzien van knobbels hebben, en die aanleiding gaven, de *acne* in het algemeen

onder de knobbels te rangschikken. De gewoonlijk onvolkomene verettering der puisten komt zeer langzaam, dikwijls in het geheel niet tot stand. In beide gevallen neemt het celweeffel van den omtrek der puisten in de ontsteking der smeerbeursjes deel, en er ontstaan knobbelachtige puisten van den omvang eener groote erwrt, welke eene paarsche, blaauwachtige kleur hebben, en slepend worden, om eerst over lang en zeer traag, even als de ineengevloede puisten der *acne simplex* aan de punt tot onvolkomene verettering over te gaan.

De ontlaste etter verdroogt tot dunne roven, die spoedig afvallen, en kleine, met een' rooden, harden rand omgevene likteekens terug laten. Dezelve blijven langen tijd bijna onveranderd staan, om allengskens door oplossing te verdwijnen, of bij herhaling tot verettering over te gaan. In beide gevallen eindigen dezelve met paarsche of loodverwige verkleuring der huid, met eene oppervlakkige deuk in het midden, die veel tijd behoeven, alvorens de huid hare natuurlijke kleur terug erlangt, en de indrukfels verdwijnen.

In eene andere wijziging, de belangrijkste en zwaarste der *acne indurata*, zijn het geheele aanzigt, de hals, de schouders en het bovenste gedeelte van den rug met harde, roode, knobbelachtige puisten overdekt, het zij op een dezer deelen alleen of op allen te gelijk. Mannen worden meermaals door vinnen aangetast; — het bedekt of bloot dragen der genoemde deelen is zonder

der invloed op de ontwikkeling en het beloop des uitflags.

Ten gevolge der telkens op nieuw plaats grijpende uitbottingen, worden de lijdende deelen des aangezigts door een groot getal paarsche en loodverwige vlekken, knobbels en puisten met gele, etterende punten of zwarte stippen getijgerd; de huid heeft hare natuurlijke kleur verloren, is vetachtig glinsterend, verdikt en gezwollen, waardoor het aangezicht een afzigtelijk aanzien verkrijgt. De ziekte, op den rug gezeteld zijnde, volgt hetzelfde beloop, wordt zeer langdurig, keert ligtelijk terug en veroorzaakt onuitwischbare, langwerpige, witte, eenigzins gepunteerde likteekens, somwijlen zoo talrijk, dat eene oppervlakkige beschouwing aan eene voorafgegane geefeling doet denken.

Ook in dezen hoogsten trap van ontwikkeling der *acne indurata* blijft de algemeene gezondheidstoestand der lijdens meerendeels ongekrenkt, zoodat zij hunne gewone bezigheden kunnen verrigten. Echter komen er ook uitzonderingen voor: hardnekkige hoofdpijnen kwelen de lijdens; hunne spijsvertering is bedorven, aanbeijen en slepende ziekten der borst- en buksingewanden maken hunnen toestand bedenkelijk.

Bijkomende heete en slepende ziekten onderdrukken den uitflag gewoonlijk voor eenigen tijd, want dezelve keert terug, zoodra gene tot genezing gekomen zijn. Hetzelfde vindt plaats, terwijl de lijdens kwikmiddelen gebruiken of eene
kwijl-

kwijl-kuur doorstaan. Ligtelijk kan zulks aanleiding geven, tot de vooronderstelling eener venerische besmetting en tot de geheel ongepaste aanwending eener kwik-kuur. De wederkeerende uitflag, zoodra de kwikmiddelen hunne werking volbragt hebben, bewijst dikwijls te laat de dwaling van den lijder en van den geneesheer.

Aan de uitbotting des uitflags, die dan eens spoedig, bijna plotseling, dan weder langzaam plaats heeft, gaan veelmalen onregelmatigheden in den leefregel, koud drinken bij groote verhitting en sterk zweeten, arbeid bij kagchels en groote opene vuren, vooral wanneer die arbeid met het hoofd voorover gebogen moet verrigt worden, vooraf.

4. *Acne rosacea*, *Gutta rosacea*.

(Zie II Deel, 2e Afdeeling 1e Stuk, pag. 33.)

Oorzaken. Tot hetgeen reeds ten aanzien van de oorzaken dezer ziekte bij de onderscheidene wijzigingen, waarin zij voorkomt, gezegd is, kan hier slechts weinig bijgevoegd worden, te meer, daar ten aanzien der voorbeschikkende en der toevallige of opwekkende oorzaken der *acne* dezelfde duisterheid heerscht, over welke zoo vele reden tot klagten bij een aantal andere huidziekten bestaat. Intusschen mag voor bijna bewezen gehouden worden, dat de *acne* zelden een' zuiver plaatselijken ziektevorm daarstelt; maar dat er meerendeels, naast de uitwendige schadelijke invloeden, nog andere in de bewerktuiging huisvestende voorbeschikkende en gelegenheid gevende oorzaken aanwezig zijn,

gelegen in de gestoorde verrigtingen van de werktuigen der spijsvertering, in scrophuleuze en andere scherpten, in congestiën naar het hoofd, belemmerden omloop des bloeds en het stelsel der poortader en slepende werktuigelijke gebreken der lever.

De *acne* der kinderen, *comēdones* genaamd, ontstaat door scrophuleuze ontsteking der fmeerbeursjes van de huid des aangezigts, waardoor deze deels in *acne*-puisten, deels in wrataardige beursgezweiletjes ontaarden.

De hardheid en roodheid der slechts gedeeltelijk tot verettering komende puisten der *acne simplex*; de zwarte stip aan de punt der puisten bij de *acne punctata*; de harde knobbelvormige, alleen aan de punt etterende puisten der *acne indurata*, geven zulke duidelijke kenteekenen aan de hand, dat men deze ziekte niet ligt met andere huidziekten, noch onderling, kan verwarren.

Onderscheidings-kenteekenen.

De *acne simplex* en *punctata* zijn meer onaangenaam en lastig, dan belangrijk; nimmer gevaarlijk, ten zij ten gevolge van plaatshebbende complicatiën; meerendeels langdurig. De *acne indurata* gaat met grootere bezwaren gepaard; zij is zeer langdurig, vaak voor de kunst ongeneesbaar, en ontstelt het aangezicht op eene walgelijke wijze.

Voorzeggung.

Alhoewel de *acne* door de meeste der daaraan lijdende personen als ziekte te gering geacht wordt, om daartegen geneeskundige hulp in te roepen, ook in de geringere graden geene geneesmiddelen noodig heeft en door de natuur alleen genezen wordt, zoo komen er toch ook gevallen voor, waar-

Behandeling.

waarin de kunst wordt ingeroepen, vooral door het vrouwelijk geslacht, al ware het ook alleen, om de schoonheid te bewaren of terug te erlangen. Men besture de geneeskundige behandeling volgens de grondbeginselen der redenerende methode, naar aanleiding der aanwijzingen, welke de geaardheden des uitflags, de gesteldheid der lijdende huiddeelen, de bekende oorzaken en de individueele geaardheden der lijders aan de hand geven.

De behandeling is algemeen en plaatselijk. Ten aanzien der eerste komen in aanmerking: bloedontlastingen, zoowel algemeene als plaatselijke. Zelden, en alleen bij groote volbloedigheid, en wanneer de ontsteking des aangezigts eenen hoogen trap bereikt, komen aderlatingen te stade. De plaatselijke bloedontlastingen door bloedzuigers en bloedige koppen zijn meermalen aangewezen, en komen in al die gevallen te pas, waarin de puisten zeer talrijk zijn, en de ontstokene huid sterk gespannen, heet en zeer pijnlijk is. Zij zijn derhalve meer dienstig bij de *acne simplex* en *punctata*, dan bij de *indurata*. Verkoelende en zuurachtige dranken zijn aangewezen, wanneer de opgewekte toestand der bewerktuiging niet tot die hoogte klimt, welke bloedontlasting vordert, maar toch eene gematigde antiphlogistische behandeling aanwijst. Limonade, wei van melk met tamarinde of wijnsteen bereid, de wijnsteen met bloem van zwavel en magnesia zijn in dergelijke gevallen doelmatig. Lakseermiddelen worden aangewezen door ophooping in de eerste wegen, dragen bloeds-

omloop in het stelsel der poortader, verstopte buikontlasting en ziekelijk gewijzigde afscheidingen der gal en van andere vochten. De keuze der lakfermiddelen geschiede naar gelang der aangewezen omstandigheden. De lakferende middenzouten, de tamarinde, de manna, de oplosfende extracten, de wijnsteen, de rhabarber, de jalappe en de zeep bidden eene toereikende reeks van geneesmiddelen aan.

De *antiscrophulosa* zijn bepaaldelijk daar aangewezen, waar de teekenen der scrophuleuze aandoeningen bestaan, vooral in de *acne* der kinderen. Men bepale zijne keuze tot de kwik- en spiesglasbereidingen, tot de *terra ponderosa salita* (*urias barytae*), tot het *extractum cicutae* en de *jodium*-bereidingen. Men ondersteune de werking van deze geneesmiddelen door afkookfels van de *sassa-parillen*, bij groote zwakte in verband met de kina, met de eikelkoffij, bij aandoeningen der darmfcheelklieren, met opzwellling van den buik en te ruime buikontlastingen.

De antiscorbutische geneesmiddelen, en wel bijzonder de minerale zuren, zijn noodig, wanneer de zeer verouderde *acne indurata* met fcheurbuikige oplossing der vochten gepaard gaat.

Congestiën naar de teeldeelen, onderdrukte of onregelmatige maandstonden vorderen bloedontlastingen op de voeten en voetbaden; andere complicatiën worden volgens hare verschillende geaardheden behandeld.

Men handele zoo veel mogelijk rationeel, en ^{Plaatselijke} taste niet blindelings in den grooten voorraad van ^{behandeling.} uit.

uitwendige middelen , tegen de *acne* aangeraden , nu het eene , dan het andere gevende , zoo als het in de handen komt. Men matige de ontsteking en verhoogde werkdadigheid der huid door onmiddellijk op de meest ontstokene en pijnlijke puisten en knobbels bloedzuigers te zetten , en daarna door verzachtende en weekmakende omflagen en pappen. Hiertoe zijn dienstig afkookfels van lijnzaad , van zemelen , van althea-wortel en de melk van bittere amandelen , pappen van kruim van wittebrood met melk of met *aqua goulardi* bereid , nadat de hevigste prikkeling geweken is.

In de reeds verouderde gevallen met verminderde werkdadigheid der huid , kieze men , naar mate er eene minder of meerder krachtige opwekking noodig is , de gedistilleerde wateren of aftreksels der rozen , van de salie , lavendel enz. , met bijvoeging van een zesde deel tot de helft alcohol. Trapsge wijze kan men tot nog sterker prikkelende middelen overgaan : de oplossing van borax , ééne drachma op zes oncen water met twee drachmen *tinctura benzoës* ; wasfchingen met *acetas ammoniac liquidum* , met *acetum aromaticum* of het waschwater van GOULARD. Dit laatste middel heeft in *Engeland* zeer veel opgang gemaakt ; het bestaat uit één of meer greinen sublimaat opgelost in ééne once alcohol , aangengelgd met vier of meer oncen melk van bittere amandelen. In plaats van dit middel kan de oplossing van sublimaat van vier tot zes greinen in zes oncen gedistilleerd water met ééne once alcohol gesteld worden. Met deze midde-

delen worden de deelen, door *acne*-puisten bezet, meermalen om de drie of vier uren met eene zachte spons bevochtigd; men veegt ze daarna niet af, maar laat het vocht opdroogen.

In de hardnekkigste en langdurigste gevallen, tracht men aan de ziekelijke vitaliteit der huid eene andere wijziging te geven. Vele middelen vindt men tot dat einde aangeraden. Men beginne met de zachtere, om allengskens tot de meer prikkelende over te gaan. De zalven met *flores zinci*, *magisterium bismuthi* en de *mercurius praecipitatus albus*, ééne drachma op ééne once versche, ongezoute boter, doen dikwijls zeer goede diensten. De zalf met het *magisterium bismuthi* verdient de voorkeur bij lieden, die eene fijne en teedere huid hebben; — terwijl bij eene grove, onaandoenlijke huid welligt geen middel beter voldoet, dan de inwrijvingen met het *unguentum neapolitanum*, volgens de oude wijze van bereiding. De genoemde zalven laat men tweemaal daags in de puisten inwrijven: voor zulks des morgens geschiedt, worden de deelen met spaansche-zeep sop afgewaschen, vervolgens met jenever, brandewijn of *eau de Cologne* afgebet. Gewoonlijk slaagt de genezing op deze wijze beter dan op eene andere. Door BIETT wordt de zalf, zamengesteld uit twaalf tot vier en twintig greinen *jodetum sulphuris* met ééne once reuzel, als het meest vermogende en zekerste geneesmiddel aangeraden.

Wasfchingen met heet water, zoo warm als het bij mogelijkheid kan worden verdragen, waterdamp-

baden van het aangezicht en de waterdamp *douche* gedurende twaalf tot vijftien minuten op de verharde *acne*-puisten geleid, kunnen in daartoe geschikte gevallen met vrucht worden aangewend. Insgelijks waschwaters uit ééne drachma zeezoutzuur met zes oncen water, of eene drachma *kali carbonicum* in zes oncen water, zijn mede als empirische middelen aangewezen, waar de andere geneeswijzen te kort schieten.

Het borstelen der aangedane huiddeelen met een zachten borstel, tot dat dezelve beginnen te gloeijen, als wanneer men ze met warm zeepfop afwascht, is een onschadelijk, maar in vele gevallen een krachtig middel om de verharde *acne*-puisten op te lossen.

Wanneer men met al de aangewezen geneesmiddelen in de genezing niet slaagt, dan kan men tot nog sterker werkende geneesmiddelen overgaan. DARWIN heeft zich met een gewenscht gevolg van vliegenpleister op de puisten bediend. Het branden der puisten met *lapis infernalis* of zeezoutzuur vernietigt dezelve wel, maar veroorzaakt naadvormige likteekens, weshalve het gebruik dier middelen, vooral in het aangezicht, niet zeer aanbevelenswaardig is. De natuurlijke zwavelbaden, en, als nakuur van dezelve, waschingen met zwavelwater, worden mede aangeraden. JON. GREEN geeft den raad, de enkel staande en sterk verhevene *acne*-puisten met een lancet te openen, de bevatte stof uit te drukken, en volgens de genezing door zacht opdroogende middelen te bespoedigen. Bij de *acne punctata* kan men de puistjes van de daarin be-

bevatte stof door drukking tusfchen de nagels van de beide duimen , of met behulp van een klein , aan de punten plat tangetje ontledigen , en daarna door ze met fublimaat-oploffing te betten , tot genezing brengen. De kleine beursgezwelvormige puisten bij de *comedones* der kinderen kunnen fpoedig genezen worden , wanneer men dezelve dagelijks met zee-zoutzuur aanftipt , en om de veretteringen te bevorderen , met eene verzachtende pap bedekt , mits gelijktijdig de inwendige behandeling doelmatig beftuurd worde.

De leefregel behoort in allen deele regelmatig te zijn, Leefregel. vooral met betrekking tot de bevrediging der teeldrift. Koffij , bier , geestrijke dranken en wijn , alle gezouten , gerookte en fcherpe fpijzen zijn fchadelijk. Ook heeft de ervaring geleerd , dat het gebruik van plantenvoedsel alleen , zonder vleesch-fpijzen , de ziekte geenszins verbeterd , maar veel verflimmert.

d. *Mentagra* , *Sycosis* , *Dartre pustuleuse* , *Mentagre Aliberti*. Kin- of Baardschurft.

Reeds bij de oudfte fchrijvers vindt men onder den naam van *Mentagra* gewag gemaakt van eene ziekte des aangezigts , terwijl het echter twijfelachtig blijft , of zij eene en dezelfde geweest zij met die , welke wij thans dien naam geven. Indien dit het geval ware , dan zou men toch moeten aannemen , dat de *mentagra* door een lang verloop van tijd eene veel zachtere , meer goedaardige en minder verwoestende ziekte geworden is , dan zij

voorheen was , en dat zij hare besmettende geëardheid heeft verloren.

De *mentagra* door PLINIUS beschreven , en welke dus lang vóórdat de venerifche ziekte in *Europa* bekend werd, geheerscht heeft , werd meer dan de dood gevreesd, alleen wegens de verwoestingen , die zij in het aangezicht veroorzaakte , want zij was zonder pijn en zonder gevaar.

Tijdens de regering van TIBERIUS schijnt zij het eerst te *Rome* geheerscht , en zich van daar niet alleen over *Italië*, maar ook over de meeste Romeinsche wingewesten verbreid te hebben. Volgens het aangenomen gevoelen bragt PERUSIUS, een Romeinsch ridder de *mentagra* uit *Azië* naar *Rome*. De ge-goedste, in overvloed en weelde levendelieden koos zij bij voorkeur tot hare offers — zelden armen, alleen mannen, nimmer vrouwen. De kin, de baard en de hals waren hare gewone zitplaatsen, echter breidde zij zich ook over het geheele aangezicht, alleen de oogen uigezonderd, over den hals tot op de schouders uit, en vertoonde eene afschuwelijke gedaante. Ook was de *mentagra* toen ter tijd eene epidemische en besmettende ziekte. Hare spoedige en algemeene verbreiding over een groot deel van *Europa* zocht men te verklaren uit de toenmalige gewoonte der mannen, elkander met eenen kus te begroeten. Op grond, dat de vrouwen verschoond bleven, wordt de mededeeling en uitbreiding der besmetting door kussen twijfelachtig, en men is verpligt eene eigendommelijke voorgeschiktheid aan te nemen, die zich alleen bij mannen konde ontwikkelen.

De

De ziekte, welke tegenwoordig den naam van *mentagra* draagt, is eene veel lichtere ziekte, die alleen *sporadisch* voorkomt en niet besmettend is, met uitzondering van die gevallen, waarin zij als eene syphilitische complicatie of wijziging voorkomt. Ook rigt zij die verwoestingen in het aangezicht niet aan, welke haar voor de Romeinen zoo gevreesd maakte.

A. C. LORRY en J. P. FRANK brengen de *mentagra* tot die uitgebreide klasfe van ziekten, door de oude geneesheeren onder den naam van *Herpes* beschreven. PLENK, WILLAN, BATEMAN en PLUMBE rangfchikken haar onder de knobbels; — ALIBERT, BIETT, RAYER en GREEN onder de puisten.

Kleine, puntige, op de *acne* gelijkende puisten, Bepaling,
in groot getal digt bij elkander itaande, zonder in
een te vloeijen, zoo ver het aangezicht met
baardhaar bezet is. De uitbotting grijpt niet eens,
maar met langere of kortere tusschenpoozen bij her-
haling plaats. De puisten worden spoedig droog
en met dunne, bruinachtige roven bedekt, die
binnen weinige dagen dorren en afvallen.

De kinschurft tast alleen volwasfene mannen Beloop en
aan. BATEMAN wil, dat zij ook fomwijlen bij vrou- toevallen.
wen voorkomt; GREEN daarentegen meent, dat men
de *gutta rosacea* met *mentagra* verwiſfeld heeft.

Aan de uitbotting gaat fomwijlen gedurende eeni-
ge weken een puisterige uitslag op de bovenlip en
de kin, als voorbode, vooraf. Vervolgens ontſtaat
er jeukte, hitte, ſpanning en eene gering pijnlijke
roodheid van de kin, voorzien met talrijke kleine,
roode peukels, welke binnen twee tot drie dagen

in puisten overgaan, die in hun middelpunt met een haar doorboord zijn, en tot kleine verhevene gezwelletjes aangroeijen. Zij gaan tot verettering over en bevatten eenen geelwitten etter. Gedurende zes of zeven dagen blijven de puisten in dien toestand, en geven aan het met baardharen begroeide deel des aangezigts een eigenaardig onaangenaam voorkomen. Later bersten de puisten en ontlasten den bevatten etter, zonder uitzijpeling van weivochten, gelijk bij de *impetigo* plaats heeft; — de opdrooging vormt dunne bruine roven, die allengskens afvallen. Binnen tien tot vijftien dagen bereikt de ziekte haar eindperk, wanneer dezelve goedaardig blijft en er geene nieuwe uitbottingen plaats grijpen. Meerendeels echter blijft de huid gedurende eenigen tijd door eene slepende ontsteking aangedaan, en er volgen bij herhaling uitbottingen van puisten. De ontsteking breidt zich in langdurige gevallen vlamsgewijze buiten den omtrek van den baard over het aangezicht uit, dringt dieper in het weeffel der huid, zelfs tot in het celweeffel door, en verwekt eenen hooger grad van hitte, spanning en pijn.

De uitflag is óf algemeen over de geheele met baardharen bezette oppervlakte des aangezigts verbreid, en men vindt puisten in al hare verschillende tijdperken gelijktijdig aanwezig; óf dezelve is alleen plaatselijk en blijft tot enkele gedeelten, en wel tot de kin of bovenlip beperkt (*Dartre pustuleuse labiale* ALIBERTI). Gewoonlijk vindt dit laatste alleen in het begin des uitlags plaats;

want

want de zich telkens herhalende uitbottingen breiden zich meer en meer over de eerst verschoond geblevene deelen uit, en maken de ziekte algemeen. Tusschen de puisten is de huid ruw en met witte schilfers bedekt.

Bij grijsaards en bij zwakke lieden, alsmede bij schijnbaar robuste mannen, welke door buitensporigheden hunne krachten hebben uitgeput, is de ontsteking zoo weinig actief, dat zij noch verettering, noch oplossing der puisten kan tot stand brengen, en deze in knobbels met een slepend be-loop ontaarden. De grootte dezer knobbels is zeer verschillend: somwijlen als eene kleine kers; in andere gevallen zijn het kleine roode korrels, gelijkende op het vleesch van eene rijpe vijg, van waar deze uitslag dan ook den naam van *Ficus* of *Jycosis* gekregen heeft.

In zeer zeldzame gevallen breidt zich de ontsteking over het geheele aangezicht, met uitzondering der wenkbraauwen, uit, en wordt hetzelfde met puisten, knobbels en schilfers overdekt. Nog zeldzamer gebeurt het, dat de ontsteking tot in het celweeffel doordringt en abscesfen of verzweringen veroorzaakt.

In langdurige gevallen nemen de bolletjes der haren deel in de ontsteking, waarvan het gevolg is, dat de haren uitvallen en de baard kale plekken krijgt; — eenigen tijd na de genezing herstelt zich dit verlies.

Zoodra de ontsteking geheel geweken is, grijpen er geene nieuwe uitbottingen meer plaats; de knob-

bels worden allengskens kleiner en verdwijnen door oplossing geheel en al; de puisten verdroogen met rooven, die, afgevallen zijnde, roode vlekken terug laten, welke eerst na herhaalde affschilfering der opperhuid, de natuurlijke kleur der huid terug erlangen.

Duur. Naar mate de ontsteking en de uitslag actief of passief zijn, is de duur van de *mentagra* verschillend: in de lichtere gevallen van tien tot twintig dagen — in de zware van weken tot maanden. In de hevigste graden komen gevallen voor, die alle geneeskundige pogingen bescotten en levenslang voortduren. Onregelmatig levende lieden worden telkens door recidiven aangetast, om hunne hardnekkigheid in het misdrijf streng en langdurig te straffen.

Oorzaken. Jonge lieden, kort na de uitbotting van den baard, — volwasfenen in den leeftijd tusfchen veertig en vijf en veertig jaren van het bloedrijke en galachtige temperament, en dikke, zeer vette, onrein levende mannen zijn meer dan anderen aan deze ziekte onderhevig. Als gelegenheid gevende oorzaken, beschuldigt men een meer dan gewoon fterke baard, het voor- en najaar, en beroepen, welke voor groote vuren worden uitgegeefend, als het fmeden, koken, vet- en metaalsmelten, glasblazen, enz.; — buitenfporigheden in den leefregel en misbruik van fterke dranken, bijzondere in het ligchaam huisvestende fcherpten, de venerifche en die der *lepra*. Echter komt de baardschurft ook bij lieden voor, bij welke geene der genoemde oorzaken aanwezig zijn, noch andere kunnen opgefpoord worden. Bij boeren is mij de ziekte

het

het menigvuldigst voorgekomen, zonder dat ik de oorzaak konde ontdekken. Gewoonlijk beschuldigden de lijdens hunne barbiers wegens het gebruik van botte of onreine scheermesfen : eene beschuldiging, niet alleen bij ons, maar ook in andere landen algemeen. BIETT houdt deze aantijging voor ongegrond en voor een verzinsel der eigenliefde, omdat aan vele lieden eene toevallige, uitwendige oorzaak verkieslijker toefchijnt, dan eene inwendige, die hunnen levenswandel verdacht maakt of eene ziekelijke ligchaamsgefteldheid verraadt. Meermalen is het mij intusfchen voorgekomen, dat twee of meer personen door één' en denzelfden barbier gefchoren, door de baardschurft werden aangetast. Het komt mij derhalve niet onwaarfchijnlijk voor, dat de onreine gereedschappen, bij het fcheren gebruikt, deze ziekte kunnen verwekken, en dat dezelve in zekere gevallen niet van befmetting is vrij te pleiten; alhoewel ik het daarvoor houde, dat er geene eigenaardige fmetstof van baardschurft beftaat, maar wel, dat er complicatiën met andere huidziekten kunnen plaats vinden, welke zich door befmetting laten mededeelen en voortplanten.

Betrekkelijk de naafte oorzaak, zijn wij nog niet verder dan ten aanzien van andere huidziekten gevorderd. Dat er ontfteking der huid beftaat, is buiten allen twijfel; maar onzeker is het, waardoor dezelve wordt voortgebragt. Het minst aannemelijk komt mij het gevoelen van hen voor, die eene verftopping der openingen van de *folliculi sebacei* aannemen, en uit de prikkeling, verwekt door de

daarin opgehoopte stoffen en die der haren, welke de puisten doorboren, de ontwikkeling dezer ziekte verklaren. Indien dit zoo ware, dan zoude de baardschurft niets anders zijn, dan *acne* in haren hoogsten trap van ontwikkeling; maar het zoude overklaarbaar zijn, waarom deze ziekte alleen mannen aantast, en volgens het bijna eenstemmig gevoelen der geneeskundigen, bij vrouwen nimmer, of alleen als hoogst zeldzame uitzondering voorkomt. Het is meer waarschijnlijk, dat de baardschurft de plaatselijke uitwerking is van eenen ziekelijken toestand der geheele bewerktuiging. De menigvuldige verschijning der *mentagra* onder de gevolgen der melaatschheid en *syphilis* pleiten althans voor dat gevoelen.

Onderschei-
dings - ken-
teekenen.

De leeftijd, waarin de baardschurft voorkomt; de plaats, die zij inneemt; het geslacht, dat zij aantast; de zeer talrijke, puntige, boven de huid verhevene, niet zamenvloeiende puisten; het korrel- en knobbelachtige aanzien, dat de uitslag in het slepende beloop aanneemt, onderscheiden de *mentagra* zeer duidelijk van alle andere huidziekten des aangezigts.

Voorzegging. De *mentagra* is geene gevaarlijke, maar meeren- deels langdurige ziekte. Hoe minder teekenen er aanwezig zijn, welke een algemeen lijden der bewerktuiging kenbaar maken, zoo veel te meer grond heeft men, om een spoedig beloop en gunstige einde te voorspellen. Waar de *mentagra* met andere ziekteverschijnselen gepaard gaat, voorspelle men een langdurig beloop. Bij duidelijk gekenschetste
kwaad-

kwaadfappigheden en voortdurende buitensporigheden in de leefwijze, verzwijge men het voor den lijder niet, dat zijne ziekte zeer langdurig en wellicht ongeneesbaar zijn zal.

Deze zij, in de eerste plaats, zoodanig ingerigt, ^{Geneeswijze.} dat de bekende schadelijkheden uit den weg worden geruimd. De lijder neme de matigheid in eten en drinken in acht; vermijde het gebruik van geestrijke en gegiste dranken; stake zijne beroepsbezigheden, die voor groote vuren moeten verrigt worden; zorg voor de noodige reinheid door verzachtende wasfchingen, en late den baard niet met een scheermes, maar, gelijk de Joden doen, met eene fchaar afnemen. De fyphilitische, scrophuleuze of scrobutische gesteldheden der bewerktuiging, vorderen die middelen, welke tegen dezelve algemeen in gebruik zijn. Men ondersteune bij zwakke en cachectische voorwerpen de krachten door kina, bittere en staalmiddelen, en door eenen voedenden, doelmatigen leefregel.

De ontsteking der aangedane huiddeelen kan eenen zoo hoogen trap bereiken, dat bloedontlastingen noodig worden. In de ligtere gevallen kan men met bloedzuigers achter de ooren en aan de kin, des noodig bij herhaling, volstaan. In zware gevallen, waarin het geheele vaatstelsel in de ontstekingsaardige terugwerking deelt, verschaft eene aderlating de noodige hulp. Gelijktijdig geve men inwendig zure en verkoelende dranken: de *cremor tartari* met *flor. sulphuris*, *rheum* of jalappe, waar de buiksontlasting ondersteuning behoeft, en
eene

eene sterkere afleiding naar het darmkanaal doelmatig is. Plaatselijk bezige men verzachtende stovingen en pappen (de laatsten uit kruim van wittebrood of aardappelenmeel bereid). De lijder beperke zijnen leefregel tot voedsels uit het plantenrijk, met weinig of geen vleesch, en vermijde koffij, bier, wijn en geestrijke dranken.

Gastrische complicatiën vorderen lakseermiddelen: de verkoelende, zoo lang de antiphlogistische geneeswijze is aangewezen; -- de meer prikkelende, verbonden met *calomel*, bij traagheid in de verigtingen der buksingewanden en bij verstopte buiksontlastingen. Wanneer de natuur eene meer krachtige aanprikkeling noodig heeft, en er eene duurzame afleiding naar het darmkanaal bedoeld wordt, dan herhaalt men gedurende eenigen tijd de lakseermiddelen om den anderen dag of om de drie dagen. Uitwendig helpen de verzachtende middelen in het tijdperk der ontsteking zoo weldadig niet, zoodra de baardschurft eene slepende gedaante verkregen heeft, met uitgebreide zwelling der huid, aandoening van het celweeffel en knobbelachtige ontaardingen der puisten. Men verlieze alsdan geenen tijd, maar neme onmiddellijk zijne toevlugt tot inwrijvingen met kwikzalven, bereid uit eene halve tot heele drachma roode of witte praecipitaat met spiauterbloemen op ééne once versche ongezoeten boter of reuzel; ook kan men in derzelver plaats het *unguentum neapolitanum* aanwenden, of den raad van anderen volgen, en zich bedienen van de zalf, vervaardigd uit *Hydragrum sulphuratum*

nigrum, een scrupel tot ééne drachma op ééne once vet. Gelijktijdig make men gebruik van warmwaterdampbaden, of van de douche met warm water of zwaveldamp, welke onmiddellijk op de lijdende deelen geleid worden door middel eener pijp, welker gedaante aan het eene einde trechtervormig is, ten einde er een vat met kokend water onder te plaatsen of den zwavel te laten verbranden, en aan het andere einde eenen gietervormig doorboorden knop heeft. Men wekt op deze wijze de werkdadigheid der huid op, bevordert den bloedsomloop in de haarvaten der lijdende deelen, en bespoedigt de oplossing der knobbels door de verrigtingen der opflorpemde weivaten op te beuren. Met een uitmuntend gevolg bedient men zich van deze geneeswijze in het hospitaal *St. Louis* te *Parijs*.

Grijpen er nieuwe uitbottingen gedurende het gebruik der uitwendige prikkelende geneesmiddelen plaats, dan moeten deze achterwege blijven, en door verzachtende pappen of omslagen met *aqua Goulardi* vervangen worden, om de te hoog opgevoerde prikkeling en ontsteking der huid genoegzaam te matigen, ten einde vervolgens tot de eerste middelen wederom te kunnen overgaan.

Tegen zeer hardnekkige en voor ongeneesbaar gehouden gevallen heeft men aangeraden, de lijdende deelen met hellesteen of met minerale zuren te bestrijken. Deze middelen vorderen groote omzigtigheid. Uit eigene ervaring kan ik derzelver nuttigheid niet beoordeelen; er zijn mij nimmer gevallen voorgekomen, waarin ik dezelve aangewezen en

noodig vond. Mijne gewone behandeling met inwendige middelen en uitwendige inwrijvingen met kwikzalf, of het wasfchen met fublimaat-oploffing, één tot vier greinen in ééne once water was toereikend om de genezing tot ftand te brengen. Kommen er echter gevallen voor, waarin men met de rationeele geneeswijze te kort fchiet, en de lijders een zwak en cachectifch voorkomen hebben, dan doen, gelijk men wil, verfterkende middelen en ijzerbereidigen goede dienften. PLUMBE daarentegen, houdt het daarvoor, dat inwendige middelen niets baten, en geeft den raad, de baardharen met een tangetje uit te trekken. BIETT zag genezingen tot ftand brengen door inwrijving van een tot drie zesde gedeelten van een grein zoutzuur goud op den rug der tong. Genezingen, ten laafte tot ftand gebragt door het inwendig gebruik der kwikbereidingen, verraden, mijns inziens, dat er eene venerifche complicatie in die gevallen beftaan heeft.

e. *Porrigo, Tinea*. Hoofdzeer.

In navolging van de meeste der latere fchrijvers over de huidziekten, worden ook hier de woorden *Porrigo* en *Tinea*, als eene en dezelfde foort van ziekte aanduidende, gebezigd, zonder deel te nemen in de gefchillen, welke over de afleiding en juiste beteekenis dier woorden, en over de ziektevormen daaronder begrepen, gevoerd worden. Even min wil ik onderzoeken, welke ziekten de oude geneeskundigen, die over de huidziekten gefchreven hebben, onder die benamingen bedoelden.

De naam *Porriga* of *Tinea* wordt aan puistige Bepaling. ziekten van het behaarde hoofd gegeven, die zich somwijlen, echter zelden, over andere ligchaamsdeelen uitbreiden. Zij zijn voornamelijk aanden kinderlijken leeftijd eigen, en hebben haren zetel zoo wel in de haarbolletjes als in de smeerbeursjes en het celweeffel. Zij worden dikwijls door kaalhoofdigheid gevolgd.

Men vindt verschillende verdeelingen door de on- Verdeeling. derscheidene schrijvers over deze ziekte aangenomen. Naar mate men alle ziekten, op het behaarde hoofd voorkomende, als tot ééne soort behorende, beschouwde of ze als ziekten aanzag, die tot verschillende orden en soorten van huidziekten behooren, en zoo wel op andere ligchaamsdeelen als op het met haren begroeide hoofd voorkomen, alleen gewijzigd door de werktuigelijke verscheidenheden der deelen, die er door aangetast worden.

De thans meest gevolgd wordende verdeelingen zijn die van ALIBERT, WILLAN EN BATEMAN, BIETT, RUST EN MAHON. Wij zullen dezelve hier in het kort aanwijzen.

ALIBERT beschrijft onder den naam van *Tinea* (*Teigne*) vijf soorten:

- 1.) *Tinea Favosa* (*Teigne faveuse*). De Honigraatvormige.
- 2.) ——— *Granulata* (*T. granulée*). De korrelachtige.
- 3.) ——— *Furfuracea* (*T. furfuracée*). De zemelroovige.
- 4.) ——— *Asbestina* (*T. amiantacée*). De glinsterendwitroovige.
- 5.)

- 5.) ——— *Muciflua* (*T. muqueuse*). De vochtige natrovige.

WILLIAN en BATEMAN nemen zes foorten aan onder den naam van *Porrigo*:

- 1.) *Porrigo Larvata*. De momvormige.
- 2.) *Porrigo Furfurans*. De zemelrovige.
- 3.) ——— *Lupinosa*. De wolfsboonvormige.
- 4.) ——— *Scutulata*. De schildvormige.
- 5.) ——— *Decalvans*. De kaalhoofdige.
- 6.) ——— *Favosa*. De Honigraatvormige.

BIETT neemt slechts twee foorten aan.

- 1.) *Porrigo Lupinosa*. De wolfsboonvormige.
- 2.) ——— *Scutulata*. De schildvormige.

BLASIUS en RUST nemen vijf foorten aan:

- 1.) *Porrigo Furfurans*. De zemelrovige.
- 2.) ——— *Lupinosa*. De wolfsboonvormige.
- 3.) ——— *Scutulata*. De schildvormige.
- 4.) ——— *Decalvans*. De kaalhoofdige.
- 5.) ——— *Favosa*. De honigraatvormige.

Door de broeders MAHON wordt eene geheel nieuwe, op de vooronderstelde zitplaatsen der ziekte gegronde verdeeling, gevolgd:

I. *Morbi folliculorum sebacei*. Ziekte der smeerbeursjes van het hoofd.

- a. *Favus*. Honigraat.
- b. *Squarus Tondens*. Het kale hoofd.

II. *Morbi vaginae capillorum*. Ziekten van de haarscheden.

- a. *Amiantus*. De witte schilfering.

III.

III. *Achores*. Puisten.

- a. *Achor Furfurescens*. Zemelroof.
- b. ——— *Muciflua*. Natte roof.
- c. ——— *Granulata*. Korrelachtige.

IV. *Porrigines*. Drooge roven.

- a. *Porrigo Lactuminosa*. Barg der zuigelingen.
- b. ——— *Membranacea*. De vliesachtige.

Wanneer men de verschillende verdeelingen met elkander vergelijkt, dan blijkt het duidelijk, dat onder de benaming hoofdzeer eene plaats gegeven is aan sommige ziekten, welke in geen en deele daaronder behooren; — dat eenige onder geheel verschillende benamingen voorkomen, en dat andere de gevolgen eener ziekte, maar geenszins de ziekte zelve zijn.

Het is eene algemeen bekende, geen nader bewijs vorderende zaak, dat het hoofdzeer, hier te lande (althans in de provincie *Holland*) eene zeer algemeene volksziekte is, vooral onder den mingegooden en behoeftigen volksstand; — het menigvuldigst bij dat gedeelte, hetwelk zijn onderhoud in Fabrieken en Trafijken vindt, waarin de arbeid gedeeltelijk door kinderen wordt verrigt. — De menigvuldige gelegenheden, die ik gehad heb, om het hoofdzeer in al de wijzigingen, waarin het bij ons voorkomt, waar te nemen, heeft mij tot de volgende opmerkingen geleid.

De gemeene man onderscheidt twee foorten van hoofdzeer: het goedaardige en het kwaadaardige. — Het eerste komt in twee gedaanten voor: onder de be-

naming van hoofdschilfering of roos op het hoofd, en onder die van klieren op het hoofd. Beide soorten gaan gewoonlijk met een groot getal ongedierte gepaard, en de aanwezigheid dezer infekten beschouwt de gemeene man als een stellig kenteeken van de goedaardigheid en geneesbaarheid dezer ziekten. De naam van kwaadaardig hoofdzeer of koningszeer geeft hij aan die soorten, welke moeilijk te genezen of ongeneesbaar zijn, eenen kwaden reuk verbreiden, de haren doen uitvallen, besmettend zijn en zonder ongedierte blijven.

Naar aanleiding van deze uit de natuur ontleende vormen, neem ik de vier volgende soorten aan:

- 1.) *Porrigo* of *Tinea Furfurans*. Roos op het hoofd, hoofdschilfering.
- 2.) ——— ——— *Favosa*. Klieren op het hoofd, natrovig hoofdzeer.
- 3.) ——— ——— *Lupinosa*. Wolfsboonvormig hoofdzeer, koningszeer.
- 4.) ——— ——— *Scutulata*. Schildvormig hoofdzeer, ringworm der Engelschen.

Met uitzondering van de *porrigo larvata* van WILLAN, die tot de *impetigo* behoort, en reeds onder de benamingen van melkkorst en dauwworm beschreven is, laten zich al de andere soorten, alhoewel onder benamingen, die van elkander afwijken, voorkomende, in onze verdeelig rangschikken. Landeigene invloeden, niet alleen in het klimaat, maar in alles, wat tot de leefwijze der inboorlingen behoort, gegrond, oefenen eenen wijzigenden

invloed op het hoofdzeer uit , aanleiding gevende , dat in het eene land deze , in het andere gene het menigvuldigst voorkomt. Het schijnt mij toe , dat hierin de oorzaak der verschillende , afwijkende verdeelingen , door onderscheidene geneeskundigen voorgedragen , is gelegen , en dat zij niet in de onnaauwkeurigheid der waarnemers moet gezocht worden.

1.) *Porriga Furfurans*. Roos op het hoofd , hoofdschilfering.

De *porrigo furfurans* komt bij kinderen , bij Bepaling. volwassenen en ook bij oude lieden voor , doch meer bij het vrouwelijk geslacht , dan bij het mannelijke. Deze uitslag kenmerkt zich door kleine , witte , dunne schilfers , die zich in groote hoeveelheid ontwikkelen , afvallen om aan nieuwe plaats te maken , en aan de haren , vooral aan donkerkleurige , een ligt bepoederd aanzien geven. De ontwikkeling der schilfers gaat met hevige jeukte gepaard , voorafgegaan door kleine puntige puisten (*achores*) , die weinig vocht bevatten , en spoedig tot de genoemde schilfers verdroogen. Menigwerf hebben dezelve eene grootere overeenkomst met de *eczema*-blaasjes dan met de *achores*. Met telkens op nieuw plaatsgrijpende uitbottingen breidt zich de schilfering over het grootste gedeelte , veelmaals over de geheele oppervlakte des hoofds uit , en wordt zeer langdurig. De kleinheid der puisten en de spoedige verdrooging van de kleine hoeveelheid der daarin bevatte vochten , geeft voortdurend

aan de aangedane deelen een meer droog dan vochtig voorkomen. Waar de schilfers loslaten en afvallen, heeft de huid hare natuurlijke kleur en gedaante. Neemt men de schilfers weg voor zij geheel droog en los zijn, dan vindt men de huid van hare opperhuid ontdaan, ligt roosachtig ontstoken, eenigzins vochtig, of de opperhuid is zeer dun, glad en glinsterend. De uitwasemende vochten verbreiden eenen eigenen, gooren, zuurachtigen reuk, die eerst verdwijnt, wanneer het hoofd geheel opgedroogd is en er geene nieuwe uitbottingen meer plaats hebben. Zelden nemen de haren en derzelver bolletjes in deze huidaandoening eenig deel; — alleen in zeer langdurige gevallen wil men gezien hebben, dat de haren dunner, ligter van kleur of groen werden en uitvielen. Ook de zwelling der halsklieren vindt zelden plaats. Waar één van deze of beide verschijnselen worden waargenomen, is eene scrophuleuze complicatie aanwezig.

Niet alleen het hoofd, maar alle met haren begroeide ligchaamsdeelen, de wenkbrauwen, de okselholte en de schaamstreek worden er somwijlen door aangetast. De zemelrovige uitslag, op onbehaarde deelen voorkomende, behoort niet tot de *porrigo* of *tinea furfurans*, maar — gelijk dit de afwezigheid der *achores* bewijst — tot *eczema chronicum*, *lepra*, *psoriasis* of *pytiriasis*. De *tinea asbestina* of *amiantacca Aliberti* is eene wijziging der *porrigo furfurans*, van deze alleen daardoor onderscheiden, dat de schilfers zeer talrijk, grooter, dikker, dicht op één gepakt zijn,

en

en witte glinsterende schubben vormen, die het bovenste en voorste gedeelte des hoofds als met eenen koek bedekken, zonder dat de haren zamenkleven of uitvallen.

2) *Porrigo* of *Tinea Favosa*, *Volatia*, *Scabies capitis Favosa*, *Tinea Mucosa* of *muciflua Aliberti*. Natrovig hoofdzeer, klieren op het hoofd.

In deze wijziging der *porrigo* zijn de zeer talrijke puisten geene *achores*, maar *favi*, van waar dezelve dan ook den naam van *favosa* draagt. De puisten hebben de kenteecken der *avi*, zijn plat, onregelmatig van gedaante en van verschillende grootte, hebben eene witgele kleur, eenen ontstoken' omtrek, verwekken hevige jeukte en zijn pijnlijk bij het aanraken. De puisten staan afgeschieden, dicht bij of meer verwijderd van elkander. Het behaarde gedeelte des hoofds, vooral het achterhoofd, is de gewone zetel dezer ziekte; echter kan zij zich ook over het geheele hoofd uitbreiden, en gelijktijdig of door plaatsverwisseling ook in het aangezicht, op den romp en de ledematen voorkomen. In deze gevallen is de ziekte met de *impetigo figurata* of *sparsa* zamengesteld.

De *porrigo favosa* is eene aan den kinderlijken leeftijd eigene ziekte. Tusschen het eerste en het achtste levensjaar komt zij het meest, van het achtste tot het zestiende jaar veel minder, bij volwasenen hoogst zeldzaam voor.

Scrophuleuze aandoeningen van het klier- en wa-

tervaatstelffel begunstigen de ontwikkeling dezer ziekte, en gaan er doorgaans mede gepaard. Bij kinderen gaan menigwerf ligte koortsaanvallen, hoofdpijn en lusteloosheid, — bij volwasfenen gastrifche aandoeningen, gedurende eenige dagen, der uitbotting vooraf. Met de eerfte uitbotting komen gewoonlijk flechts weinige van elkander verwijderde puisten te voorfchijn, door de fpoedig daarop volgende hoopen zich de puisten op de aangedane deelen zamen, de klieren aan den hals en den nek zwellen, worden hard en pijnlijk, en gaan fomwijlen tot verzwering over; de oogleden zijn ontftoken; aan den neus en achter de ooren grijpen ontvellingen plaats. De puisten berften fpoedig, of worden door krabben, ten gevolge der hevige jeukte, gewelddadig geopend. De klevrige, weiachtige, fcherpe etter, die in groote hoeveelheid ontlast wordt, verdroogt fpoedig tot gele, bruinachtige korsten, welke door de aanhoudende vochtontlasting nattig blijven, en met de haren tot eene viltachtige masfa zamenkleven. Neemt men deze weg, dan vindt men de huid ontveld, ligt ontftoken en vochtig. Wanneer de noodige reiniging van het hoofd verzuimd wordt en de korst lang zitten blijft, dan ontftaan er onder dezelve etterpuisten en etterbuilen, die openbreken en die door den ontlasten etter de korsten vergrooten en verdikken. Onder en tufchen dezelve nestelt eene ontelbare menigte luizen. Het aanhoudende krabben, waartoe zich de kinderen genoopt vinden, vermeerdert de ontfteking; terwijl de affcheiding der

der vochten, als ook de korsten, zich hoe langer hoe meer uitbreiden, en eenen walgelijken reuk doen ontstaan, die naar verrotte kaas zweemt, en eerst met de geheele opdrooging verdwijnt. Zelden duurt deze ziekte bij de noodige reinheid langer dan drie tot vier weken; maar zij is zeer genegen terug te keeren. Bij vele lijdens grijpen in het voor- en na-jaar nieuwe uitbottingen plaats, die door vochtig weder begunstigd worden, en eerst met de intredende manbaarheid achterwege blijven. De haren lijden door deze ziekte niet: gewoonlijk krijgen de kinderen na de genezing zeer schoon en digtstaand haar.

3.) *Porriga* of *Tinea Lupinosa*, *Lupina*, *Scabies Capitis Lupina*, *Tinea annularis*, *Tinea Favosa Aliberti*, *Porriga Favosa* BIETT. Wolfsboonvormig koningszeer, kwaadaardig hoofdzeer.

De platte, ingedrukte gedaante der wolfsboonen, Bepaling, waarnaar de roven gelijken, hebben aan deze huid-ziekte haren naam gegeven. De puisten, waaruit zich de roven ontwikkelen, behooren tot de *favi* en niet tot de *achores*, gelijk andere willen; want zij zijn plat, in haar middelpunt ingedrukt, geel van kleur en met een haar doorboord.

Gewoonlijk begint deze ziekte in den kinderlijken leeftijd; bij velen reeds kort na de geboorte, wanneer de ouders mede er aan geleden hebben of nog lijden, — bij anderen eerst later, nadat zij één of meer jaren oud zijn. Zij is zeer hardnekkig, vaak ongeneesbaar. Hier en in den omtrek komt zij menigvuldig onder den behoeftigen, zelden bij den

meer gegoeden volksstand voor. Het komt mij waarschijnlijk voor, dat de *tinea lupinosa*, even als de *tinea scutulata*, overblijffels der *lepra* zijn. Zij is erfelijk, besmettend, en belemmert de ontwikkeling der bewerktuiging; want de door haar aangetaste kinderen blijven achterlijk in ligchaamskrachten en geestvermogens. Bij krankzinnig geboren en komt zij hier en in den omtrek veelal voor.

De uitbotting begint met kleine, door eenen rooden rand omgevene stippen, niet ongelijk aan vlooijenbeten; rondom deze komen meer andere te voorschijn, en vormen kleine plekken of groepen, die, hevig jeukend, zich tot puisten met de kentekenen der *favi* verheffen. Met geringe vochtontlasting beginnen dezelve eerst te schilferen en gaan dan tot geel-witte roven over. Zij zijn diep in de huid ingedrukt, in haar middelpunt napvormig uitgehoold met verhevene randen, rood van gedaante, hebbende eene middellijn van eenige lijnen. In het begin der ziekte vindt men slechts hier en daar ééne of eenige dezer roven verstrooid; maar spoedig komen er grootere getallen in elkanders nabijheid te voorschijn, worden allengskens in omtrek grooter, vloeijen in één, en stellen roven daar, die éenen duim en meer middellijn hebben; maar de afzonderlijke roven, welke deze korsten zamenstellen, behouden hare oorspronkelijke gedaante met napvormige uitholing in haar middelpunt. Hierdoor verkrijgen zij dien eigenaardigen, kenschetsfenden beschuit- of honigraataardigen vorm, waardoor deze ziekte den naam van *fava* heeft bekomen.

De roven zitten vast in de huid ingedrukt, en blijven weken en maanden lang onbewegelijk, worden hoe langer hoe drooger, scheuren, en brokkelen met kleine stukjes af; de oppervlakte is met een geel-wit, verstuivend poeder bedekt. Ten laatste laten de korsten met grootere stukken of in haar geheel los en vallen af; de ontbloote huid is droog, dun, glinsterend, en blijft gedurende eenen geruimen tijd schilferen. Gewoonlijk grijpen er op dezelfde huiddeelen nieuwe uitbottingen van puisten plaats, die tot roven verdroogen en hetzelfde beloop volgen. Neemt men de korsten weg vóórdát dezelve geheel los zijn, dan vindt men de huid vochtig en ontveld, waarop schilfering, nieuwe uitbotting en korsten volgen. In verouderde gevallen, gepaard met ongunstige omstandigheden, ontstaan er etterbuilen onder de korsten, welke tot diep invretende zweren overgaan. Deze worden somwijlen zeer kwaadaardig, vernielen al de omgevende zachte deelen, dringen tot op het beenvlies en in zeer zeldzame gevallen tot in de zelfstandigheid der beenderen door, en verwekken beenbederf. De haren deelen in den ziekelijken toestand der huid, staan los en kunnen, zonder pijn te verwekken, worden uitgetrokken; zij vallen spoedig uit en derzelve wortels zijn gezwollen en ontaard. Het hoofd wordt pleksgewijs of in zijn geheel kaal (*Tinea decalyans Willani*); de weder uitgroeiende haren zijn fijn, week en wolachtig, vallen telkens weder uit, tot dat door vernietiging der haarbolletjes de groei ophoudt en er blijvende kaalhoofdigheid ontstaat.

staat. Ook deze uitflag verbreidt eenen zeer onaangenaamen reuk, dien ALIBERT met dien van katten urin vergelijkt. Buiten de uitbottingen verwekt dit hoofdzeer geene jeukte, en nimmer vindt men bij hetzelfde luizen. Het is vreemd, dat BLASIUS en anderen het tegendeel beweren, daar zelfs de gemeene man zeer wel weet, dat, waar jeukte ontbreekt en geen ongedierte aanwezig is, een kwaadaardig hoofdzeer bestaat. Somwijlen gebeurt het, dat het bovenste en voorste gedeelte des hoofds met *porrigo lupinosa* en het achterste gedeelte met de *porrigo favosa* bedekt is. Voor zoo verre zich de laatste uitbreidt, vindt men dan ook een groot getal van de genoemde infekten. Waarschijnlijk ligt in deze complicatie de oorzaak dier verschillende meening.

Buiten en behalve op het behaarde hoofd, komt de wolfsboonvormige roof in de wenkbraauwen, op het voorhoofd, op de slapen, in het aangezicht, op de ledematen, in den omtrek der gewrichten en op den rug voor, — in niets verschillende van die, welke op het hoofd voorkomen. Wanneer deze ziekte — en dit vindt menigwerf plaats — met scrophuleuze aandoeningen gepaard gaat, dan zwellen de klieren aan den hals, in den nek, onder de oksels en in de liezen. — Dat de wolfsboonvormige *porrigo* uit de *lepra* ontsproten, of met de oorzaak, die deze volbrengt, verbonden is, blijkt niet alleen uit de groote overeenkomst der roven, alsmede uit de vogelklaauwvormige gedaante der nagels, maar ook daaruit, dat dezelve

uit

uitdroogen, fchilferen en bij herhaling afvallen, met affcheiding van eene gele, kleverige, stinkende wei. De wolfsboonvormige *porrigo* behoort tot de langdurigfte en hardnekkigfte ziekten, en wordt in de verdere levenstijdperken meer door de natuur, dan wel door de kunst genezen.

4.) *Porrigo scutulata, Tinea favosa et granulata Aliberti*. Ringworm bij de Engelschen, kwaadaardig fchildvormig hoofdzeer.

Dikke, boven de huid verhevene fchildvormige roven of korsten, van verschillenden omtrek, op ééne, of gelijktijdig op meer plaatfen van het behaarde hoofd aanwezig. Bepaling.

Op kleine roode vlekjes komen, groepsgewijs of afgefcheiden, kleine, ligtgele puisten te voorschijn, die door eenige geneesheeren voor *favi*, door anderen voor *achores* gehouden worden. Naar het mij toefchijnt, zijn de beide foorten altijd gelijktijdig aanwezig. De puisten bersten fpoedig, en het vocht, dat zij ontlasten, verdroogt eerst tot dunne fchilferachtige roven. Door telkens herhaalde uitbottingen, uitftortingen en opdrooging met de haren, nemen de roven in dikte en omtrek toe, en gaan in fchildvormige korsten over: het kenfchetfende dezer ziekte. Onder de korsten is de huid ligt ontftoken, met eenigzins verhevene vochtige ftippen bezaaid, welke tot puisten overgaan. De uitbotting en ontwikkeling der puisten gaat met eene lastige jeukte gepaard, die ophoudt, zoodra zich drooge korsten gevormd hebben. De Beloop en toevallen.
kin-

kinderlijke leeftijd is het tijdperk, waarin zich deze ziekte ontwikkelt, maar zij duurt gewoonlijk tot na de manbaarwording, somwijlen tot in den hoogen ouderdom voort; neemt echter in het laatste geval eene zachtere geëardheid aan, gelijkende meer naar de hoogere graden der hoofdschilfering, dan naar den uitslag, waaruit zij ontsproot. Het behaarde deel des hoofds is de eigene en eenige zetel van het schildvormig hoofdzeer, van waar het zich over het voorhoofd en den nek als schilfering uitbreidt. Zoo lang de aangedane deelen vochtig blijven, is de reuk onaangenaam, gelijkende naar dien van sterke boter. De geheel uitgedroogde korsten zijn steenhard, ongelijk, knoesterig, donkergeel, graauw of bruin; — door de droogte beginnen dezelve te scheuren en met kleine trasvormige korrelen af te brokkelen (*Tinea granulata*), die tusschen de haren vastzitten en hangen blijven. Reeds van den beginne af aan deelen de haren in de aandoening der huid; de puisten botten zoo dicht bij de haarwortelen uit, dat zij daarin schijnen gezeteld te zijn. De haren worden bleek van kleur, bros, breken ligt, spijten aan de punten en vallen uit. Niet in het begin der ziekte, maar eerst wanneer zij haar toppunt bereikt heeft, grijpen de genoemde veranderingen met de haren plaats. Door voortgaande uitbreiding der korsten over het geheele hoofd, en door de langdurigheid der ziekte, gaan ten laatste alle haren, op eene smalle strook na, die als een krans het hoofd omgeeft, verloren.

Het schildvormig hoofdzeer is langdurig, hoogst moeilijk te genezen, en door schijnbare genezingen misleidend. Eerst wanneer de huid niet meer schilfert, de haren niet meer uitvallen en hare natuurlijke kleur en gedaante terug bekomen hebben, mag men zich met de duurzaamheid der genezing vleien.

Oorzaken.

Hoe algemeen en veelvuldig de onderscheidene foorten van hoofdzeer ook voorkomen, zoo blijven de oorzaken toch in het duister schuilen. Wij kennen alleen uit de ervaring eenig omstandigheden en betrekkingen, onder welke deze ziekte gewoonlijk verschijnt. Doch zij bestaat veelmeer gelijktijdig met dezelve, dan dat zij daarin hare oorzaken hebben zoude; want de gevallen, waarin die omstandigheden en betrekkingen aanwezig zijn, en de ziekte niet ontstaat, zijn nog veel talrijker. — Datgene, wat mij het belangrijkste voorkomt, zal hier volgen.

Aanleg.

De aanleg is aangeboren of verworven. De aangeborene of geërfde aanleg vindt men bij kinderen, geteeld uit ouders, die óf in hunne kindschheid en jeugd het hoofdzeer gehad hebben, óf nog daaraan lijden. Zij worden aangetast, wanneer zij den leeftijd bereikt hebben, in welken hunne ouders het eerst aan die ziekte geleden hebben. Somwijlen komen zij daarmede reeds ter wereld.

Het wolfsboonvormig en het schildvormig hoofdzeer zijn erfelijk; de *furfurans* en de *savosa* zijn het niet. Intusschen zijn er nog altijd geneeskundigen, die de erfelijkheid van het hoofdzeer tegenspreken: waarschijnlijk, omdat hun de noodige gelegenheid ontbroken heeft, deze ziekte

van

nabij te leeren kennen. Eene reeks van gevallen zoude ik uit mijne ervaring kunnen mededeelen, waarin de kinderen, de ouders en de grootouders, en menigwerf geheele familiën aan kwaadaardig hoofdzeer geleden hebben. Deze waarnemingen, zoowel als het heerschend geloof aan overerving bij den volksstand, die het meest door deze ziekte te lijden heeft, en hare hoogduitsche benaming *Erbgrind*, hebben bij mij allen twijfel aan de erfelijkheid dezer ziekte weggenomen.

De kinderlijke leeftijd is het tijdperk, waarin het hoofdzeer in al zijne soorten en wijzigingen het menigvuldigst voorkomt. Het strookt niet met de ervaring, dat deze ziekte eerst na het sopen, — en bij zuigelingen alleen bij wijze van uitzondering, — zoude voorkomen. Echter mag men aannemen, dat de *tinea favosa* in de drie eerste levensjaren zeer veelvuldig gezien wordt; — dat de *tinea lupinosa* en *scutulata* in de meeste gevallen eerst in het derde jaar uitbot; — dat de *tinea furfuracea* bij kinderen wel meermalen, echter ook dikwijls bij volwassenen voorkomt; doch in hare wijziging, die den naam van *asbestina* draagt, alleen volwassenen aantast. Beide geslachten staan evenzeer aan het hoofdzeer bloot; doch schijnen er meer voorwerpen van het mannelijk dan van het vrouwelijk geslacht — althans na de ingetredene manbaarheid — door hetzelfde aangetast te worden. Of dit verschijnsel in den aard der ziekte, dan wel in toevallige omstandigheden gegrond is, wil ik niet beslissen. Het belang, dat het vrouwelijk geslacht, meer dan het mannelijk,

in een rein hoofd en in schoon hoofdhaar ſteit, doet haar voor hetzelfde meer zorg dragen; — terwijl vele ouders het verkieslijker vinden, het hoofd van hunnen zoon te verwaarlozen, om de genezing van het hoofdzeer tegen te werken, ten einde vrijſtelling van de krijgſdienſt te erlangen. Het zal wel voornamelijk hieraan zijn toe te ſchrijven, dat men, in den leeftijd van achttien tot vier en twintig jaren, veel meer jongelingen dan meisjes vindt, die aan hoofdzeer lijden.

ALIBERT en anderen meenen, dat de temperamenten en andere ligchaamsgeſteldheden eenen zeer kennelijken, de ontwikkeling van het hoofdzeer begunſtigenden invloed uitoefenen; dat de *tinea favosa* het meest bij het bloedrijke en galachtige temperament voorkomen, en wel bij voorwerpen met zwart, blond of rood haar; dat de *tinea mucosa* voornamelijk kinderen met goudgeel haar, en de *tinea granulata* alleen bruinharige aantast. — Dit moge in *Frankrijk* het geval zijn: bij ons ſchijnen deze eigenaardigheden geene plaats te vinden.

Wanneer men in aanmerking neemt, dat verreweg het grootſte getal der hoofdzeerlijders bij den geringen en behoeftigen volksſtand voorkomt, terwijl de hoogere ſtanden bijna geheel verſchoond blijven, dan komt men als van zelve tot de ſtelling, dat de gelegenheid gevende oorzaken voornamelijk in de leefwijze der verſchillende volksſtanden moeten gezocht worden. De meest onze opletendheid vorderende omſtandigheden zijn onreinheid en verwaarloozing der noodige behandeling van

Toevallige en gelegenheid gevende oorzaken.

van het hoofdhaar bij de behoeftigen; grove, zware, ongezonde voedsels, en gebrekkige voeding der kinderen van hunne vroegste jeugd af aan; vochtige en koude woningen, bij gebrek aan de noodige verwarming, en ondoelmatige legersteden. Dat het sterk broeijen van het hoofd, onderdrukte neusbloedingen en andere afscheidingen, door de natuur tot stand gebragt, tot de ontwikkeling van hoofdzeer kan aanleiding geven, wanneer er gelijktijdig meer andere schadelijkheden aanwezig zijn, wil ik niet in twijfel trekken. Minder waarschijnlijk komt het mij voor, dat de hartstogten der moeders en minnen, op eenigerlei wijze, het ontstaan dezer ziekten zouden kunnen begunstigen.

Eene der wezenlijkste en meest voorkomende oorzaken van de *tinea lupinosa* en *scutulata* bestaat in de besmetting. De gevallen, waarin het gemeenschappelijk gebruik van kammen, borstels, hoofdedfels, kleederen en beddegoed, door gezonde en zieke kinderen, het hoofzeer wordt medegedeeld, zijn te veelvuldig en te stellig bewezen, om in twijfel getrokken te kunnen worden.

De scrophuleuze, syphilitische en *lepra*-scherpten bij voorwerpen, door overerving van hunne ouders daarmede bedeeld, begunstigen de ontwikkeling van het hoofdzeer, en onderhouden hetzelfde, waar het eenmaal aanwezig is. Echter kunnen deze scherpten voor zich deze ziekte niet voortbrengen; maar de bijzondere aanleg, die aan iedere ziekte haar eigenaardig karakter geeft, moet gelijktijdig aanwezig zijn.

Waar-

Waarom bijna uitsluitend kinderen door hoofd- Naaste oorzaak.
 zeer aangetast worden, schijnt gegrond te zijn in
 de opgewekte reproductieve verrigtingen der huid
 van het hoofd in den kinderlijken leeftijd, en in
 den overvloed van voedende, echter slecht toebe-
 reide vochten, tot welker onschadelijkmaking en
 ontlasting de natuur buitengewone afscheidingen
 behoeft. In vele gevallen is het hoofd zeer derhal-
 ve eene ware *crisis*.

De [naaste oorzaak der *tinea favosa* en *furfurans* is meerendeels met scrophuleuze aandoen-
 ingen van het geheele watervaatstelsel verbonden,
 en alzoo eene gewijzigde plaatselijke aandoening
 eener algemeene ziekte.

Bij de *tinea lupinosa* en *scutulata* bestaat er
 een eigendommelijke toestand der bewerktuiging,
 voortgebracht óf door overerving van de ouders,
 óf door besmetting; — overblijffels der vroeger in
 deze landen zoo algemeen geheerscht hebbende me-
 laatschheid.

De *tinea furfurans* heeft haren zetel in de
 opperhuid en in het slijmnet van MALPIGIUS; —
 de *favosa* oppervlakkig in de huid, met gelijktij-
 dige aandoening der watervaatklieren van den hals
 en nek; — de *lupinosa* en *scutulata* zijn dieper
 in het weeffel der huid, het celweeffel en in het
 daarin bevatte vet gezeteld, met bederf der bolle-
 tjes en wortelen der haren. — Of dit lijden der
 haren de oorspronkelijke eerste aandoening en alzoo
 de oorzaak des uitlags, dan of hetzelfde een gevolg
 der ziekte is, blijft onzeker. Dit echter is waar:

dat op geene andere wijze van behandeling de genezing zoo spoedig volgt, dan op het uittrekken der haren met derzelve wortels. Ook de fmeerbeursjes deelen in het lijden der huid bij het hoofdzeer, maar ook te dezen blijft de vraag onbeslist: zijn deze aandoeningen de oorzaken of de gevolgen dezer ziekte?

De vochten, welke door de lijdende deelen der huid afgescheiden worden, scheikundig onderzocht, hebben geleerd, dat dezelve voornamelijk uit eiwit en gelei bestaan, gemengd in verschillende hoeveelheden bij de onderscheidene soorten van hoofdzeer. Maar ook hierdoor vordert de kennis van de naaste oorzaak dezer ziekte niet veel, want de afgescheidene vochten zijn de voortbrengfels, geenszins de oorzaak der ziekte verschillend gemengd naar aanleiding der wijzigingen, welke de verrigtingen der afscheidende bewerktuiging, zoowel door aanwezige ziekte, als door andere uit- en inwendige invloeden, ondergaan.

Voorzegging. Naar aanleiding van de verschillende wijzigingen, waarin het hoofdzeer voorkomt, is de voorzegging te regelen. De *tinea furfurans* (hoofdschilfering) is eene ligte, gevaarlooze, maar langdurige ziekte, die door de natuur alleen, zonder kunsthulp, geneest, met uitzondering in den vorm der *asbestina*, waarin zij meermalen voor de natuur en voor de kunst ongeneesbaar blijft.

De *tinea favosa* moet voornamelijk beoordeeld worden naar den meer of min ontwikkelden toestand der scrophuleuze aandoeningen. Zijn deze slechts

in

in eenen ligten graad of in het geheel niet aanwezig, dan heeft de ziekte weinig te beduiden en geneest, bij de noodige reinheid en verzorging, in den tijd van drie tot vier weken, maar is genegen van tijd tot tijd weder te keeren, zoo lang de scrophuleuze toestand niet genezen is. Uit de betrekking, waarin de *tinea favosa* tot het algemeen lijden der bewerktuiging staat, behoort men te oordeelen, of dezelve als eene heilzame afleiding moet gepleegd, dan als eene schadelijke afleiding moet genezen worden. Dikwijls toch is de gezondheidstoestand der lijders het best, wanneer het hoofd met uitslag bedekt is, en worden zij ziek, wanneer hetzelfde spoedig opdroogt of geheel verdwijnt. De *tinea favosa* oefent geen schadelijken invloed op de ligchamelijke en geestige ontwikkeling der lijders uit, ten zij door andere ziekten te verwekken, welke de verrigtingen van de reproductie en het zenuwleven storen. Nimmer door kaalhoofdigheid gevolgd, bekomen de meeste lijders na de genezing dicht en zeer schoon hoofdhaar.

Het wolfsboonvormige en schildvormige hoofdzeer (*tinea lupinosa et scutulata*) zijn zeer hardnekkige, langdurige, menigwerf ongeneesbare ziekten, die de natuur, nadat het tijdperk der manbaarheid is ingetreden, meermalen dan de kunst overwint. De ligchamelijke en geestelijke ontwikkeling wordt er door vertraagd; zij bederven de wortelen der haren en doen dezelve uitvallen; na de genezing blijft de haargroei gebrekkig, en vroeger, dan bij andere lieden, ontstaat er kaalhoofdigheid. Op zich

zelf beschouwd is het hoofdzeer in al zijne wijzigingen geene gevaarlijke, maar hoogst onaangename ziekte, die alleen door bijkomende omstandigheden en plaatsvindende complicatiën gevaarlijk kan worden.

Geneeskundige behandeling.

Geenszins deelende in het gevoelen van die geneeskundigen, welke het hoofdzeer in alle voorkomende gedaanten voor eene zuivere plaatselijke ziekte houden, hetzelfde alleen plaatselijk behandelen, en nimmer schromen eene spoedige genezing tot stand te brengen; omhels ik evenmin de beginselen van hen, die ieder hoofdzeer voor de plaatselijke *crisis* eener algemeene ziekte beschouwen, en uit dien hoofde eene onderhoudende behandeling, maar geene genezing willen, alle uitwendige middelen schuwen, en iedere ziekte, van welke natuur die ook zijn moge, gedurende of na de genezing van het hoofdzeer voorkomende, voor eene verplaatsing van hetzelfde naar edeler deelen houden. Men zal ook hier het doelmatigst handelen door de uitersten te vermijden. Er komen gevallen voor, waarin, wegens het algemeen lijden der bewerktuiging, eene meer afwachtende, — andere, waarin eene meer werkdadige behandeling gevorderd wordt, hetzij alleen plaatselijk, hetzij algemeen, of beide vereenigd toe te passen.

Het hoofdzeer vordert, in overeenstemming met de onderscheidene vormen, waarin het voorkomt, verschillende en gewijzigde behandeling.

Porriga, *Tinea Furfurans*, hoofdschilfering, vordert in hare eenvoudige gedaante zelden eene bij-

bijzondere geneeskundige behandeling. Als drooge hoofdschilfering, of zoogenaamde roos op het hoofd, is het genoeg, de haren kort te houden, de losse schilfers door kammen en borstelen dagelijks weg te nemen, daarna het hoofd des morgens met een flap zeepfop van witte zeep te reinigen, en, dit geschied zijnde, hetzelfde met brandewijn of *eau de Cologne* af te wasschen. De lijder vermijde scherpe, zure en vette spijzen, drage het hoofd bloot of zeer ligt gedekt, en men onttrekke hem tevens aan alle invloeden, die congestiën naar het hoofd kunnen verwekken. Alleen dan, wanneer bekende oorzaken aanwezig zijn, welke storend op de geheele bewerktuiging inwerken, is het noodig, inwendige geneesmiddelen toe te dienen. Wanneer de hoofdschilfering haren hoogsten trap bereikt, en het hoofd met witte glinsterende schilfers, tot eene korst vereenigd, overdekt wordt (*tinea asbestina*), welke eene algemeene *dyscrasia* (vochtverbastering) gewoonlijk onderhoudt, dan rigt men met de eenvoudige behandeling der gewone hoofdschilfering niet veel uit: men moet tot eene meer vermogende geneeswijze overgaan, het hoofd laten kaal scheeren en dit tweemaal in de week herhalen, des morgens en des avonds met zeepfop wasschen en wrijven, zoo lang de lijdens het kunnen uithouden. Bij eene teedere, zeer prikkelbare, tot ontsteking genegene huid bezige men de witte, — bij eene ruwe, min aandoenlijke de groene of zwarte zeep. Na de wasschingen, als het hoofd geheel is opgedroogd, wordt hetzelfde met subli-

maat-oplossing gebet, of met *unguentum neapolitanum*, ééne once met ééne drachma *flores zinci* ter dege ingewreven en met eené schoone linnen muts gedekt. Inwendig geve men de corrigerende poeders uit *calomel*, *sulphur auratum*, *rhabarber* en *magnesia* tot onderhouding eener toereikende buikontlasting, plaatse eene fontanel op den arm, en beperke den leefregel tot niet prikkelende, noch vette, noch verhittende, maar tot ligt verteerbare versche voedfels uit het dieren- en plantenrijk. De genezing is altijd moeilijk en vordert veel tijd. Met de aangewezenen behandeling niet slagende, beproeve men de waschingen en zalven, bij de behandeling der *porrigo lupinosa* en *scutulata* nader aan te wijzen. Ook daarmede het doel niet bereikende, is het uittrekken der haren door middel van pikpleisters het eenige, dat nog helpen kan.

Het natrovige hoofdzeer, klieren op het hoofd, (*porrigo*, *tinea favosa*), vordert, dat men bij de geneeskundige behandeling op verschillende omstandigheden, vooral op de veelal plaats hebbende scrophuleuze complicatiën, acht geve en met voorzigtigheid te werk ga. De behandeling is deels algemeen, deels plaatselijk, actief of afwachtend.

In al de gevallen, waarin de scrophuleuze geaardheid of complicatie duidelijk ontwikkeld is, zijn de corrigerende of anti-scrophuleuze geneesmiddelen aangewezen. Men beginne met aan de lijders om de twee, drie of vier dagen een lakseermiddel te geven uit *jalappe* met *calomel*, geëvenredigd aan den leeftijd en de meerdere of mindere traagheid

heid van de verrigtingen der buiksingewanden , geve daags drie tot vier giften *mercurius dulcis* en *fulphur auratum* , of den *aethiops antimonialis* met de poeder der driekleurige viool , afkookfels van de *dulc-amara* of *radix sassaaparilla* ; plaatse eene fontanel op den arm , voede de lijders met ligt verteerbare , gezonde , eenvoudige spijzen , vermijde vette , gezouten en gerookte voedsels , drage zorg , dat het hoofd niet gebroeid , maar luchtig worde gehouden , alsmede , dat de lijders bij goed weder in de vrije lucht veel in beweging gehouden worden .

Indien bij de eerste uitbotting de ontsteking zeer hevig is , de halsklieren sterk zwellen , de lijders volsappig en goed bij krachten zijn , dan is het geraden , eenige bloedzuigers achter de ooren te zetten . Tot de plaatselijke behandeling behoort het zoo kort mogelijk affnijden der haren , de reiniging van het hoofd door waschingen met witte-zeepsof , dagelijks eenige keeren te herhalen . De weeke of groene zeep is doorgaans te scherp , verwekt noodeloos pijn en vermeedert de ontsteking . Daar bij deze soort van hoofdzeer de luizen onbegrijpelijk snel en ongeloofbaar talrijk ontstaan , zoo is het vooral noodig het hoofd door kammen en borstelen , zoo veel mogelijk , van deze infekten te zuiveren . Eerst dan , wanneer de algemeen ziekelijke toestand der bewerktuiging verbeterd is , en het plaatselijk lijden de toevallen eener verhoogde terugwerking en prikkeling niet meer oplevert , mag men de genezing beproeven door zalven met kwikberei-

dingen, spiauterbloemen en andere opdroogende metaalkalken plaatselijk aan te wenden. Van geen middel maak ik met meer voldoening gebruik, dan van de roode kwik-præcipitaat, één scrupel tot ééne drachma op ééne once vet. De opdrooging der puisten kan er spoedig mede bevorderd worden, en het doodt die ontelbare menigte lastige infekten, die, door de huid te knagen, den lijder tot onophoudelijk krabben dwingen, de ziekte onderhouden en erger maken.

In gevallen, waarin de kinderen vóór de uitbotting des uitflags ziekelijk of minder welvarend waren, aan aandoening der oogen en der ooren lijdende, maar na de uitbotting eene goede of verbeterde gezondheid genieten, trachte men door inwendige middelen de oorzaak der ziekte op te ruimen; terwijl zich de plaatselijke behandeling alleen tot reinheid der lijdende deelen beperkt; verder den tijd afwachtende, die het geraden maakt, de ziekte door behulp van uitwendige middelen te genezen.

Het is eene bewezene zaak, dat de *porrigo favosa* in vele gevallen eene critische beweging der natuur is, die door belemmeringen zich verplaatsen en tot schadelijke en gevaarlijke toevallen aanleiding geeft. Slepande buikloop, die de krachten uitput, ontstekingen der ademhalingswerktuigen, der oogen en der ooren, met verlies dier zinwerktuigen, maar voornamelijk de hersenvlies-ontstekingen, de heete waterzucht der hersenen, zijn menigwerf niet anders dan de gevolgen der onberedeneerde uitwendige be-

behandeling, eer nog door eene doelmatige algemeene behandeling de oorzaak der ziekte was opgeruimd. Het is in foortgelijke gevallen vooral noodig, en de eerste aanwijzing, waaraan voldaan dient te worden, dat men den uitslag zoo spoedig mogelijk op nieuw doe uitbotten, en de algemeene bekleedfelen van het hoofd tot dien trap van wederwerking door indringende prikkels opwekke, welke noodig is, gedurende eenigen tijd eene ruime afscheiding te onderhouden. Het spoedigst bereikt men dit doel, door het kaalgeschoren hoofd met eene spaansche-vliegpleister te bedekken; ook door inwrijvingen met de braakwijnsteen-zalf of met de *oleum tigllii crotonis*. Nadat de uitslag is terug gekeerd, blijve men voortgaan met de oorzaak door inwendige middelen op te ruimen, door uitwendige den uitslag te onderhouden, en door eene fontanel of haarfnoer eene afleiding te bewerken.

Porrigio S. tineae lupinosa et scutulata. Het wolfsboon- en schildvormige hoofdzeer. Deze aandoeningen van de huid, geheel andere ziektevormen daarstellende dan de vorige, vorderen eene eigene geneeswijze.

Zoo lang het hoofdzeer in eenen der genoemde vormen bestaan blijft, gaan de lichamelijke en de geestige ontwikkeling der lijders langzaam voort; hun voorkomen kenfchetst kwaadsappigheid, het aangezicht is bleek en opgezet, de oogen slaan flauw, het geheel der gelaatstrekken wijst op stompzinnigheid. De voeten zijn menigwerf zuchtig gezwollen. Zoodra de genezing tot stand komt, — on-

verschillig of dit door de natuur of door de kunst geschiedt, — krijgen de lijdens een helder, meer opgewekt uiterlijk, hunne ligchamelijke en geestige ontwikkeling gaan spoedig voort, zoodat de lijdens, korten tijd na de genezing, door zulke gunstige veranderingen onkenbaar werden. Schadelijke gevolgen heb ik nimmer op de genezing zien plaatsgrijpen. Het schijnt mij toe, dat de genezing der *porrigo lupinosa* en *scutulata* ten allen tijde langs den spoedigsten en kortsten weg mag beproefd worden. Veel zeldzamer dan bij de *porrigo favosa* is eene algemeene inwendige behandeling noodig, en meerendeels is de plaatselijke alleen toereikend. Voor men echter daartoe overgaat, drage men zorg, dat de aanwezig zijnde bekende oorzaken of complicatiën, welke eenen schadelijken invloed uitoefenen, opgeruimd worden, naar aanleiding van hare verschillende geaardheden. Tevens herstelle en onderhoude men de afscheidingen en ontlastingen, wekke de trage en gebrekkige spijsvertering door bittere middelen, verbonden met zwavelbloem en *antimonium* op, en onderhoude door *jalappe* met *calomel* den stoelgang. Bij eene drooge en schilferende huid, en vooral wanneer er roven van het wolfsboon- en schildvormige hoofdzeer, ook op andere deelen buiten het hoofd voorkomen, zijn de afkookfels der geneeskrachtige houten, wortelen en basten: het *guajac*-, *sassafras*- en jeneverbesenhout, de *sasaparilla*-wortel, en bij voorkeur de olmbast aangewezen; — van den laatsten niet alleen inwendig, maar ook

uitwendig tot waschingen. De syphilitische of scrophuleuze complicatiën vorderen gelijktijdig het gebruik der kwik en der spiesglasbereidingen. Met de inwendige behandeling pare men de uitwendige, en bereide dezelve vóór, door het hoofd te laten kaalscheren en hetzelfde van alle schilfers, roven en korsten te zuiveren. Door inwrijvingen met olie of andere vette zelfstandigheden en door waschingen met zeeplop, worden de korsten gewoonlijk spoedig los en vallen af. Slaagt men hiermede niet, dan bedekke men de vastblijvende korsten met weekmakende pappen of met doeken, in olie gedoopt. Na de volkomen tot stand gebragte reiniging van het hoofd, beginne men de uitwendige middelen aan te wenden.

„Hoe meer middelen tegen eene ziekte aangeprezen worden, zoo veel te moeilijker is het, haar te genezen.” Ten aanzien van het hoofdzeer, in de wijzigingen, waarvan wij nu spreken, is deze uitspraak eene onbetwistbare waarheid. Men zoude een geheel boekdeel moeten volschrijven, wanneer men al de uitwendige middelen wilde opsommen, welke van de vroegste tijden af tot op onzen leeftijd tegen het hoofdzeer zijn aangeraden en in gebruik gebragt. En toch blijft hetzelfde voor den rationeel handelenden geneesheer vaak eene ongeeneesbare ziekte, om eindelijk door zoogenaamde geheime middelen, door oude vrouwen of kwakzalvers genezen te worden.

Ik zal alleen van die behandeling en die middelen spreken, welke naar mijne overtuiging navolging en aanprijzing verdienen.

Naar-

Naarmate de huid in eenen meer of minder geprikkelden toestand verkeert, kieze men de zachter of sterker prikkelende middelen. Men beginne, na de voorafgegane zuivering van het hoofd, met eene wasfching, uit twee drachma *kali* of *natron carbonicum acidulum* op ééne pint water of in nog kleinere hoeveelheid opgelost; met toevoeging van drie drachmen witte zeep en ééne drachma *alcohol*, wanneer men eene sterke prikkeling bedoelt. Ook kan het *kali* of *natron carbonicum*, van ééne tot twee drachmen met ééne once vet, tot eene zalf gemaakt, ingewreven worden. De nog overig geblevene haren vallen onder het gebruik dezer middelen met hunne wortelen spoedig uit, en kunnen de genezing tot stand brengen. Spoediger en zekerder slaagt men intusfchen door het uittrekken der haren met pikpleisters. Hoe zeer men deze laatste behandeling als eene afschuwelijke en barbaarsche geneeswijze uitkrijt en uit het gebied der kunst wil verbannen hebben, zoo houde ik mij toch overtuigd, dat zij steeds zal blijven bestaan, en de laatste, maar zekere toevlugt blijven zal voor lijders, welke alle mogelijke uitwendige middelen vruchteloos gebruikt hebben. De tallooze wel geslaagde genezingen door de behandeling met pikpleisters, veelal aan oude vrouwen en onbevoegde personen overgelaten, zullen nog langen tijd het vooroordeel in stand houden en het geloof ondersteunen: dat de genezing van het kwaadaardige hoofdzeer niet bij doctors en chirurgijns, maar bij lieden, die buiten de kunst zijn, moet

gezocht worden en te vinden is. Deze behandeling is ook zóó pijnlijk niet, als velen haar wel uitkrijten, daar de haren, wegens het bederf van derzelve wortelen losstaan en gemakkelijk uitgetrokken worden. Wanneer men zich door de hardnekkigheid van het hoofd zeer gedwongen vindt, tot het uittrekken der haren zijne toevlugt te nemen, dan bedekke men het hoofd op de aangedane deelen — en niet verder, om het uittrekken van gezonde haren en daardoor verwekt wordende pijnen te verhoeden — met strooken, die niet te breed mogen zijn, van pikpleisters op zeemleder gesmeerd, late dezelve eenige dagen liggen, en neme ze dan, nadat zij aan het eene einde losgemaakt zijn, tusschen eene wel fluitende tang, in eenen ruk weg, terwijl men, met de vingers van de andere hand de huid naar zich toe trekkende, dezelve sterk spant. Al de pleisterstrooken kan men achtereenvolgend in eens, of dagelijks bij gedeelten wegnemen. Dit geschied zijnde, reinige men het hoofd door zeepsoep, drooge het goed af en wrijfve op hetzelfde de zalf in, uit *flor. zinci, mercurius praecipitatus albus* à dr. 1, *axung. porci* unc 1 en herhale die inwrijvingen dagelijks twee à drie malen, zoo lang tot dat de geheele haar-groei zich herstelt. Meermalen gebeurt het, dat ééne trekking niet toereikt, en er hier en daar op nieuw ontstokene vlekken voorkomen, op welke puisten uitbotten, die tot korsten verdroogen. Waardit plaats vindt, moeten die gedeelten andermaal en bij herhaling met pikpleisters behandeld worden.

Wan-

Wanneer, na de reiniging van het hoofd door de *kali* of *natron*-oplossing, de huid in eenen te sterk geprikkelden toestand verkeert, dan trachte men dezen door verzachtende pappen uit lijnzaadmeel, kruim van wittebrood met *aqua goulardi*, lappen in olie gedoopt of met andere verzachtende vette zelfstandigheden te bedaren. Vervolgens gaat men tot opdroogende middelen over: eerst de zachtere, later de sterker werkende toedienende. De zalven uit *flores zinci*, loodwit, witte *praecipitaat*, enz., *aqua goulardi* en eene zwakke oplossing van witte vitriool in gedistilleerd water, geven middelen aan de hand, waaruit men kiezen kan. Om de te zeer opgewekte terugwerking der huid te bedaren, kan men ook van de verdoovende planten gebruik maken, en de lijdende deelen bedekken met afkookfels of pappen uit witte papaverbollen, scheerling, bilsenkruid, enz., met eene meelachtige stof bereid. Waar de verhoogde terugwerking met ruime afscheiding van scherpe vochten, die de omringende huiddeelen ontvellen, gepaard gaat, keere men tot de opdroogende, straks genoemde zalven met kwik-, *spiauter*- en loodbereidingen terug, of bezige het *unguentum citrinum*, *neapolitanum* met *flor. zinci*, de zalf uit twee drachmen *calomel* met ééne once reuzel, of die uit gelijke deelen zwavel en groene zeep bestaat.

Bij geringe opwekking der huid met droogte of dorheid van dezelve, zijn de meer prikkelende middelen aangewezen. Na eenigen tijd met de zalf uit *kali* of *natron carbonicum acidulum* met ver

te hebben volgehouden, zonder in de genezing te flagen, beproeve men de zwavelzalf, de minerale zuren, in de hoeveelheid van twee tot drie drachmen met ééne once vet of olie gemengd, de roode-kwik-*praecipitaat*, ééne drachma op ééne once *unguentum basiliconis* of deze zalven:

R. *Pulver. feminis cocculi indici* dr. ii
Axung. porci unc. i.
 m.

R. *Picrotoxii* gr. x.
axung. porci unc i
 m. S.

des morgens en des avonds het hoofd mede in te wrijven.

R. *Hb. Nicotianae* dr. ii
coque c. f. q. aq. comm.
colat. unc. xii.

om het hoofd te wasfchen; echter met omzigtigheid te gebruiken, daar dit middel dezelfde toevallen kan verwekken, die men op het inwendige gebruik van den tabak ziet volgen.

De eerst hoog geprezene zalven uit poeder van lindenhout- en andere hout- of steenkolen, twee drachmen met eene gelijke hoeveelheid *natron carbonicum acid.* op ééne once *unguentum rosatum*, beantwoorden niet aan de opgevatte verwachting.

Wanneer er, wegens de aan gevoelloosheid grenzende werkeloosheid der algemeene bekleedfe-
 len van het hoofd, nog meer doordringende pri-
 kels

kels gevorderd worden, beproeve men de niet zonder vrucht gebruik wordende wasfchingen met fublimaatoploffing, één grein op ééne once; fpaanfch groen, één tot zes greinen op ééne once water; *lapis infernalis*, één tot vier greinen op ééne once gedistilleerd water; de met water verdunde zee-zout- en falpeterzuren; het *unguentum picis et petroleum à part. aequales*, gedurende een uur warm in te wrijven, waarna men het hoofd met eene blaas bedekt: — de nog overig geblevene haren worden door dit middel los en kunnen met de wortels worden weggenomen, De zalven uit teer, was, *myrrhe*, *elemi*-gom, terpentijn en zwavel op verfchillende wijzen zamengefteld en bercid; pleifters uit teer, gele was en zwavel, of uit *ammoniac*-gom, in azijn opgelost, vervaardigd, mengfels van vet en helleborus, fpaanfche en gewone peper, fabadilla-zaad, wijnruit, enz. kunnen bij verwifeling in de hardnekkigfte gevallen beproefd worden.

BIETT heeft inwrijvingen des morgens en des avonds met een mengfel uit *joduretum sulphuris*, één fcrupel tot ééne halve drachma en ééne once reuzel, bijzonder aanbevolen. Daar hij echter later weder de zalf van GOUDET gebruikt, zoo mag men vooronderftellen, dat de uitkomsten op den duur voor het *joduretum sulphuris* niet gunftig geweest zijn.

Ook worden fpaanfche-vliegenpleifters over het geheele hoofd, de zalven met rattenkruid, *butyrum antimonii*, *lapis infernalis*, de onverdunde

minerale zuren, met oogmerk om de lijdende huiddeelen te vernietigen, aangeraden. Geene dezer middelen hebben aan de verwachting beantwoord, en men zag na de genezing der vernietigde huiddeelen het hoofdzeer op nieuw te voorschijn komen.

5^e. Orde.

Papulae. Peukels.

Kleine, puntige, meer of min harde, dikwijls Bepaling.
beter door het gevoel dan door het gezigt te ontdekken verhevenheden der opperhuid, op eene ontstokene oppervlakte, die geen vocht bevatten, niet zweren, zemelachtig afschilferen en onbepaald van duur zijn, gepaard met jeukte, die somwijlen ondragelijk hevig worden kan.

De peukelachtige huidontaardingen verloop^{en} bin⁻ Beloop, ze-
nen verschillende tijdkringen, in de eene gedaante^{tel en duur.}
binnen eenige weken; in de andere duren zij maanden en jaren. De geheele oppervlakte des ligchaams staat voor dezelve bloot, in dier voege, dat nu het eene, dan het andere deel het meest te lijden heeft. De slepende, peukelachtige huidziekten zijn niet besmettend en heerschen nimmer epidemisch. Men ziet dezelve bij beide geslachten en in alle tijdperken des levens; in de eene gedaante bijna uitfluitend bij zuigelingen en kinderen, in de andere bij volwasfenen en grijsaards. Zij zijn meer symptomatisch dan idiopathisch, en gaan gewoonlijk met stoornissen in de verrigtingen van eenig deel der bewerktuiging en met eenengeprikkelden toestand der buksingewanden gepaard. De vergezellende ontsteking der huid is gering, meer van eene pasfive, dan active

geëardheid. Of de peukels ontaarde huidtepeltes zijn, of als plantaardige bewerktuigingen moeten beschouwd worden, blijft onbeslist.

Op zich zelve en zonder complicatiën, gaan de peukelachtige huidziekten met geen gevaar verbonden, en worden veelmalen alleen door de natuur, of door geringe kunsthulp genezen. Uit oorzaken, die verborgen in de bewerktuiging schuilen, ontstaan zijnde, blijven zij ongeneeslijk, zoo lang als gene niet kunnen opgeruimd worden.

Men onderscheidt de drie volgende soorten:

- a.) *Strophulus*. Zuur- of tanduitslag.
- b.) *Lichen*. Huidmos.
- c.) *Prurigo*. Peukelachtige huidjeukte.

a.) *Strophulus*. Zuur- of tanduitslag.

Deze aan den kinderlijken leeftijd eigene huidziekte wordt door R. WILLAN en H. BATEMAN als eene bijzondere soort van uitslag beschreven. In *Engeland* en *Duitschland* schijnt dezelve meer algemeen dan in *Frankrijk*; althans men vindt ze bij de geneeskundigen der beide eerstgenoemde landen uitvoerig en onder eigene benaming beschreven; bij die van het laatste daarentegen wordt zij slechts ter loops aangewezen. P. RAIJER is hierop echter eene uitzondering; doch deze maakt de aanmerking: dat deze uitslag bij de moeders en kinderoppasters meer bekend is, dan bij de geneesheeren. Bij ons komt dezelve menigvuldig voor, maar ligt en goedaardig zijnde, wordt hij weinig geteld, te minder, omdat hij onder geen eigen naam bekend is. Bij

zui-

zuigelingen voorkomende , wordt hij aan het zuur toegeschreven , en de vrouwen zeggen dan : het zuur slaat uit. Bij oudere kinderen zich opdoende , zoekt men deszelfs oorzaak in het tanden krijgen. Merigwerf heeft men denzelven verkeerdelijk als eenen voorbode of als het begin van melkkorst en dauwworm beschouwd , — ook wel aan scrophuleuze scherpten toegekend.

R. WILLAN onderscheidt vijf soorten , die echter moeilijk van elkander te onderkennen , en eerder voor wijzigingen , dan voor wezenlijk verschillende soorten te houden zijn.

1. *Strophulus interstinctus ruber*. De roode zuur-uitslag. (*Red-gum* der Engelschen).

Roode peukels , die voornamelijk op de wangen , Bepaling. op de rugzijde der voorarmen , der handen en somwijlen over het geheele ligchaam bij zuigelingen uitbotten. De peukels jeuken , staan afgescheiden van elkander ; tuschen dezelve ziet men roode stippen en grootere , niet verhevene vlekken. De peukels gaan nimmer tot verettering over , maar verdroogen en schilferen af. Somwijlen komen er gelijktijdig op de handen en de voeten kleine , heldere , doorschijnende blaasjes voor , die verdroogen.

2. *Strophulus albidus*. De witte zuur-uitslag.

De kleine , witte , weinig boven de huid verhevene jeukende peukels staan tot plekken vereenigd bij elkander , door eenen ligtrood gekleurden ring omgeven. Zij zijn eene wijziging van de voor-

de , komen menigwerf met elkander gepaard voor , en onderscheiden zich alleen door hare verschillende kleuren.

3. *Strophulus confectus*. Tanduitslag.
(*Feux de dents*).

In de vierde of vijfde maand na de geboorte , met de beginnende tandontwikkeling , en gedurende het geheele tijdperk van het tanden krijgen , grijpt de uitbotting op de wangen en het voorhoofd plaats. De peukels zijn klein , jeuken , talrijk , staan dicht opgehoopt in plekken vereenigd , afgescheiden of ineenvloeiend , en zijn zeer ligt-rood gekleurd. Zijn de kinderen zeven à acht maanden oud , dan grijpt de uitbotting met grootere onregelmatige plekken op de buitenzijde der armen en handen en op de schouders plaats. De peukels zijn grooter , hooger , rood gekleurd , hard , en staan in digte groepen bij elkander. Binnen veertien dagen tot drie weken , worden dezelve dor , schilferen af en verdwijnen allengskens ; maar meermalen grijpen er , na verloop van eenige weken , nieuwe uitbottingen plaats.

4. *Strophulus Volaticus*. De vurige tanduitslag.

Deze komt het menigvuldigst voor. De uitbotting gaat met koortsbeweging gepaard , en grijpt niet in eens , maar achtereenvolgend op de wangen en op de andere deelen des ligchaams plaats. Op kringvormige vlekken , ter grootte van een dubbeltje tot eenen gulden , staan de peukels groepswijze bij

bij elkander; zij hebben eene hoogroode kleur, zijn hard, en jeuken; na verloop van vier dagen zijn zij naauwelijks meer zichtbaar. De vlekken bekomen eene bruinachtige kleur en schilferen af. Door de herhaalde uitbotting wordt de duur dezer ziekte van drie tot vier weken gerekt.

5. *Strophulus Candidus*. De glinsterende tanduitslag.

De peukels zijn grooter dan de vorige, staan enkel hier en daar verstrooid, op eene ongekleurde oppervlakte, zijn plat, ligter van kleur dan de opperhuid en glinsteren. De schouders, de opperarmen en de lendenen zijn de gewone zitplaatsen der peukels. Eerst na zes tot tien dagen grijpt er allengskens eene ligte afschilfering plaats. Menigwerf ziet men dezen uitslag bij kinderen van een paar jaar oud, nadat zij eene heete ziekte hebben doorgestaan: dezelve schijnt in deze gevallen kritisch te zijn.

Verstijming in de buiksingewanden en het verzu-
ren van zware, overmatig gebruikte voedfels, de ontwikkeling der tanden, voorafgegaane ziekten, onvolkomene ontwikkeling der *scrophulae*, verwaarloosde zuivering der huid, onreinheid in kleding en beddegoed, het gebruik van wollen dekens zonder beddelakens, zoodat de wol met het aangezicht en andere deelen in onmiddellijke aanraking komt, — heeft men, alhoewel met weinig zekerheid, beurtelings als de oorzaken van dezen uitslag beschouwd.

Oorzaken

Onderschei-
dings-ken-
teekenen.
Diagnostica.

De penkelachtige geaardheid des uitflags steeds voor oogen houdende, kan men de *strophulus* niet ligt met andere, dan met de twee penkelachtige huidziekten, namelijk, de *lichen* en de *porrigo* verwisfelen. Met de *lichen* is de *strophulus* naauw verwant, zoodat BIETT deze slechts als eene wijziging van gene aanmerkt. Zij onderscheiden zich daarin van elkander, dat de *strophulus* slechts kinderen, de *lichen* jeugdige en volwasfene personen aantast. De eerste bot bij herhaling met tusfchenpoozingen uit; de uitbottingen verloopfen spoedig, de ziekte, die zij daarstellen, heeft weinig te be- teekenen en wordt door geene vervelling gevolgd gelijk de *lichen*.

Van de *porrigo* onderscheidt zich de *strophulus* daarin, dat de huid bij deze rooder of witter is, dat de peukels bij *porrigo* meer algemeen over het geheele ligchaam zijn verbreid, alleen in de gevorderde levenstijdperken en bij oude lieden voorkomt, ondragelijke jeukte veroorzaakt, en vaak met zelfontwikkeling (*generatio aequivoca*) van ontelbare luizen gepaard gaat.

Voorzegging. De *strophulus* is eene geringe, weinig beduidende ziekte, die meerendeels alleen door de natuur genezen wordt; en strekt ten bewijze, dat voorbijgaande consensuele prikkels de huid tot eene verhoogde werkdadigheid gebragt hadden.

Geneeskun-
dige behan-
deling.

Deze vordert weinig of geene geneesmiddelen.

Men ondersteune de natuur door wasfchingen en baden met warm water, om het ligchaam te reinigen; door kleeding en beddegoed dikwijls te ver-

wis-

wisfelen; door den lijder niet overtollig warm te houden, en door eenen geregelten en matig voedenden leefregel floornisfen in de verrigtingen der spijsverteringswerktuigen te verhoeden. De buiksontlasting traag zijnde, geve men een lakfeermiddel uit rhabarber; — vereenigd met magnesia, waar zuur in de maag aanwezig is. Moeijelijkheden in de ontwikkeling der tanden moeten volgens de gegevene aanwijzing behandeld worden, want de consensuele prikkeling opgeruimd zijnde, verdwijnt de uitflag van zelf. Aanwezige scrophuleuze aandoeningen vorderen voor eenigen tijd de kwik- en spiesglasbereidingen. Hebben de krachten ten gevolge, der gastrische of van andere oorzaken geleden dan heeft de koortsbast in afkookfel of extract goede diensten bewezen. Uitwendige middelen zijn onnoodig en schadelijk. Volgt op het spoedig verdwijnen des uitflags een algemeen lijden der bewerktuiging of van enkele deelen, dan trachte men door een warm bad, prikkelende inwrijvingen en oplegfels den uitflag op de huid te herstellen.

6. *Lichen*. Huidmos.

Kleine, harde penkels, ligt- of hoogrood ge- Bepaling.
kleurd, enkel en verstrooid staande, of in plekken van velerlei gedaanten opgehoopt, die op alle deelen des lichaams voorkomen, met ontsteking der huid en jeukte gepaard gaan, gewoonlijk zemelachtig affschilferen, menigwerf ook oppervlakkige ontvellingen van eene hardnekkige geëardheid verwekken.

R. WILLAN was de eerste, die den naam *lichen* op de peukelachtige huidziekten toepaste. De latere schrijvers over de huidziekten hebben zijn voorbeeld gevolgd, zoodat die benaming thans algemeen is aangenomen. De schrijvers vóór WILLAN bragten dezelve onder de *impetigines* en de *herpes*.

De huidmos is niet besmettend; gewoonlijk eene plaatselijke, tot den rug der handen en voeten, den hals en het aangezicht beperkt; somwijlen ook is het eene over de geheele oppervlakte des ligchaams verbreide ziekte, gemeenlijk van een slepend, zelden van een haastig verloop. Koortsachtige bewegingen zijn in het begin der ziekte niet zelden, en veelmalen een algemeen kwalijk bevinden zonder bepaald karakter aanwezig, waardoor dezelve zeer langdurig wordt. Men onderscheidt de volgende soorten:

1. *Lichen Simplex*. De eenvoudige huidmos.

Deze is de meest voorkomende. De kleine gierstkorrel-vormige peukels staan door grootere of kleinere tusschenruimten van elkander afgezonderd, hebben eene ligtroode kleur, of zijn alleen door eenen kleinen, weinig rood gekleurden kring omgeven. De uitbotting wordt, gedurende eenige dagen, door koortsachtige aandoeningen voorafgegaan. Wanneer de uitslag niet zeer talrijk noch algemeen verbreid, en de huidwerkdadigheid niet zeer opgewekt is, ook geene ontstekingsaardige aandoeningen van eenig ingewand er mede gepaard gaan, houden
alle

alle algemeene toevallen op , zoodra de uitbotting tot stand is gekomen. De uitflag blijft tot enkele deelen der huid beperkt, of breidt zich meer algemeen uit; komt het eerst in het aangezicht of op de armen te voorschijn , en verbreidt zich binnen weinige dagen over de ledematen en den tronk. In het aangezicht zijn de peukels doorgaans grooter en harder dan op de borst en de ledematen. De jeukte is nu meer , dan minder hevig en pijnlijk ; in de warmte , des nachts en gedurende de herhalende uitbottingen zijn dezelve het lastigst. Na verloop van zeven tot tien dagen worden de peukels bleeker van kleur en kleiner van omtrek , en verdroogen met zemelachtige afschilfering der opperhuid. Zelden bereikt de ziekte op deze wijze haar einde , dewijl door herhaalde uitbottingen derzelve duur gewoonlijk tot weken en maanden verlengd huid. Somwijlen verdroogt de uitflag , zonder dat er afschilfering plaats heeft , maar dezelve keert meermalen terug. Dat de eenvoudige huidmos in *psoriasis* overgaat , ontkent BLASIUS ; maar beweert daarentegen , dat door onreinheden en andere schadelijke uitwendige invloeden de overgang in *ecthyma* plaats grijpt , maar dat de *lichen* later weder te voorschijn treedt.

2. *Lichen pilaris*. Haarmos.

Deze soort verschilt van de vorige daarin , dat dezelve alleen op behaarde deelen voorkomt ; de haarbolletjes zijn bij dezelve mede aangedaan , en

door iedere peukel gaat een haar. De gevoeligheid der huid is zeer verhoogd, en de vergezellende jeukte hevig; het aanhoudende krabben en wrijven doet de peukels tot bulten oploopen. Dikwijls wordt de haarmos zeer langdurig, keert in den zomer en het najaar terug, wisselende soms met hoofdpijn en maagkramp af.

3. *Lichen circumscriptus*. De afgeperkte huidmos.

De peukels zijn in vorm en gedaante gelijk aan die der eenvoudige huidmos; zij komen niet verstrooid te voorschijn, maar staan in naauwkeurig afgeperkte vlekken van verschillende grootte en onregelmatige kringvormige gedaante dicht bij elkander. Telkens rondom de randen uitbottende peukels vergrooten den omtrek der vlekken en geven aanleiding dat dezelve in een vlocijen. Naar mate de uitbotting naar den omtrek voortgaat, verdroogen de peukels in het midden der vlekken, schilferen af, en de eerst roode huid herneemt allengskens hare natuurlijke kleur. Bij het eenvoudigste verloop dezer mosfoort, blijven de vlekken tien à twaalf dagen onveranderd, en verdwijnen vervolgens met afschilfering. Zijn er in- of uitwendige prikkels aanwezig, dan grijpen er in dit beloop afwijkingen plaats. Door telkens terugkeerende uitbottingen ontstaan er nieuwe vlekken, meermalen talrijker en grooter dan de eerst verdroogde. De ziekte wordt hardnekkig, en kan maanden, zelfs jaren voortduren. Somwijlen hebben de met peukels bezette vlekken eene

flangs-

flangswijze gedaante, in dier voege, dat zij zich, handvormig van de borst om den arm slingerende, tot aan de punt van den pink uitbreiden, ongeveer den loop van de ellepijps-zenuw volgende. Ook op andere deelen kan dit plaats hebben: in het aangezicht heb ik dezen vorm, zeer duidelijk ontwikkeld, waargenomen; de flangswijze kronkelingen breidden zich van den hals over de wangen tot aan het voorhoofd uit. BIERT, die dezelve aan de armen waarnam, heeft haar den naam van *lichen gyratus* gegeven. Zeer zelden komt deze wijziging van de huidmos voor.

4. *Lichen agrius*. de vurige huidworm.

Deze is de belangrijkste vorm, waarin de huidmos voorkomt; zeer kennelijk door de hevigheid der toevallen van de andere wijzigingen onderscheiden. De uitbotting wordt voorafgegaan en vergezeld door koortsaanvallen, die wegblijven, zoo ras dezelve tot stand is gekomen. De vurige huidmos gaat steeds met huidontsteking gepaard, en treedt als eene op zich zelve bestaande ziekte oorspronkelijk te voorschijn, of ontwikkelt zich uit de voorafgegane andere soorten van de huidmos. De peukels zijn klein, zeer talrijk, hoogrood van kleur, puntig, verheven, en staan opgehoopt dicht bij elkander op eene ontstokene oppervlakte van tamelijke uitgebreidheid en onregelmatige gedaante; de ontsteking breidt zich verder uit dan de peukels, omgeeft de aangedane huiddeelen met eenen breeden hoog rood gekleurden rand,

rand, die naar den omtrek bleeker wordt, en zich allengskens in de natuurlijke kleur der huid verliest. Steeds gaat deze uitslag met de hevigste jeukte gepaard, die den lijder voortdurend tot krabben, schrobben en wrijven tegen harde lichamen noodzaakt, waardoor de peukels verscheurd worden, met een zeer lastig gevoel van spanning en branding in de lijdende deelen. De ontstekingtoevallen duren na de uitbotting voort, nemen vooral bij dag toe, terwijl de jeukte bij nacht het hevigst is. Na verloop van drie tot zes dagen komen er eene menigte blaasjes, met een geelachtig vocht gevuld, tusfchen de peukels e voorschijn, welke spoedig berften en zich met kleine, gele en bruine, weeke, loszittende, een weinig opgehevene roven, die spoedig afvallen, bedekken. Gewoonlijk is van dezen uitslag niet meer dan ééne plek aanwezig; zelden worden er gelijktijdig onderscheidene huiddeelen door aangedaan. Het aangezigt en de ledematen worden er menigvuldiger dan andere deelen door aangetast. De duur van dezen uitslag is van zijne geaardheid afhankelijk: in de eenvoudigste wijziging niet langer dan twaalf à vijftien dagen, — maanden en jaren, waar uit- of inwendige schadelijkheden aanwezig zijn; want zoo lang deze niet zijn opgeruimd, grijpen er telkens nieuwe uitbottingen plaats, de jeukte wordt hoe langer hoe ondragelijker, en fomwijlen grijpt de overgang in *impetigo* plaats. Met de opdrooging en afschilfering is de ziekte nog niet ten einde. De opperhuid blijft nog eenen geruimen tijd

ver-

verdikt, ruw, met kloven en scheuren; de gevoeligheid blijft verhoogd, en eene meelachtige afschilfering duurt nog langen tijd voort. Nederdrukkende gemoedsaandoeningen, het vatten van koude en fouten in den leef- en eetregel kunnen aanleiding geven, dat de uitslag plotseling verdwijnt, en door aandoeningen van het hoofd en de borst- en buksingewanden gevolgd wordt, welke aandoeningen echter gewoonlijk na verloop van weinige dagen bedaren, zonder dat de uitslag terug keert.

5. *Lichen urticans*. De netelzuchtaardige
Huidmos.

In deze gedaante grijpt de uitbotting plotseling met hevige jeukte en branding plaats; niet in den vorm van gewone peukels, maar in dien van bultvormige verhevenheden, niet ongelijk aan die, welke door brandnetels verwekt worden. Gewoonlijk treft de eerste uitbotting het aangezicht en den hals, later ook de andere deelen des ligchaams. Na verloop van één tot drie dagen neemt de ontsteking af, de bulten verdwijnen, en nu eerst komen de huidmospeukels duidelijk te voorschijn en blijven staan. Kinderen, zelfs pasgeborene, jonge lieden en zij, die eene week, gevoelige huid hebben, worden meermalen dan andere personen aangetast.

De netelzuchtaardige huidmos is van eene zeer veranderlijke geëardheid, zij verdwijnt zonder bekende oorzaken, keert na verloop van weinige uren

uren terug om weder te verdwijnen en dezelfde verschijnselen te herhalen. Op deze wijze wordt de uitslag hardnekkig, en duurt maanden lang voort, en verdwijnt door verdeeling en zemelachtige afschilfering. Gedurende het geheele beloop is de jeukte zeer hevig, met nachtelijke verheffingen, die aan den lijder de noodige rust ontrooven, en de geheele bewerktuiging in het plaatselijk lijden betrekken. Naar het mij toefschijnt, behoort deze uitslag, die menigwerf gelijktijdig bij onderscheidene voorwerpen gezien wordt, eer tot de wijzigingen der netelzucht dan tot de huidmos.

6 *Lichen lividus*. De loodkleurige huidmos.

De peukels hebben eene donkerroode, blaauwe of bruine kleur, zijn platter en weeker dan bij de andere huidmosfoorten, dezelve komt bijna alleen op de onderste ledematen voor, en verloopt zonder koorts; de peukels blijven lang staan, en na de afschilfering grijpen er nieuwe uitbottingen plaats, en maken de ziekte langdurig. De loodkleurige huidmos komt zelden voor; tusfchen de peukels ziet men petechiën en andere vlekken, welke het waarfchijnlijk maken, dat deze uitslag tot de fcheurbuikachtige, en niet tot de huidmosfoorten behoort.

7. *Lichen tropicus*. De huidmos der keerringen.

De hooge roodgekleurde peukels, welke dezen uitslag kenschetfen, botten zonder voorboden op die

die deelen uit, welke met kleedingstukken bedekt zijn, gepaard met hevige jeukte en stekingen, die des nachts zich verheffen. De peukels verdwijnen soms plotfeling zonder bekende oorzaken, maar keeren spoedig terug, om na verloop van eenigen tijd met afschilfering der opperhuid te verdroogen. Door hitte wordt deze uitflag vermeerderd en zeer lastig. In de keerkringsgewesten houdt men denzelfden voor heilzaam en als een bewijs eener goede gezondheid. Buitenfsporigheden in den leefregel en aanwezige vochtverbasteringen geven tot den overgang in belangrijke huidziekten aanleiding. Door het vatten van koude, te onpas gebruikte zeebaden en andere schadelijkheden kan de uitflag terug treden en gevaarlijke toevallen veroorzaken.

Deze huidmos komt alleen in de heete gewesten der aarde voor. Personen, die in dezelve uit koudere landstreken aankomen, worden er gewoonlijk door aangetast, en niet vroeger volkomen van dezelve hersteld, dan nadat zij aan het klimaat gewend zijn. Maar de inboorlingen blijven er niet van verſchoond. Eene teedere, weeke huid met rood of blond haar is voor de ontwikkeling bijzonder gunstig.

Deze zijn niet altijd zoo duidelijk en kenschetfend als door vele ſchrijvers gezegd wordt, en het valt menigwerf zeer moeilijk, de huidmos van andere huidziekten te onderkennen, Onderschei-
dings-ken-
teekenen.

De eenvoudige huidmos kan met *eczema*, *scabies* en *prurigo* verwisfeld worden. De onderscheidingsteekenen berusten voornamelijk op de ei-

eigene gedaante des uitflags. De harde peukels der huidmos komen meerendeels aan de buitenzijde der ledematen te voorschijn, en gaan met jeukte gepaard. Bij *eczema* bestaat de uitslag in blaasjes. De *scabies* is besmettend, heeft puntige blaasjes met eene harde grondvlakte, voornamelijk gezeteld in de buigingen der gewrichten en tusschen de vingers; de opengekrabde blaasjes geven eenig scherp vocht van zich; de jeukte is wel zeer hevig, maar minder onaangenaam. De peukels der *prurigo* komen, even als die der huidmos op de uitstrekzijde der ledematen voor, maar zijn klein, plat, aan de punt met een fijn, schilferachtig roofje bedekt, met eene kleine, zwarte stip in het midden, ontstaan door opdrooging van een weinig bloed, dat zich uit de opengekrabde peukels ontlast heeft.

De *lichen circumscriptus* kan met de *herpes circinatus* verwisfeld worden; maar bij de *herpes* bestaat de uitslag in blaasjes, bij de *lichen* in peukels. De blaasjes, staan alle op de randen en den omtrek der ontstokene vlekken en laten het middelpunt vrij; terwijl bij *lichen* de vlekken geheel met peukels bezet zijn. Eerst wanneer de opdrooging tot eenen zekeren trap gekomen is, verdwijnen de peukels in het middelpunt der vlekken, en nieuwe uitbottingen aan de randen vergrooten haren omtrek.

De *lichen urticans* kan met *erythema papulatum* verwisfeld worden; maar beide onderscheiden zich van elkander door de algemeene roodheid der huid met geringere jeukte, door de onveranderlijkheid des uitflags van zijn begin tot dat dezelve zonder af-

afschilfering verdwijnt, bij *erythema*; -- door de hevigheid der jeukte, door het verdwijnen en telkens wederkeeren des uitslags, het slepend be-loop en de opdrooging door afschilfering, bij de *lichen urticans*.

De *lichen agrius* kan in zijne verschillende tijdperken tot verwisfelingen met *eczema acutum*, *eczema chronicum*, *impetigo* en *psoriasis* aanleiding geven. De zamenvloeiende, zwerende peukels van de *lichen agrius* hebben eenige overeenkomst met de blaasjes van de *eczema acutum*; maar de gelijkmatig over de geheele oppervlakte van de aangedane vlekken verbreide uitflag, zamengesteld uit ontaarde peukels, terwijl steeds volkomen gevormde peukels daar tusfchen, zoowel als op den omtrek der vlekken gevonden worden, beveiligen wel niet altijd tegen eene oogenblikkelijke, maar wel tegen eene duurzame misvatting.

Van *impetigo* onderscheidt zich de *lichen agrius* door de puisten, die veel vocht ontlasten, en door de korstachtige van geel tot bruin gekleurde roven, welke der eerste eigen zijn, terwijl de peukels de laatste kenschetsen.

Het moeilijkst is het, de *lichen agrius* van *eczema chronicum* te onderscheiden. De peukelvormige uitflag en de ruwe verdikte schroffelige huid, die na de *lichen* terug blijft; de blaasjes en de roofachtige dunne schilfers van *eczema* zijn de eenige, niet altijd duidelijk ontwikkelde onderscheidingsteekenen. Wanneer beide ziekten gelijktijdig aanwezig zijn, en dit vindt niet zelden plaats,

wordt het nog moeilijker, verwarringen te ontgaan.

Bij de *psoriasis* zijn de afschilferingen veel sterker, de schilfers zijn grooter, wit en glinsterend; na het afvallen der schilfers, blijft de huid nog eenigen tijd rood en als bepoederd.

Oorzaken. Het bloedrijke, opgewekte temperament; een teeder en fijn bewerktuigd weeffel der huid; verhoogde gevoeligheid en prikkelbaarheid, en het vrouwelijk geslacht kunnen als voorbeschikkende oorzaken beschouwd worden. Het verdient intusschen opmerking, dat de kinderlijke leeftijd verschoond blijft. Uitwendige warmte en hitte, het voorjaar en de zomer, kunstmatig bereide en natuurlijke zwavelbaden begunstigen het ontstaan der huidmos en geven tot instortingen aanleiding. Gastrische aandoeningen, slepende maaggebreken en verouderde hoofdpijnen gaan menigwerf aan de uitbotting der huidmos vooraf, verdwijnen als deze plaats heeft, en keeren terug, wanneer de uitslag verdwijnt. Ook na voorafgegane koortsen van de zinkingachtige en rheumatische geëardheden, vindt deze uitslag, als huidcrisis, plaats.

Fouten in den eet- en leefregel; misbruik van sterken drank; gemoedsaandoeningen; eenige beroepen en ambachten, waarbij de werklieden groote hitte verduren moeten: glasblazers, metaalsmelters, smeden, koks, enz.; slepende gebreken der pisafscheidende werktuigen; het langdurig gebruik van terpentijn en balsemachtige geneesmiddelen volgens JON. GREEN, behooren tot de gewone gelegenheid ge-

gevende oorzaken. Naar mijne overtuiging is het aan de laatstgenoemde middelen toe te schrijven, dat de huidmos zoo dikwijls bij lieden voorkomt, die meermalen aan *gonorrhoea* geleden hebben.

De *lichen agrius* heeft men na langdurige inspanning, verbonden met nachtbraken en nederdrukkende gemoedsaandoeningen, waargenomen. BATEMAN heeft de *lichen circumscriptus* op de vaccinatie zien volgen. De *lichen urticans* ontspringt meerendeels uit gastrische oorzaken en bij scrophuleuze lijdens; terwijl de *lichen lividus*, eene scorbutische geaardheid hebbende, door al die oorzaken kan ontstaan, welke de scorbutische ontmenging der vochten verwekken.

Deze is in zoo verre gunstig, als de huidmos ^{voorzegging.} het leven noch regtstreeks, noch middellijk door ontwikkeling van andere ziekten, in gevaar brengt; maar zij is eene lastige, langdurige en tot instortingen zeer genegene ziekte. Het gunstigst is de voorzegging bij de eenvoudige huidmos: deze gaat met geene belangrijke toevallen gepaard, geneest meerendeels spoedig en is het minst aan instortingen onderhevig. Echter kan dezelve ook door fouten in de verpleging en behandeling langdurig worden en alle pogingen tot genezing verijdelen. De haar- en loodkleurige huidmos zijn hardnekkiger dan de eenvoudige, eerst geneesbaar, wanneer de algemeene, in de bewerktuiging bestaande oorzaken uit den weg zijn geruimd. Hoogst lastig en kwellend zijn de vurige en de netelzuchtaardige huidmos, altijd langdurig, menigwerf ongeneesbaar;

door aan de lijders de noodige rust te ontnemen, worden de krachten uitgeput en alle verrigtingen geraken in eenen kwijnenden toestand.

Behandeling. Gelijk in zoo vele andere huidziekten laat de geneeskundige behandeling nog veel te wenschen overig. Zoodra ons de voorschriften der algemeene ziektekunde verlaten, is dezelve meer empirisch dan rationeel.

Waar de huidmos nog niet verouderd is, de huid en het vaatstelsel in eenen opgewekten ontstekingsaardigen toestand verkeeren, trachte men de oorzaken op te sporen en uit den weg te ruimen, zorg dragende, dat de verhoogde terugwerking getemperd en alle zoo uit- als inwendige prikkels vermeden worden. De leefregel blijve tot ligt verteerbare voedsels en verkoelende dranken beperkt, rust naar ziel en ligchaam zij aanbevolen; waar het noodig is, ontledige men het darmkanaal door verkoelende lakferende middelzouten, calomel of de *ricinusolie*. Uitwendig prikkelende middelen zijn schadelijk, zoo lang de huid in eenen opgewekten ontstekingsstoestand verkeert. Wasfchingen, stovingen en baden, met verzachtende afkooksels van den althea-wortel, maluwbladen of melk van bittere amandelen, en de eenvoudige niet te warme, maar laauwe water- en dampbaden zijn aangewezen. Bij jonge, gezonde en volbloedige lieden; kan de algemeene en plaatselijke ontstekingsstoestand bloedontlastingen, zoowel door eene ader te openen, als door bloedzuigers vorderen. Neemt de huidmos eene slepende geëardheid aan, dan is het raadzaam de

de buiksontlastingen door ruime giften *flores sulphuris*, verbonden met *magnesia*, *cremor tartari* en *antimonium crudum* te onderhouden, en uitwendig waschelingen of baden met oplosfingen van koolzure loogzouten in afkookfels van zemelen te bezigen. Waar deze verdragen worden, zonder genezing tot stand te brengen, raadt GREEN de zwavelbaden en zwavelberookingen aan; — zelfs bij ontvelling en vochtigheid der lijdende deelen, en bij de *lichen agrius*, wil hij eene gunstige uitwerking hebben waargenomen. P. RAYER en anderen daarentegen verwerpen dezelve geheel en al als schadelijk. In zeer hardnekkige gevallen, verbonden met scrobutische verschijnselen, zijn de plantenzuren, maar vooral de delfstofzuren, in ruime giften, gedurende eenigen tijd volgehouden, heilzaam. De scrophuleuze complicatie vordert de *antimonialia* en *mercurialia* of het *antimonium alcoholisatum* van vijf tot zes greinen, drie of viermaal daags. Wanneer, door langdurigheid der huidmos of door bijgekome ne ziekten, de krachten getreden hebben en de verrigtingen kwijnen, bewijzen de afkookfels der kina met sassaaparilla, de minerale zuren, de ijzerbereidingen en andere versterkende geneesmiddelen goede diensten. Gedurende de geheele behandeling zorg men voor toereikende buiksontlastingen, voor eene goede verpleging en eenen zacht voedenden leefregel.

BIËTT, GREEN en RAYER raden ten laatste tot het inwendig gebruik der *arsenik*-bereidingen. Verreboven deze verdient de *graphit*, verbonden met

bittere middelen , de voorkeur. Wanneer men met de genoemde middelen niet vordert , beproeve men de prikkelende uitwendige , om de werkdadigheid der huid op te wekken. Het *unguentum hydrargyri nitricum* , of één der volgende voorschriften :

R. *Subcarbonat. plumbi* dr. i
calcis praeparatae dr. ii
cerati simplicis unc i
 m.

R. *Jodii* gr. xv
axung. porci unc i
 m.

R. *Protojodur. hydrargyri* scr. i
S. Deuto-jodureti hydrarg. gr. x—xv
axung. porci. unc i
 m.

Des morgens laat men de deelen , die met uitflag bezet zijn , met een zwak sop van witte zeep afwasfchen en vervolgens met de gekozene zalf langdurig inwrijven ; des avonds worden deze inwrijvingen herhaald.

Tegen *lichen agrius* hebben BIËTT en RAYER van de zalf , op volgende wijze zamengesteld , met vrucht gebruik gemaakt :

R. *Calomet.* dr. ß
camphor. gr. xii
axung. porci. unc i
 op de lijdende deelen in te wrijven.

c. *Prurigo*, *pruritus*, *scabies papuli-formis*,
psydracia Frankii, *psoride papuleuse Ali-*
berti. Peukelachtige huidjeukte.

Volkomen of onvolkomen ontwikkelde peukels, Bepaling
gepaard met hevige jeukte, waarbij de huid hare
natuurlijke kleur behoudt, meerendeels van een fle-
pend, zelden van een haastig beloop; in beide de
laatste gevallen kan de uitslag over de geheele op-
pervlakte des ligchaams verbreid zijn of tot enkele
deelen bepaald blijven.

Bij de geneeskundige schrijvers van vroegeren tijd Benaming
heerscht er, ten opzichte van dezen ziektevorm,
groote onzekerheid, aangezien zij denzelven, onder
den naam van *pruritus*, meer als eene toevalligheid
van andere ziekten beschreven, dan als eene bij-
zondere ziekte beschouwd hebben. R. WILLAN
heeft haar, wegens de afwezigheid van andere uit-
bottingen en de meerendeels aanwezige peukels,
het eerst als eenen bijzonderen ziektevorm, onder de
benaming van *prurigo* (uit hoofde van de hevige
jeukte) beschreven, en tevens de verschillende wij-
zigingen, waarin dezelve voorkomt, aangewezen
en vastgesteld.

De geheele oppervlakte des ligchaams kan gelijk- Zetel
tijdig de zetel der huidjeukte zijn; echter vindt dit
alleen in de zwaarste gevallen plaats: gewoonlijk zijn
de hals, de schouders en de rug die deelen, welke
het eerst en alleen worden aangetast, en het is
van dáár, dat de uitslag zich over de ledematen
en de andere ligchaamsdeelen verbreidt. Somwijlen

blijft dezelve, gedurende haar geheel beloop, tot de eerst aangedane deelen bepaald, zonder zich verder uit te breiden. Men onderscheidt derhalve twee foorten, namelijk, de algemeene peukelachtige huidjeukte (*prurigo universalis*) en de plaatselijke (*prurigo localis*).

1. Algemeene huidjeukte.

Van deze heeft WILLAN drie wijzigingen vastgesteld, welke ook de latere schrijvers over de huidziekten hebben aangenomen.

a.) De zachte peukelachtige huidjeukte.

Prurigo mitis.

Kleine, weeke, menigwerf onduidelijk ontwikkelde peukels, grooter, maar minder gepunt dan die der huidmos, met weinig of geene kleurverandering der huid, gepaard met hevige jeukte gedurende haar geheel beloop; de peukels hebben op de punt een dun, zwart roofje, dat door het verdroogen van een klein druppeltje bloed, hetwelk zich uit de opengekrabde peukels ontlast heeft, ontstaat. De jeukte wordt door inwerkingen, welke de werkdadigheid der huid opwekken, door active bewegingen, natuurlijke en kunst-hitte, door de warmte in het bed, door scherpe en prikkelende spijzen en geestrijke vochten opgewekt en onderhouden. De borst, de schouders, de rug, de lendenen, de buitenzijde der armen en der dijen zijn de deelen, die deze uitslag bij voorkeur verkrijst, zonder echter de andere deelen geheel te

schoonen. De uitbotting heeft niet gelijktijdig en algemeen, maar achtereenvolgend, nu hier, dan daar, en bij herhaling plaats. Weken en maanden blijft deze uitslag eene folterende kwelling der lijdens, alvorens door afschilfering te verdwijnen.

b.) De kriebelende peukelachtige huidjeukte.

Prurigo formicans.

In deze niet wezenlijk, maar alleen door grootere hevigheid, van de vorige ondescheidene wijziging van *prurigo*, zijn de peukels breeder, minder verheven, bleeker dan de natuurlijke kleur der huid, minder opgehoopt, meer verstrooid en gelijktijdig over de geheele oppervlakte des ligchaams verbreid, alleen het aangezicht, de handpalmen en de voetzolen uitgezonderd. De jeukte, die aan het ondragelijke grenst, gaat met een bijtend en flekend gevoel gepaard, als of de huid met gloeiende nagels doorboord of door tallooze mieren geprikkeld wordt, van waar zij dan ook den naam van *formicans* ontvangen heeft. De jeukte is menigwerf zoo hevig, dat de lijdens zich, als razenden, de huid met de nagels verscheuren, en aan de daardoor veroorzaakte pijn de voorkeur geven boven de jeukte. De verscheurde en opengekrabde peukels worden spoedig met kleine, zwarte, schilferachtige roojsjes bedekt. De duur dezer huidjeukte is onbepaald, gewoonlijk langdurig, zelden minder dan vier maanden.

c.) De peukelachtige huidjeukte der oude lieden.

Prurigo senilis.

Deze heilsche kwaal der oude lieden gaat met algemeene aandoeningen der bewerktuiging gepaard, hetzij dat dezelve de oorzaak der ziekte zijn, of eerst door deze veroorzaakt worden, ten gevolge der jeukte en pijnen, die aan de lijders, gewoonlijk oude, zwakke lieden, de noodige rust ontnemen en hen vermoeijen. De peukels staan meer opgehoopt dan bij de andere *prurigo*-soorten, zijn iets grooter en meer verheven; somwijlen echter zoo klein, dat zij beter gevoeld dan gezien worden. De jeukte is nog heviger dan bij de andere *prurigo*-soorten, aanhoudend zonder tusschenpoozingen. De huid is dor, heeft hare natuurlijke kleur verloren, is donkerder, en ruw door zemelachtige afschilfering. De telkens zich herhalende uitbottingen en de lange duur der ziekte veranderen de bewerktuiging der huid: zij wordt dik en hard en krijgt talrijke scheuren en kloven; het celweeffel is met vochten overladen; in het aangezicht, aan de handen en voeten ontstaan zuchtige zwellingen. Dikwijls gaat de huidjeukte der oude lieden met tallooze infekten gepaard. WILLAN heeft er eene afbeelding van gegeven, en wil, dat zij tot het geslacht der vloojen behooren; anderen beweren, dat zij tot dat der luizen moeten gebragt worden, maar houden dezelve voor eene bijzondere soort, kleiner dan de gewone, steeds bij dezelfde personen blijvend, zonder tot andere over te gaan. Het getal dezer infekten is zeer groot en derzelver

voort-

voortteling onbegrijpelijk snel. Gebrek aan reinheid, slechte verpleging, zorgelooze en onachtzame behandeling der oude lieden, die zich zelve niet genoeg kunnen helpen, en de hardnekkigheid, waarmede velen de verwisfeling van kleeding en beddegoed weigeren, zijn naar mijne op ervaring gegronde overtuiging, verworven in gefichten, waar vele oude lieden verpleegd werden, de oorzaak der aanwezige infekten, die in niets van de gewone menschenluis verschillen. Er heeft geene *generatio aequivoca* plaats; de geneesheeren, welke deze aannemen, dwalen niet minder dan de volkshoop, die daarin eene bijzondere straf van God wil zien.

Het is niet zeldzaam, dat de *prurigo universalis* met eenen algemeen ziekelijken toestand der bewerktuiging verbonden is, kenbaar uit het cachectisch aanzien der lijdens, vergezeld met hoofdpijn, lusteloosheid, zwakte, gestoorde verrigtingen der spijsverteringswerktuigen, verstopte en onregelmatige buiksonstlasting, verminderde huiduitwaseming en urinafscheiding. Gelijktijdig klagen de lijdens over koude bij eene meer dan gematigde temperatuur, en verkeeren in eenen eigenaardigen gemoedstoestand: zij zijn knorrig, ontevreden, klagen over al hunne betrekkingen, en doen aan elk hunne kwade luimen ondervinden.

Somwijlen is de *prurigo universalis* met andere ziekten gecompliceerd, zoo als met *erythema*, *eczema*, *scabies*, *ecthyma* enz.: het veelvuldigst is zij het met ontsteking van het celweefsel en bloedzweren.

2. De plaatselijke peukelachtige huidjeukte.

Prurigo localis.

De verschijnselen en toevallen der plaatselijke peukelachtige huidjeukte zijn dezelfde als die der algemeene, alleen met dat onderscheid, dat de zereel tot een enkel deel beperkt blijft, en dat de peukels gewoonlijk nog minder duidelijk ontwikkeld zijn, dan die der huidjeukte van oude lieden.

a. De huidjeukte van den aars. *Prurigo podicis.*

De jeukte is niet minder hevig, dan bij de algemeene *prurigo*, en kriebelend als bij de *formicans*. De omtrek van den aars, de vore tusschen de billen, het achterste gedeelte der bilnaad en het onderste gedeelte van den endeldarm zijn de deelen, over welke de *prurigo podicis* zich uitbreidt. De meerendeels onvolkomen ontwikkelde peukels staan op eene roode, ontstokene grondvlakte; de huid wordt spoedig vochtig; er grijpen ontvellingen plaats, en niet zelden komen er blaasjes en puisten te voorschijn; zoodat dit gebrek in den beginne naar *erythema*, vervolgens naar *intertrigo*, later naar *eczema* en eindelijk naar *impetigo* gelijkt, en zijne oorspronkelijke geaardheid schijnt verloren te hebben. In deze wijziging is de *prurigo* steeds zeer langdurig, en wederstaat niet zelden alle pogingen der geneeskunst.

b. De

b. De peukelachtige huidjeukte der teeldeelen.

Prurigo genitalium.

Deze ziekte tast de teeldeelen van beide geslachten op eene zeer lastige en onaangename wijze aan, en komt niet zelden voor. De peukels zijn grootendeels zeer onvolkomen gevormd, vaak in het geheel niet te ontdekken. Ware het niet, dat de eigenaardige jeukte der *prurigo*, terwijl geen andere uitslag aanwezig is, tot aanwijzing verstrekte, men zoude genoopt worden de geëardheid der ziekte in twijfel te trekken en naar eene andere te zoeken. Naar aanleiding van de onderscheidene deelen, welke bij mannen en vrouwen aangetast worden, verschillen de benamingen dezer ziekte.

a. De huidjeukte van den balzak. *Prurigo scroti.*

Deze komt dikwijls voor, blijft niet alleen tot den balzak beperkt, maar breidt zich over de bilnaad uit. Menigwerf gaat zij nog verder en tast de voorhuid (*prurigo praeputialis*), den eikel (*prurigo glandis*), de opening en het voorste gedeelte der pisbuis (*prurigo urethrae*) aan.

Het eerste verschijnsel dezer ziekte is eene matige jeukte, zonder ontsteking en peukels. Vervolgens begint de balzak sterk te rimpelen, krijgt eene donkere, bruinachtige kleur en schilfert; onder de schilfers en waar dezelve afvallen; wordt eene vetachtige zelfstandigheid afgescheiden, die de huid smerig maakt. Met de steeds toenemende jeukte ont-

ontstaan ontvellingen en *impetigo*-puisten. Het aanhoudend krabben en wrijven, waartoe de lijders door het ondragelijke der jeukte gedwongen worden, wekt de teeldrift op, vooral wanneer de voorhuid, den eikel en de pisbuis aangedaan zijn, en geeft tot zelfbesmetting, tot buitensporige bevredigingen en zelfs tot *satyriasis* aanleiding. De jeukte duurt niet onafgebroken met gelijke hevigheid voort, maar neemt bijna regelmatig toe en af. Bij dag zijn de aanvallen doorgaans heviger dan bij nacht. Het is eene langdurige, moeilijk te genezene ziekte.

b. De huidjeukte der vrouwelijke teeldeelen.

Prurigo pudendi.

Deze is voor vrouwen waarschijnlijk nog lastiger dan de *prurigo scroti*, enz. voor mannen. De groote en kleine lippen, de ingang der schede en somwijlen hare geheele oppervlakte, de bilnaad en de venusheuvel zijn de zetels der ondragelijkste jeukte, verbonden met ontsteking, ontvelling, pijn en andere kwellende toevallen. De peukels zijn somwijlen volkomen, meermalen onvolkomen, gevormd, en even moeilijk te onderkennen, als die bij de *prurigo* der mannelijke teeldeelen. Over het algemeen schijnen de toevallen bij de vrouwen zwaarder dan bij de mannen te zijn; want zonder terughouding of schaamte wrijven zij onophoudelijk de lijdende deelen met de handen. Zelfbesmetting, zucht tot teugellooze bevrediging der opgewekte teeldrift en *nymphomania*
grij-

grijpen dien ten gevolge plaats. Het gezelschappelijk verkeer met , ja zelfs het enkel zien van mannen wekt onwederstaanbare driften bij haar op. BERTT deelt het geval mede eener vrouw , door deze ziekte aangetast , welke flauw viel , zoo dikwijls zij jongelingen zag.

De *prurigo* is in het algemeen niet moeilijk van ^{Onderschei-} andere huidziekten te onderscheiden , wanneer men ^{dings-kentee-} kenent.
 met naauwkeurigheid op de gedaante des uitlags acht geeft. De gevallen , waarin de peukels onvolkomen ontwikkeld zijn , en tusfchen deze gelijktijdig blaasjes en puistjes te voorschijn komen , kunnen tot misvatting aanleiding geven : dit is niet anders te verhoeden , dan door het geheele beloop der ziekte gade te slaan en in overweging te nemen. De bijzondere ziekten , waarmede de *prurigo* het ligtst zou kunnen verwisfeld worden , zijn de huidmos en de fchurft. Van de eerste onderscheidt zich dezelve door de gedaante der peukels , die bij de *lichen* minder algemeen verbreid , meer puntig , rooder van kleur en harder zijn , dan bij de *prurigo* , en bij deze met dunne roofjes , die in het midden eene kleine zwarte stip hebben , bedekt zijn ; — ook is de jeukte veel heviger dan bij de huidmos. De ligtrood gekleurde puntige blaasjes der fchurft ; derzelver zetel in de buiging der gewrichten en tusfchen de vingers ; de dunne roofjes , waarmede de blaasjes opdroogen ; de minder onaangename jeukte , en de befmettende geëardheid geven teekenen genoeg aan de hand , om beide ziekten van elkander te onderscheiden.

Aan-

Oorzaken. Aangaande de oorzaken der *prurigo* heerscht nog groote duisternis en onzekerheid. Zonder onderscheid komt dezelve in alle standen, in alle leeftijden, bij beide geslachten, bij iedere leefwijze en bij alle beroepen voor. Bij voorkeur echter worden jonge en oude lieden — zeldzamer zij, welke zich in den krachtvollen middelbaren leeftijd bevinden — er door aangetast. Waarin het eigendommelijke dezer voorgeschiktheid gelegen is, blijft onzeker. Morfigheid in het algemeen; verwaarloosde reiniging der huid en der kleedingstukken; armoede; beroepen, welke arbeidslieden voortdurend met prikkelende zelfstandigheden in aanraking brengen; koude, vochtige woningen; aanhoudende inademing van eenen bedorven dampkring; het voor- en najaar oefenen een' meer of minder kennelijken invloed uit op de ontwikkeling der *prurigo*, vooral bij lieden, die onregelmatig leven, vele gezouten, gerookte en andere zware, moeilijk te verteren spijzen, of geestrijke zure dranken en sterk aangezette bieren onmatig gebruiken. Menigwerf gaat de *prurigo* uit dien hoofde met bedorvene spijsvertering gepaard. Niettegenstaande al de opgenoemde oorzaken veelvuldig bestaan, blijft echter de *prurigo* (die der oude lieden uitgezonderd) eene zeldzame ziekte; meerendeels voorafgegaan door langdurige tuschenpoozende koortsen, of door aanhoudende koortsen van rot- en zenuwachtigen aard; door geelzucht, jicht en rheumatismus.

De plaatselijke *prurigo* van den *anus* gaat in ge-
vor-

vorderde leeftijden met bloedophooping in het poortader-stelsel en met aanbeijen gepaard. Bij kinderen is zij meerendeels een gevolg van mijten in het onderste gedeelte des endeldarms. De huidjeukte der teeldeelen ontspringt bij mannen veelal uit dezelfde oorzaken; bij vrouwen uit stoornissen van den stondenvloed, vooral in het tijdperk, dat dezelve voor het eerst plaats vinden, alsmede in dat, waarin dezelve ophouden. In andere gevallen zijn er venerische, scrophuleuze en andere specifieke vochtverbasteringen aanwezig. In die gevallen, waarin druipers, de witte vloed en andere scherpe ontlastingen uit de teeldeelen plaats hebben; waar gebreken der pisblaas, steen, graveel, vernauwing der pisbuis, onwillekeurige afvloeijing der pis en andere prikkels aanwezig zijn, is de huidjeukte een toeval van eene andere, en geene op zich zelve bestaande ziekte.

Alhoewel de *prurigo* het leven niet onmiddellijk met gevaar bedreigt, zoo is de voorzeggings-
 niet zeer gunstig. Zelden, en alleen bij jonge
 lieden volgt de *prurigo* een meer haastig beloop,
 en wordt binnen vier tot zes weken genezen. De
 kriebelende, peukelachtige huidjeukte (*prurigo for-*
micans) is altijd langdurig en kan maanden en jaren
 blijven, of schijnbaar genezen, om telkens in
 het voor- en najaar terug te keeren. De *prurigo*
 der oude lieden is doorgaans de hardnekkigste,
 veelal ongeneesbaar, tot aan het einde des
 levens voortdurende. Andere bijkomende huidaan-
 doeningen, blaasjes, puisten, bloedzweren of ver-

harding en verdikking der huid geven steeds de grootste hardnekkigheid te kennen. Het aanhoudend krabben, waartoe de hevigheid der jeukte noodzaakt, ontnemt den lijders de noodige rust, belemmert de voeding, put de krachten uit en geeft tot verzwakking en uittering aanleiding. De duur der plaatselijke huidjeukte is geheel en al afhankelijk van de opruiming der oorzaken; maar in alle gevallen blijft de *prurigo* eene moeilijke ziekte. Ik houde het daarvoor, dat wij nog geenszins tot het standpunt genaderd zijn om met volle overtuiging het gezegde van JON. GREEN te herhalen: „Ik kan intuschen zeggen, het zoo verre gebragt te hebben, dat ik de *prurigo* in alle gevallen voor eene zeer ligt geneesbare ziekte kan beschouwen.” Wanneer de uitslag spoedig van de huid verdwijnt, geeft dit tot gevaarlijke toevallen en zenuwaandoeningen met ijshoofdigheid aanleiding. Dat men bij de voorzegging hierop verdacht moet zijn, behoeft geen betoog.

Behandeling. In de eerste plaats trachte men de oorzaken, welke de ziekte hebben voortgebragt en nog onderhouden, op eene doelmatige wijze uit den weg te ruimen; handele verder volgens de voorschriften der algemeene ziektekunde, om ten laatste, wanneer men op den redenerenden weg zijn doel niet bereikt, tot de empirische geneeswijze over te gaan.

Behandeling der oorzaken. Zelden zijn de oorzaken der *prurigo* zoo ontwijfelbaar zeker en duidelijk, dat de Geneesheer het in zijne magt heeft, dezelve op te ruimen en daar-

daardoor alleen de ziekte te genezen. Er komen, wel is waar, gevallen voor, waarin schadelijke invloeden aanwezig zijn, die noodwendig uit den weg moeten geruimd worden, minder om de genezing daardoor tot stand te brengen, dan wel om den weg te banen voor het gebruik van andere hulpmiddelen, welke eerst na eene voorbereidende behandeling der oorzaken in staat zijn, hunnen heilzamen invloed uit te oefenen.

Traagheid des bloedsomloops in het stelsel der poortader en daarvan afhankelijke bloedaderlijke volbloedigheid des onderbuiks, gestoorde verrigtingen der afscheidende werktuigen en aanbeijen herstellen door het gebruik der oplosfende extracten en zachtwerkende lakferendemiddenzouten; achterwege blijvende aanbeijen bij daaraan gewende personen trachte men in gang te helpen door zwavelbereidingen; bij grootere traagheid in de verrigtingen der buksingewanden en verstopte buksontlasting door aloës-houdende middelen. Op dezelfde wijze handele men bij vrouwen, welker maandstonden achterwege blijven, onregelmatig of ontoereikend vloeijen, met bijvoeging van de *hb. sabinae* bij groote werkeloosheid des vaatstelsels. Ook andere gewone of buitengewone afscheidingen en ontlastingen, tot instandhouding der gezondheid noodig, moeten hersteld of door kunstzweren vervangen worden. Gelijktijdig en gedurende den geheelen duur der ziekte, drage men zorg voor eenen doelmatigen leefregel. Door waschingen en baden van warm water dikwijls te herhalen, moet het ligchaam der

lijders van alle daarop klevende onreinheden gezuiverd, de huiduitwaseming hersteld en onderhouden worden. Ook de reinheid van kledingsstukken en beddegoed is streng in acht te nemen; waar het wezen kan, verwisfele men een en ander om de drie of vier dagen. De voeding der lijders mag niet overtollig zijn, en dient tot zachte, ligtverteerbare spijsen, meer uit het planten- dan uit het dierenrijk genomen, beperkt te blijven. Alle gezouten, ingelegde en gerookte spijsen, geestrijke dranken, wijnen (vooral de zoete witte, en de wrange, zure, uit onrijpe druiven of ander ooft geperste) en zware aangezette bieren zijn schadelijk. Groote krachtingspanningen, die het ligchaam sterk verhitten, arbeid bij al te groote warmte en al te warme baden, zoowel natuurlijke als gewone en kunstmatig bereide, zijn schadelijk, wegens de al te groote terugwerking van het stelsel der huidvaten.

De plaatselijke huidjeukte van den aars en van de teeldeelen vordert, dat die deelen koel gehouden vooral niet gebroeid worden: vederbedden en stoelkussens mogen de lijders niet gebruiken; de goede slape op haren matrassen, de behoeftige op zakken met stroo, kaf of dop gevuld. In den endeldarm of in de scheede aanwezige *ascarides* kunnen spoedig en op eene bijna onfeilbare wijze door lavementen uit versche osfengal, warm ingespoten, uit den weg geruimd worden. Voor hen, die aan de huidjeukte der teeldeelen lijden, is het eene heilzame voorzorg, dat zij zich van alle lek-
tuur

tuur over en te vrijen omgang met het andere geslacht, waardoor de teeldrift kan opgewekt worden, onthouden.

Bij jonge, sterke volbloedige en in het algemeen bij zulke lijdens, bij welke de sthenische of phlogistische toestand der bewerktuiging de deprimerende geneeswijze vordert, zijn aderlatingen of bloedzuigers aangewezen. Men ga echter spaarzaam en met omzigtigheid te werk; want de geneeskundigen zijn vrij eenstemmig van gevoelen (zelfs JON. GREEN, die de bloedontlastingen tegen de huidziekten zoo ruimschoots aanprijst, niet uitgezonderd), dat de bloedontlastingen tegen *prurigo* veel minder goede diensten bewijzen, dan in de andere slepende huidziekten. Met verkoelende lakferende middenzouten en de koolzurige loogzouten onderhoude men de noodige buiksontlasting: de *nitras potassae* en de *carbonas potassae et sodae*, verbonden met zwavelbloemen, verdienen in vele gevallen de voorkeur, daar dezelve te gelijker tijd, de opgewekte terugwerking van het vaatstelsel matigen. De hevig werkende lakfeermiddelen zijn schadelijk, wegens den sterken aandrang van vochten naar den onderbuik, alsmede wegens de adellijke volbloedigheid, welke zij in de buiksingewanden verwekken, waardoor de huidwerkdadigheid te spoedig onderdrukt en aanleiding gegeven wordt, dat de uitslag terug treedt, om andere belangrijke ziekten en toevallen te veroorzaken. Wanneer de huid droog en perkamentaardig dor is, dan zijn de aftreksels der jonge spruiten van

Behandeling
volgens de
regels der
algemeene
ziektelunde.

den jeneverbesfenstruik, van den fasfaparillawortel, van het pok- en fasfafrashout dienstig om de onderdrukte uitwaseming te herstellen en te onderhouden, ondersteund door warme waterbaden. De verhittende zweetmiddelen zijn meerendeels schadelijk: zij vermeederen de jeukte, en geven tot nieuwe uitbottingen aanleiding. De scrophuleuze en venereische complicatiën vorderen kwik- en spiesglasbereidingen. Met gerustheid mag ik de volgende samenstelling aanbevelen:

R. *Sulphuret. Hydrargyri et stibii*, dr. ii.

Pulv. hb. Sabinac, unc. β.

Ext. dulc. amar. q. f. ut f.

Pilul. pond. gr. iiii.

Consp. pulv. liq.

S.

Viermaal daags vijf pillen.

Ook uitwendig is het dan raadzaam, de eene of andere kwikzalf aan te wenden. In de gewone, niet zamengestelde gevallen van *prurigo*, zijn de kwik- en spiesglasbereidingen niet alleen nutteloos, maar schadelijk.

Menigwerf is de scheurbuikige vochtverbastering de oorzaak der verouderde *prurigo*. Waar dit plaats heeft, geve men de minerale zuren, bij groote zwakte verbonden met *serpentaria*, *senega*, kina, bittere middelen, enz.; daarna de ijzerbereidingen. Wanneer de jeukte pijnlijk en zeer hevig is, aan de lijders de noodige rust ontnemt en geene verademing gunt, dan geve men het heulfap in tamelijke giften, twee- of driemaal daags.

Bij het begin, en in ligte gevallen van de huid-^{Empirische geneeswijze.} jeukte der oude lieden, doen de zwavelbloemen met wijnsteen, magnesia en antimonium voortreffelijke diensten. In verouderde hardnekkige gevallen bedien ik mij met goed gevolg van de kina in afkookfel met minerale zuren. ELLIOT raadt het gebruik aan van *vinum seminis colchici autumnalis*, eene halve drachma driemaal daags. AUTENRIETH geeft een afkookfel van den saspaparilla-wortel met *oxymel squilliticum* en *cremor tartari*; THILESIIUS de baden van *Ems*, de ijzerhoudende minerale wateren, witten wijn en eenen voedzamen leefregel; RUAN den balsam *copaiva* tegen *prurigo vulvae*; MARREN het afkookfel van de *cortex adstringens* tot in- en uitwendig gebruik in het tijdperk, waarin bij vrouwen de maandstonden ophouden. Tegen de *prurigo vulvae* bij kinderen, met witten vloed verbonden, ken ik geen middel, dat zoo spoedig en zeker werkt, dan een aftrekfel van het zaad der gele peen (*daucus carota*) met melk gedronken.

Bijna talloos zijn de uitwendige middelen tegen ^{Uitwendige behandeling.} *prurigo* in gebruik. Als algemeene regelen bij de keuze uit die groote menigte, kan men aannemen, dat de zamentrekkende, sterkprikkelende middelen, even als de zoogenaamde weekmakende en verzachtende, meer schaden dan baten; alleen in bijzondere gevallen kunnen dezelve van toepassing zijn. Bij verhoogde prikkelbaarheid en gevoeligheid der huid, waar blaasjes en puisten tuschen de peukels uitbotten, waar ontvellingen aanwezig

zijn, of bloedzweren voorkomen, lenigen verzachtende en bedarende omslagen en wasfchingen de toevallen. Wanneer de *prurigo* door inwendige oorzaken onderhouden wordt, of het gevolg is van onderdrukte ontlastingen, hetzij natuurlijke of tot gewoonte geworden, of waar zij als crisis van andere ziekten voorkomt, moet men zich onthouden van opdroogende middelen, die de opgewekte huidwerkdadigheid snel onderdrukken, tot zoo lang de inwendige oorzaken zijn opgeruimd, om geene aanleiding te geven tot plaatsvervangende ziekten der ingewanden, welke het leven der lijdens in gevaar brengen.

Waar men vrijheid heeft, onbeperkt uitwendige middelen toe te dienen, zijn de zwavel-, loog- en zeebaden, en de berooken met zwavel en vermiljoen als zoodanig zeer vermogend, mits dezelve steeds geëvenredigd blijven aan den trap van prikkeling en terugwerking der huid. De kwikbereidingen, voornamelijk wasfchingen met eene oplossing van de sublimaat of de *mercurius nitrosus*, in gedistilleerd- of kalkwater, naar aanleiding van den ouderdom der lijdens en den meer of minder geprikkelden toestand der huid; inwrijvingen met *unguentum citrinum*; *ung. neapol.* met *flor. zinci*; de roode *praecipitaat* met *ung. simplex*, overtreffen de meeste andere middelen, die uitwendig tegen de onderhavige ziekte in gebruik zijn gebracht. Behalve dat zij den uitslag genezen, hebben zij ook nog het voordeel van de lastige infecten, bij de *prurigo* der oude lieden zoo dikwijls

aan

aanwezig, te dooden. Heeft men redenen om eene complicatie met *scabies* te vermoeden, dan zijn, behalve de zwavelbaden en berookingen, ook de zwavelzalven aangewezen. De bereiding in de methode van WILKINSON verdient in soortgelijke gevallen aanprijzing.

R. *Sulphur. sublimati*
Picis liquidæ
axung. porci à lib ß
Sub-carbon. kali. dep. unc II
Hydro-sulph. ammon dr. II
 m. f. ung. S.

om de lijdende deelen dagelijks mede in te wrijven; toereikend, om voortdurend eene zwavel-atmosphereer te onderhouden. Om den anderen dag laten men de ingewrevene deelen met zeepfop afwaschen, en de vrijgeblevene deelen der huid met kruider-azijn en *natrum* of met eene oplossing van *argentum nitratum* bevochtigen.

Verder vindt men nog aangeraden: de aftreksels van *veratrum album*, hb. *nicotiana*, *staphys agria*, *seminis cocculi*, oplossingen van borax, aluin, loodzouten, zwavellever, de koolzure loodzouten, enz; tegen ontvellingen: strooipoe- ders van bloem met blaauwfel of *lapis calamina- ris*; of *semen lycopodii* met *flores zinci*.

Tegen *prurigo mitis et formicans* :

R. *axung. porci unc. IV*

pice liquidæ unc. I

laudani de Rousseau dr. I vel opii gr. III

m. f. ung. S. — tot inwrijvingen.

Tegen de *prurigo genitalium* bette men met :

R. *acid. hydro-cyanici dr. I β*

spiritus vini unc. VI

m.

wasfchingen met het *decoctum plantaginis majorum* met *saccharum saturni*, *camphor* en *sal ammoniac*; de oplossing van twee drachma *kali chloricum* in zes tot acht oncen water; de sublimaat-oplossing en het verdunde blaauwzuur worden door MEISSNER zeer geprezen.

Tegen *prurigo glandis* worden dezelfde hier genoemde middelen gebezigd. Daarmede niet slagende, volge men den raad van RICHTER: om de lijdende deelen met een afkookfel van den witte-wilgen bast en brandewijn te stoven.

Tegen de *prurigo urethralis* zijn inspuitingen met loodbereidingen, of kalkwater met melk heilzaam. Vernaauwingen in de *urethra* moeten door bougies of door het bijtmiddel opgeruimd worden. Zoo men echter met genoemde middelen niet slaagt, make men gebruik van de behandeling door GIRTANNER gevolgd: hij liet elektrieke vonken uit de roede trekken, en eene spaansche vliegenpleister met kamfer op de bilnaad leggen.

Tegen *prurigo scroti* zijn adstringerende en ver-

ster-

sterkende middelen, volgens RICHTER het alkookiel van de *ratanhia* boven alle andere te verkiezen.

Tegen *prurigo vaginalis* inspuitingen met oplossingen van loogzouten en sublimaat.

De behandeling van JON. GREEN, waarvan deze geleerde zoo hoog opgeeft, komt hoofdzakelijk op het volgende neder. Bij eene strenge en spaarzame diëet, worden zacht openende middelen toegediend; gelijktijdig eerst warm-waterbaden, vervolgens loog- en zwavelbaden aangewend. Verdunnende dranken met minerale zuren; *flores sulphuris* met *magnesia usta*, van twee tot twaalf greinen de gift, of koolzure loogzouten in kleinere giften: al naar mate men met eenen cachectischen toestand te doen heeft, en meer of min krachtig op de buiksgewanden en de huid wil inwerken.

Aderlatingen — gelijk reeds is aangemerkt — voldoen, volgens JON. GREEN en vele andere schrijvers, in deze huidziekte minder dan in andere soorten. Daar echter het bloed steeds eene ontstekingskorst met eenen vasten bloedkock heeft, zoo raadt GREEN echter tot matige bloedontlastingen, beweerende, dat men daarmede de huid voorbereidt en geschikt maakt, om de water-, damp- en zwavelbaden beter te verdragen. Nadat de toestand der lijders door middelen van onthouding en ontlasting verbeterd is, bezigt GREEN de dampbaden van eene gematigde warmte. Dit vermeldende voegt hij er bij: „wanneer, na de voorbijgaande opwekking der huid, die onmiddellijk op het gebruik der baden volgt, eene vermindering der

„toe-

„toevallen plaats heeft, dan ben ik verzekerd, de „ziekte in mijne magt te hebben” — eene verzekering, waarvan de gegrondheid door iederen praktischen arts zal erkend worden, en wel niet alleen in deze, maar in alle andere ilepende huidziekten, wanneer hij gelegenheid heeft gehad, om vele huidziekten te behandelen. Ook heeft GREEN waargenomen, dat gevallen, welke, zoo het scheen tot de hardnekkigste behoorden, verbonden met ontvellingen en zuchtige zwellingen, door heete lucht en zwavelbaden genezen worden, wanneer op de dampbaden eene voorbijgaande opwekking en verslimmering der toevallen volgt.

6^e Orde.

Squamae. Schubben.

Bepaling.

Pleksgewijze eigenaardige verandering der huid, met verdikking en verharding der opperhuid, verdroogende tot plaatjes van verschillende grootte en dikte, die aan de afscheidingsranden der gezond geblevene opperhuid loslaten, en als zilverkleurige, graauwe of bruinachtige schubben afvallen. De blootgekome, met roode, min of meer verhevene randen omgevene vlekken zijn eenigzins verheven, dieper of oppervlakkig in alle rigtingen gegroefd, welke groeven andere rigtingen volgen, dan die der gezonde opperhuid. Zij hebben eene roode, bleeke of wit glisterende oppervlakte, op welke de opperhuid andermaal ontaardt, en spoedig tot nieuwe plaatjes en schubben verdroogt.

In navolging van R. WILLAN en TH. BATEMAN, heb ik vier foorten van ziekten in de orde der *squamae* opgenomen. De verdeelingen van BIETT, RAYER en GREEN schijnen mij toe minder met de natuurlijke geëardheden dezer huidziekten, althans zoo als dezelve bij ons voorkomen, overeen te stemmen.

- a. *Lepra*. Melaatschheid.
- b. *Psoriasis*. Droogkraauwfel, droog schubachtig huidmos.
- c. *Pytiriasis*. Zemel-uitslag, huidzemeling.
- d. *Ichtyosis*. Vischschubachtig uitslag.

De schubachtige huidziekten hebben steeds een slepend beloop, zijn zeer langdurig en hardnekkig. In ieder der vier foorten bestaat de oorspronkelijke aandoening der lijdende huiddeelen in eene slepende ontsteking, eigendommelijk en verschillend gewijzigd, zoodat de eene soort, hoe langdurig haar beloop ook wezen moge, nimmer in eene andere overgaat. Even min ziet men een' en denzelfden lijder gelijktijdig door meer dan ééne ziekte aangetast.

Men heeft de *Lepra* en de *Psoriasis* als wijzigingen van eene en dezelfde ziekte willen beschouwen; in de vormen, waarin dezelve bij ons voorkomen, onderscheiden zij zich te duidelijk, dan dat men de eenzelvigheid van beide die ziekten voor waarschijnlijk kan houden.

De orde der schubachtige huidziekten is zoo scherp geteekend, dat dezelve met geene der andere orden kan verwisseld worden. In haar slepend en langdurig beloop grijpen meermalen verslimmingen

en verbeteringen plaats, verbonden met de wisselingen der levenstijdperken, en onderworpen aan den invloed der jaargetijden en der wereldstreken. Zij nemen met één of eenige weinige vlekken van een' kleinen omtrek, meerendeels op dezelfde plaatsen aan beide zijden des ligchaams haren aanvang, breiden zich spoedig over eene grootere oppervlakte, somwijlen over het geheele ligchaam uit, verloop en van haar eerste begin tot den hoogsten trap, en van daar tot de ligste aandoening, tamelijk regelmatig op en af, de jaargetijden volgende, en herhalen dezen loop één of meermalen in het jaar.

De langdurigheid der schubachtige huidziekten en de hardnekkige tegenstand, die dezelve der geneeskunst bieden, bewijzen genoegzaam, dat men met geene eenvoudige, alleen plaatselijke, maar met eene algemeene, diep in alle stelsels der bewerktuiging gewortelde ziekte te doen heeft. Zelden ontbreken alle algemeene ziekte-verschijnselen; eenige gaan der uitbotting vooraf, andere vergezellen het geheele beloop der ziekte, verdwijnen en komen weder, naar mate de natuur volkomen of onvolkomen slaagt, om den uitslag, als *crisis* van den algemeenen ziekte-toestand der bewerktuiging tot stand te brengen, en daardoor tijdelijk of duurzaam, zoo wel het algemeen als plaatselijk lijden uit den weg te ruimen. Schadelijkheden, storend inwerkend op de heilzame poging der natuur, worden door slepende ziekten der ingewanden en *hectische* koortsen gevolgd, die niet zelden een doodelijk einde nemen.

De plaatselijke toevallen zijn in de schubachtige
huid-

huidziekten, met andere vergeleken, niet hevig: eene matige jeukte, kieuweling en hitte in de lijdende deelen vergezellen dezelve. Eerst dan wanneer de slepende huidontsteking door langdurigheid dieper in het huidweeffel is ingedrongen, wordt het lijden grooter; de ontaardingender huid, zoowel als de dikte en hardheid der tot korsten opgeengelhoopte schubben, vooral in den omtrek der gewrichten, bemoeijelijken de bewegingen en verwekken pijnen. Waar de korsten scheuren en afgestooten worden, ontstaan pijnlijke kloven en ontvellingen, waardoor het aanzien dezer ziekten nog walgelijker en afschuwelijker wordt, dan het te voren geweest is.

De schubachtige huidziekten komen in alle tijdperken des levens, bij beide geslachten, in alle standen der maatschappij en in alle deelen des aardbodems voor. Zoowel onder de rijken, als onder de armen; onder hen, die in overvloed leven, als onder hen, aan wie de noodwendigheden des levens karig zijn toegedeeld; onder hen, die de hoogst mogelijke reinheid in acht nemen, als onder hen, die deze in alle deelen verwaarloozen, vinden zij hare uitgekozene offers.

De onderhevige ziekten heerschen nimmer epidemisch. Er zijn echter tijden geweest, waarin dezelve algemeen over *Europa* verbreid waren en veelvuldiger voorkwamen dan thans. In de keeringslanden komen zij ook nu nog menigvuldiger voor dan in andere gewesten; zij zijn in de thans voortkomende gedaanten in de koude en gemagtigde

dee-

deelen der aarde niet besmettend, maar zijn het vroeger geweest, blijkens hare algemeene verspreiding, tijdens de kruistogten en de oprigting der Leprozenhuizen in alle landen van *Europa*. Menigmaal zijn zij het erfdeel, dat de kinderen van hunne ouders ontvangen.

a. *Lepra*. Melaatschheid.

R. WILLAN heeft het woord *lepra* alleen op die ziekten toegepast, welke de voornaamste Grieksche geneeskundigen onder dien naam beschreven hebben, en daardoor groote, tot zijnen tijd toe bestaande verwarringen uit den weg geruimd; verwarringen, vooral door de Arabische geneesheeren en hunne volgelingen veroorzaakt, die de Grieksche oliphantsziekte *lepra* noemen, waaruit almede voortvloeit, dat de Grieksche melaatschheid, strijdig met de ervaring, voor ongeneesbaar gehouden werd.

Andere oude geneeskundige schrijvers beschouwden den uitslag voor critisch, en den hoogsten trap van deszelfs ontwikkeling als het gunstigste uitwerksel der natuurkrachten, om de algemeene ziekte tegenezen.

De beschrijvingen der *leprosis* door de geneesheeren uit de tijden, waarin deze ziekte onder den naam van Westersche melaatschheid *Europa* teisterde, zijn moeilijk op de thans voorkomende soorten toe te passen, waarschijnlijk dewijl deze ziekten door den tijd en andere algemeene oorzaken eene zachtere gesteldheid aangenomen hebben. Ook is het hieraan toe te schrijven, dat men vaak niet weet, of men met een enkel toeval, met een tijdperk, of

met

met de ziekte zelve te doen heeft. De bedoelde invloeden schijnen ook nu nog, door landeigene omstandigheden geholpen, de *leprosy* in de verschillende landen verschillend te wijzigen. Althans kan ik mij, zonder deze stelling aan te nemen, niet verklaren, van waar de tegenstrijdige beschrijvingen dier ziekte door de thans levende schrijvers haren oorsprong zoude ontleenen.

De meeste schrijvers, welke na WILLAN de huidziekten beschreven hebben, volgden zijn voorbeeld en huldigden zijne meening.

De *lepra* kenschetst zich in de verschillende gedaanten, die zij aanneemt, door ronde plekken van verschillende grootte, met schubben bedekt, die, zich laagsgewijs ophoopen, een korst- roofaardig aanzien verkrijgen.

Vele schrijvers beschouwen de korsten en schubben, die deze ziekte kenschetsen, enkel en alleen als ontatdingen der opperhuid zonder ziekelijke afscheiding. Meer waarschijnlijk komt het voor, dat de ontatdingen der opperhuid de voortbrengfels van vermeerderde en gewijzigde afscheiding van stolbare wei zijn, te meer daar men, de korsten wegnemende vóórdat zij geheel uitgedroogd afvallen, de ontbloote huidplekken steeds ontveld en vochtig vindt.

In navolging van WILLAN en BATEMAN, en in tegenpraak met andere schrijvers, worden hier drie wijzigingen der *lepra* aangenomen:

1. *Lepra vulgaris.*
2. *Lepra alphas.*
3. *Lepra nigricans.*

III Deel.

Q

Le

I.

Lepra vulgaris, lepra Graecorum. De gewone of Griekſche leproſy, of melaatschheid.

(*Dartre furfuracée, arrondie* ALI-BERTI). *Herpes scabidus, centrifugus, papulosus* Joſephi Polya's.

Bepaling. De ontwikkeling dezer ziekte begint met kleine, harde, roodkleurige, van elkander afgezonderde verhevenheden der opperhuid of met drooge peukels met eene glinſerende punt; de natuurlijke lijnen der opperhuid verdwijnen te dier plaatſe, en binnen weinige uren zijn dezelve met dunne, witte ſchilfers bedekt. In het verloop van eenige dagen worden deze peukelachtige verhevenheden vlak en bereiken de grootte van een dubbeltje; de ſchilfers worden talrijker, dikker, pakken op een en vormen ſchubben, die in getal, omvang en dikte voortdurend toenemen. Van tijd tot tijd grijpen nieuwe uitbottingen van peukelachtige verhevenheden, hetzelfde beloop als de eerſte volgende, plaats. De in getal en omvang toenemende plekken, die ſteeds eene ronde of eironde gedaante hebben, vloeijen in een, en bereiken den omtrek van een' gulden tot dien eener handpalm; deze zamengeſtelde plekken blijven de oorſpronkelijke ronde gedaante der vlekken, waaruit zij zamengeſteld zijn, bewaren, en de meer of minder verhevene randen wijzen den omtrek van ieder der zamengevloeiende vlekken aan, zelfs dan nog, wanneer de opeengepakte ſchubben dik-

dikke korsten en roven gevormd hebben, hetwelk in het verdere beloop der ziekte altijd plaats heeft. De korsten hebben eene geel-witte, graauwe of bruine kleur, voorzien met vele diepe of oppervlakkige kuilen, gevuld met een geelachtig-wit stuifmeel, uit zeer fijne afschilferingen bestaande. Deze met eenigzins verhevene roode randen omgevene korsten laten, in het midden beginnende, naar den omtrek voortgaande, met gedeelten los, vallen af, om telkens en zoo lang door andere vervangen te worden, als de volkomene genezing der ziekte niet tot stand is gebragt. Worden de korsten door eenig geweld afgestooten of weggenomen, dan vindt men de ontbloote huid ligt gezwollen, poreus, peukelachtig en gerimpeld, en zij bedekt zich op nieuw met schilfers, schubben en korsten. De ziekte genezen zijnde, zoodat geene nieuwe korsten meer gevormd worden, blijft de opperhuid nog lang droog, dun glad en glinsterende. De jeukte is in de *lepra* niet hevig, maar vermeerdert door de warmte in het bed, door groote en plotselinge weersveranderingen, en na het gebruik van gezouten, gerookte en andere scherpe spijsen en geestrijke dranken. Koorts komt in de groep der eigene verschijnselen dezer ziekte niet voor. Bij jeugdige lijders gaat de ligchamelijke en geestelijke ontwikkeling langzaam voort. Al de lijders hebben een bleek, flets en kwijnend voorkomen; hun adem en hunne uitwaseming eenen onaangename boksreuk. Na de genezing, die in het midden der plekken begint en naar de randen voortgaat, blijven de

roode , ligt verhevene en schilferende randen nog eenigen tijd , langzaam afnemende en verdwijnende , aanwezig .

De gewone of Griekſche melaatschheid komt bij ons en in *Duitschland* zeldzamer dan in *Frankrijk* , *Engeland* en in het noorden van *Europa* voor . Zij is bij ons , in de thans voorkomende gedaante , zeer na verwant aan de *porrigo lupinosa* en *scutellata* , waarſchijnlijk met deze uit dezelfde moeder geboren . In het door mij waargenomen en beſchreven geval (Geneeskundige Jaarboeken , 3^e. deel , 3^e. ſtuk . pag. 197) huwde de herſtelde lijderes , thans weduwe , en bragt vier kinderen ter wereld , waarvan nog drie in leven zijn ; geen dezer kinderen , het jongſte vier jaren oud , lijdt aan *lepra* , maar allen zijn door *porrigo lupinosa* en *scutellata* aangetast .

Zetel en be-
loop.

De elleboog , de voorarm en de knie zijn de plaatſen , welke de *lepra* het eerst en bij voorkeur aantast . Zelden blijft zij tot deze deelen alleen bepaald , maar breidt zich met afgezonderde plekken over alle deelen des ligchaams uit . De met haren begroeide deelen worden zeldzamer aangetast ; maar waar dit geſchiedt , worden de haren wolachtig , verkleuren of vallen uit . De binnen of buigzijde der gewrichten en de meest vleezige deelen des ligchaams hebben minder van deze uitſlag te lijden dan die , waar de beenderen onmiddellijk onder de huid gelegen zijn . Somwijlen wordt alleen de eene zijde , gewoonlijk echter dezelfde deelen op beide zijden des ligchaams gelijktijdig aangetast . Het

aan-

aangezicht beneden de wenkbraauwen blijft bijna altijd verschoond. Hoe algemeener de uitslag zich over het ligchaam uitbreidt, des te afzigtelijker wordt hetzelfde misvormd; nimmer wordt de geheele oppervlakte met eene samenhangende korst, gelijk bij de *ichtyosis*, bedekt. Aan de teeldeelen voorkomende, gaat de *lepra* met de zeer lastige *prurigo genitalium* gepaard, en verwekt eene overmatige neiging tot bevrediging van de teeldrift. De nagels der vingers en teenen nemen deel in den ziekelijken toestand der opperhuid, verdikken, splejten, krommen zich vogelklaauwvormig, vallen meermalen af, om door andere, ziekelijk gevormde, vervangen te worden; ook de tanden schijnen in dit lijden te deelen. In de zwaarste en langdurigste gevallen zijn de teekenen van algemeene kwaadfappigheid aanwezig, verbonden met slepende aandoeningen der ingewanden.

De *lepra* behoort tot de langdurigste der huid- Dit en
voorzegging. ziekten, die hare offers jaren lang, somwijlen tot aan het einde des levens kwelt. Zeldzaam, en alleen in de ligtste gevallen, waarin slechts eenige weinige en kleine gedeelten der huid met uitslag bezet zijn, volgt de genezing binnen eenige maanden. De verschijnselen, welke het algemeen lijden der bewerktuiging kenfchetfen, zijn een onzekere leiddraad voor de voorzegging; want zij worden in hunne grootste ontwikkeling in ligte gevallen waargenomen, en gemist in die, welke de uitgebreidheid en langdurigheid des uitlags als de zwaarste aanwijst. Eveneens is het gelegen met de bij her-

haling wederkeerende uitbottingen; zij oefenen geen gunstigen invloed op het beloop van den eerst aanwezigen uitslag, wanneer zij op vrijgeblevene huiddeelen plaats vinden; want de eerste en de laatste blijven vaak naast elkander bestaan en vloeijen tot grootere plekken in een. Ook op de eerst genezene huiddeelen komen meermalen na een korter of langer tijdsverloop nieuwe korsten te voorschijn. Noch de kunst, noch de natuur vermogen eene spoedige genezing daar te stellen, die men derhalve nimmer beloven mag. Echter komt dezelve in verre weg de meeste gevallen langzaam en na een lang tijdsverloop tot stand: in zoo verre mag alzoo de voorzegging gunstig zijn, dat de *lepra* tot de geneesbare en niet tot de ongeneesbare ziekten behoort. Men mag de genezing als naderende beschouwen, wanneer geene nieuwe uitbottingen plaats vinden, de korsten in het midden der plekken loslaten en afvallen, door geene andere, maar door eene steeds verminderende schubachtige afschilfering vervangen worden, wanneer dit afruijen der korsten naar den omtrek der vlekken geregeld voortgaat, de blootgekome ne huiddeelen een meer natuurlijk aanzien verkrijgen, en alleen de randen nog eenigzins hard, rood en verheven blijven. Intusschen erlangt de opperhuid hare natuurlijke gedaante langzaam terug; nog geruimen tijd, nadat de zemelachtige afscheiding geheel verdween, behoudt dezelve een rood of wit glinsterend aanzien, met voren gegroefd en met verhevene lijnvormige plooijen in alle rigtingen doortrokken, vooral bij de bewe-

gin-

gingen der deelen zichtbaar. De likteekens, die de geaardheid der voorafgegane ziekte verraden, hebben eene groote overeenkomst met die, welke, vaak levenslang, na oppervlakkige huidverbrandin terug blijven.

In overeenstemming met de verschillende stelsels in de geneeskunst, welke deze meer ontsierden dan voordeel aanbragten, werden velerlei meeningen en vooronderstellingen te berde gebragt, om de oorzaak der *lepra* te verklaren. Dezelve zonder vooringenomenheid beoordeelende, ontwaart men al ras, dat het dwaallichten waren, die den regten weg deden misfen.

Trage bloedsomloop, langzame pols, ophoopingenvan vochten in de buksingewanden, eene ruwe, drooge, weinig of niet uitwafemende huid, de aangeboren of van de ouders geërfde aanleg, en de leeftijd boven de veertig jaren, volgens R. WILLAN, die zich ten deze op HIPPOCRATES en GALENUS beroept, worden als voorbeschikkende oorzaken aangewezen. De meeste der mij voorgekomene gevallen vonden bij jonge lieden, zelfs beneden de 15 jaren plaats. Landeigene en andere in de leefwijze der volken gegronde oorzaken zijn het waarschijnlijk, die deze en meer andere wijzigingen der *lepra* voortbrengen.

Door alle tijden heen, heeft men de zware, vette, gezouten, gerookte en moeilijk verteerbare spijzen onder de gelegenheid gevende oorzaken opgesomd. Dat dezelve, geholpen door armoede, koude, vochtige woningen, onreinheid der huid,

Oorzaken.

Voorbeschikkende oorzaken.

Gelegenheid gevende en toevallige oorzaken.

zwaren arbeid, enz., bij den aanwezigen aanleg de ontwikkeling der *lepra* begunstigen, is wel waarschijnlijk, maar niet voldoende bewezen; want niet overal, waar de genoemde omstandigheden bestaan, komt de *lepra* het menigvuldigst voor. In den omtrek van *London*, waar die voedfels weinig, en in *Frankrijk*, waar zij veel minder dan bij ons gebruikt worden, komt de *lepra* veelvuldig en in ons land zeer zelden voor. In visschersdorpen, waar vele gezouten, gedroogde en gerookte vischen gegeten worden, heerscht de *lepra* niet talrijker dan op andere plaatsen. R. WILLAN verklaart, dat verkoudheden, vochtig weder en onreinheid der huid de eenige hem bekende oorzaken der *lepra* zijn, die door onreinen arbeid in alle jaargetijden en ontbrekende badinrigtingen voor het algemeen zeer begunstigd worden. Opgewekte hartstogten en misbruik van sterken drank worden door BIËRT en anderen beschuldigd. Mijs inziens kunnen de voorbeschikkende en toevallige oorzaken dezer ziekte niet gelegen zijn in algemeen werkende invloeden en veelmaals werkende schadelijkheden; dewijl, indien dit plaats had, de *lepra* tot de meer algemeen verbreide ziekten zoude moeten behooren, en niet slechts een enkel lid uit een talrijk gezin aantasten, de andere verschoonende.

Naaste oorzaak.

Het voor onze zinnen, door redenering geholpen, laatst waarneembare verschijnsel bij de *lepra*, heeft men, even als bij de meeste andere ziekten, voor de naaste oorzaak gehouden, en, gelijk natuurlijk is, daarbij niets gewonnen. Het ligt klaar aan den

den dag, dat de bewerktuiging en de verrigtingen bij *lepra*-lijders zich in eenen eigenen toestand van leven bevinden, afwijkende van dien der gezondheid. Maar waarin het eigene wezen van denzelfven bestaat, blijft een raadsel. Naar het mij toeschijnt, bestaat er eene eigene dyscrasie, scherpte of specifieke prikkel in de bewerktuiging, overeenkomende en naauw vermaagschapt aan de serophuleuse en syphilitische dyscrasiën.

2.) *Lepra alphas, alphondes.*

De witte leprosy,

Komt ook onder de benamingen van *leuce*, *vittigo*, *morphea alba*, *morphea nigra* en *albaras* der Arabieren voor. De hierdoor ontstane verwarringen veroorzaken vele en groote moeilijkheden, en maken het vaak ondoenlijk om met zekerheid te bepalen, of men de onder deze benamingen bij de schrijvers voorkomende ziekte voor ééne en dezelfde, dan wel voor verschillende te houden hebbe. P. G. HENSLER houdt het voor waarschijnlijk: dat de *lepra alphas* de oudste, eerst gekende en beschrevene soort van *leprosy* geweest zij; dat dezelve in haar eerste tijdperk den naam van *morphea alba*, in het tweede dien van *baras alba*, en in het derde dien van *lepra tyria* gedragen heeft.

Deze uitslag kenschetst zich door kleine, enkelstaande, drupvormige vlekken, die over de huid verstrooid staan, haar diameter bedraagt slechts eenige lijnen, het middelpunt is ingedrukt, en de geheele vlek met dunne, witte, glinsterende schub-

Bepaling.

ben bedekt. De *lepra alphas* heeft in gedaante, waarin zij bij ons gezien wordt, grootere overeenkomst met de *psoriasis* dan met de *lepra vulgaris*. Indien men het menigwerf geopperd gevoelen, dat beide deze ziekten niet anders dan verschillende ontwikkelingstijdperken van eene en dezelfde ziekte zijn, wilde aannemen, dan zoude men de *alphos* als den schalm moeten beschouwen, die de beide einden der keten: *lepra* en *psoriasis*, in hare hoogste ontwikkeling met elkander verbindt.

Beloop.

De uitbotting begint met kleine, witte of roode, onpijnlijke of gevoellooze, ligt verhevene stippen; zij zijn hard, zonder jeukte, en breiden zich spoedig tot den omtrek van een' stuiver uit. Binnen den tijd van twee tot vier dagen, krijgt het middelpunt eene deuk, omgeven door eenen opgeworpenen, zich meer en meer verheffenden harden, hoogrooden rand, die zich niet verder uitbreidt. De vlekken geraken meer en meer met dunne, witte, glinsterende, stofachtige schubben bedekt, zoodat dezelve wel eene geringe overeenkomst hebben met de *porrigo lupinosa*. Zij onderscheiden zich van elkander door de dikte der diep-napvormig ingedeukte, gele korsten der *porrigo*; de dunheid, witte glinsterende kleur en doorgaande afschilfering der schubben bij de *alphos*. De afschilferde schubben worden telkens door andere vervangen, de vlekken blijven van elkander afgescheiden; alleen aan de punt van den elleboog vloeijen zij meermalen ineen, en omgeven dezelve met eene uit vele plaatjes zamengestelde schub.

De

De ledematen zijn meer dan het overige des ligchaams aan dezen uitflag onderhevig, zonder daarvan geheel verschoond te blijven. De haren der aangedane deelen worden wolachtig, wit, en vallen uit. De nagels ondergaan dezelfde veranderingen als in de *lepra vulgaris*.

De witte leprosy is niet minder hardnekkig, langdurig en moeilijk te genezen dan de gewone *lepra*; ook ondergaat de opperhuid dezelfde veranderingen, en kenschetst nog lang na de genezing de geaardheid der voorafgegane ziekte.

In *Engeland* komt deze ziekte menigvuldig voor; bij ons niet zeer zeldzaam, maar wordt vaak niet gekend, en met een groot aantal andere slepende huidziekten, onder den algemeenen naam van *herpes*, ter zijde geschoven. Zij tast meer jonge lieden aan dan bejaarden, terwijl, volgens WILLAN en anderen, met de gewone leprosy juist het tegendeel zou plaats hebben:

De ziekte, welke BIËRT en zijne navolgers als vleksgewijze *lepra* zonder schubben en schilfering beschrijven, en die zich over groote oppervlakte des ligchaams uitbreidt, behoort mijns inziens, niet onder de *lepra*-wijzigingen, maar tot de *psoriasis* of *lichen*.

Ten aanzien der oorzaken heerschen dezelfde meeningen als bij de gewone *lepra*. Of er meer mannen dan vrouwen door aangetast worden, of zij in het najaar meer dan in andere seizoenen voorkomt, door koude en vochtigheid des dampkrings, gezouten spijzen en zeevisch voortgebracht wordt,

wordt , en vooral lieden aantast , die veel stofverwekkende handteringen uitoefenen , — mag mischien in *Frankrijk* , *Engeland* , en elders bevestigend moeten beantwoord worden , doch komt met mijne ervaring niet overeen.

Het lijden der bewerktuiging bij de *alphos* is niet alleen plaatselijk , maar algemeen en eigenfoortig. Van deszelfs opruiming hangt de genezing af , die echter in vele gevallen , naar het mij toefchijnt , meer het werk der natuur dan dat der kunst is.

III.

Lepra nigricans. De donkerkleurige leprosy.

Omtrent het al dan niet bestaan dezer ziekte , heerscht onder de fchrijvers over de huidziekten verfchil. WILLAN en BATEMAN befchouwen dezelve als eene eigene wijziging der *lepra* ; BIETT en RAYER houden dezelve voor eene wijziging der venerifche huidfchilfering (*syphilide squammeuse*); GREEN brengt dezelve tot de huidverkleuring (*dischroa*); mijns inziens is zij van beide ziektevormen zeer kennelijk onderfcheiden , en niet anders dan de *lepra vulgaris* , die door onachtzaamheid , verwaarloozing en onreinheid eenige wijzigingen ondergaan heeft.

Bepaling. Dezelfde verfchijnfelen , toevallen en het beloop , aan de gewone leprosy eigen , kenfchetfen ook de donkerkleurige leprosy , met dit onderfcheid : dat de korften donkerder , geel-graauw en zwartachtig van kleur , dunner , meer langwerpig dan rond , kleiner van omtrek en minder met deuken voorzien zijn.

zijn. In dezen vorm komt de *lepra* zeer zelden voor.

Men wil, dat dezelve het menigvuldigst aan de Beloop. onderste ledematen en de voorarmen haar begin neemt, en zich van daar over de andere deelen des ligchaams uitbreidt. De dunnere, schubachtige korsten laten de wankleurige oppervlakte der aangedane huiddeelen doorschijnen, waaraan gedeeltelijk de wankleurigheid der korsten is toe te schrijven. De korsten zitten losser dan bij de andere *lepra*-soorten, en kunnen met geringe moeite worden afgestooten of verwijderd. De blootkomende huidplekken blijven langdurig ontveld, alvorens door nieuwe schubben en brosse, roofachtige korsten gedekt te worden, hetgeen ontstaat door verdrooging der bloedige wei, die overvloedig wordt afgescheiden; — de bewegingen der lijdende deelen worden hierdoor zeer moeilijk. Terwijl hier en daar enkele plekken genezen, ziet men op andere deelen nieuwe te voorschijn komen. Volkomene genezing laat zich dan eerst met zekerheid voorspellen, wanneer na langen duur der ziekte de gezondheids-toestand der lijders verbetert, de uitslag een gunstiger aanzien verkrijgt, en gelijktijdig alle aanwezige korsten in haar middelpunt beginnen los te laten, zoodat de huid droog en zonder ontvelling bloot komt.

De personen, die bij voorkeur door dezelve worden aangetast, zijn, volgens WILLAN, zij, die zeer zwaren en vermoeijenden arbeid verrigten, in koude, vochtige plaatsen bezig zijn, en bij eenen slechten leefregel aan alle ongunstige invloeden der
fai-

faizoenen blootstaan, weshalve het voornamelijk soldaten, brouwersknechts, slagters, postiljons en varensgezellen zijn, bij wie deze ziekte gezien wordt. Bij ons vindt men dezelve enkele malen bij den behoeftigen volksstand en bij boeren-arbeiders, welligt nimmer bij gegoede, de gemakken des levens genietende personen.

Geneeskun-
dige behan-
deling.

Het groote getal geneesmiddelen van de vroegste tijden af tot op onze dagen tegen de *lepra* aan-geprezen, maakt het zeer moeilijk eene geneeswijze ter navolging aan te raden; want geene bestaat er, waartegen zich niet een even groot getal stemmen van achtbare autoriteiten verheffen, als er aanprijzende zich doen hooren. Voegzaam komt het mij voor, de behandeling drieledig te beschouwen, namelijk: a) als voorbereidende; b) als redenerende; c) als specifieke.

a) Tot de voorbereidende behoort, in de eerste plaats, opruiming der bekende schadelijkheden, welke de ontwikkeling en voortduring der *lepra*, als voorbeschikkende en gelegenheidgevende oorzaken begunstigd hebben of nog begunstigen. Ten andere, zorg te dragen voor eene de gezondheid bevorderende verpleging en voeding: door warme water- en dampbaden reinige men de huid, herstelle de uitwaseming, week de schubben en korsten los, ten einde het huidweeffel tot deszelfs natuurlijken toestand terug gebragt worde. In ligte gevallen, waarin geene, diep in de bewerktuiging gewortelde oorzaken aanwezig zijn, kan de genezing tot stand gebragt worden door alleen de natuur door de voorbereidende behandeling te ondersteunen.

b) De

b) De redenerende behandeling wordt bestuurd naar aanleiding van de voorschriften der algemeene ziektekunde. Bij trage buiksonstlasting met gastrische ophooping, door zware, onverteerbare voedfels of door ziekelijke afscheidingen veroorzaakt, en belemmeringen van den bloedsomloop in het stelsel der poortader, worden ontlastingsmiddelen gevorderd; — de verkoelende middelen bij eenen opgewekten en geprikkelden toestand der bewerktuiging; bij traagheid en werkeloosheid; uit de klasse der opwekkende en prikkelende, de rhabarber, de jalappe, de aloës of de nieswortel met of zonder calomel. De bloedontlastingen, door de Ouden tegen de *lepra* aangewend, komen zelden of nimmer, noch de algemeene door aderlatingen, noch de plaatselijke door bloedzuigers en koppen te passe, uit hoofde van den cachectischen toestand, waarin de leprozen verkeeren. Indien er echter gevallen voorkomen, waarin de individuële gesteldheden der lijders of opkomende complicatiën met andere ontstekingen, stellig bloedontlastingen aanwijzen, dan stelle men dezelve met noodige omzigtigheid in het werk.

Door middel van eenen doelmatigen leefregel en gepaste voeding beure men de reproductieve verrichtingen op, en verbeter de bloedmaking, om de menging der vochten tot den gezondmatigen toestand terug te voeren, gewijzigd naar aanleiding der specifieke geaardheden van de onderscheidene dyscrasiën, als oorzaken van den algemeenen ziekelijken toestand der bewerktuiging. De eigene middelen

tegen de *syphilis*, de klierziekte, de fcheurbuik en de fchurft kunnen derhalve tot de genezing gevorderd worden.

ROB. WILLAN, alhoewel meermalen den algemeenen ziekte-toestand bij de *lepra* in twijfel trekkende, zegt intusfchen: Dat de gewone middelen tegen de *lepra* in de *lepra nigricans* niets uitrigten, en dat deze, naast eenen goeden voedenden leefregel en matige ligchaamsbeweging, het gebruik der kina, der minerale zuren en der zeebaden vereischt.

WILLAN erkent hiermede het bestaan eener algemeene ziektegefteldheid der bewerktuiging bij de *lepra*, en fchijnt daarbij voornamelijk de fcheurbuikige op het oog te hebben.

Specifieke
behandeling.

Het gevoelen omhelzende, dat de *lepra* uit eene algemeene oorzaak, in de bewerktuiging gelegen, voortkomt, die wij echter in haar bestaan en wezen niet kunnen doorgronden; — dat zij, even als de frophuleuze, venerifche, kankerachtige en andere dyscrasïën, eene specifieke behandeling vordert, en door de redenerende toepafing der algemeene therapeutifche regelen niet kan genezen worden; zoo houde ik het voor noodig, de voornaamfte middelen aan te wijzen, welke waarfchijnlijk met geneeskrachten tegen de *lepra* begaafd zijn, en nu eens met meer, dan met minder gevolg tegen deze ziekte gebruikt werden.

Het getal dezer middelen, zoowel der uit- als inwendige is zeer groot, men bediene zich van dezelve, wanneer noch door opruiming der oorzaken, noch door redenerende behandeling de genezing tot
ftand

stand gebragt kon worden. De keuze is vaak moeilijk, daar hierbij alles afhangt van de bijzondere beschouwing der geneeskundigen, van hetgene de empirie geleerd heeft, en van den gunstigen of ongunstigen dunk, dien de handelende geneesheer vóór of tegen het eene of andere middel heeft opgevat. Er bestaan geene vaste regelen, die ons hier tot leiddraad kunnen verstreken.

De oude geneeskundigen hebben de drastisch lakfeermiddelen, vooral den zwarte en den witten nieswortel, aangeprezen. De calomel, de jalappe, de aloës en andere kunnen in derzelver plaats gesteld worden. Gewoonlijk verschaffen de lakfeermiddelen eene kortstondige verbetering maar zijn niet genoegzaam, om eene volkomene genezing te bewerken. Men gebruike dezelve zoo lang als ontledigingen van de darmbuis en eene krachtige afleiding van de huid naar het darmkanaal eenig voordeel beloven.

De spiesglasbereidingen en het ruwe spiesglas met zwavel en salpeter verbonden, vermogen, zoowel in vereeniging als afzonderlijk toegediend, weinig of niets tegen de *lepra*. De scabieuze en scrophuleuze complicatiën worden er door verbeterd en opgeruimd.

De kwikbereidingen, veelvuldig aangeraden en afgekeurd, genezen de *lepra* niet, al worden dezelve ook tot salivatie toe volgehouden. De roem, die zich de sublimaat, in wijngeest opgelost, en als bestanddeel van geheime middelen, tegen de *lepra* verworven heeft, schijnt alleen aan de syphilitische

complicatie te moeten worden toegeschreven. Waar, ten gevolge dezer complicatie, de kwikmiddelen zijn aangewezen, verbindt men dezelve met afkookfels der geneeskundige houten en met spiesglasbereidingen.

De delfstofzuren zijn almede tegen de *lepra* aangeraden, en kunnen bij scorbutische dyscrasie der vochten van nut zijn. Als specifieke middelen hebben het salpeter en het zeezoutzuur zich geenszins kunnen staande houden.

Van de loogzouten, en wel boven andere bereidingen van de *liquor kali caustici*, heeft R. WILLAN meermalen eene gunstige uitwerking ondervonden. Men geeft dit middel driemaal daags van 10 tot 30 druppels.

De arsenik-tincturen van FOWLER en PEARSON worden door de Franschen tegen de hardnekkigste gevallen aangeraden. Deze, de calomel en de tinctura *cantharidum* zijn de middelen, waarvan men zich in het hospitaal *St. Louis* bij voorkeur en bijna uitsluitend bedient.

Het *anthrakokali* door POLYA's zoo ruimschoots tegen den *herpes* aangeraden, wordt in het volgende voorschrift bij *lepra* gegeven:

R. *Anthrakokali simplicis vel sulphureti*. gr. II
sulphuris aurati. gr. β. *vel*
antimonii crudi. gr. III
magnesia carbonicae vel
pulveris rad. liquiritiae. gr. III
m. f. pulvis dent. tales doses, No. 3
 binnen 24 uren te gebruiken.

Met

Met dit middel wordt volgehouden zoo lang, tot dat er eene plaatselijke en algemeene wederwerking tot stand is gebragt. Naar de leerstelling des schrijvers vernietigt het *anthrakokali* de *herpetische* en het *antimonium* de *leprose dyscrasie*, welke, vereenigd, de oorzaken der *lepra* zijn (*).

Veel-

(*) JOSEPH POLYA's, *Beobachtungen über die Flechten und ihre Verbindungen, nebst einem specifischen Mittel zu derer Heilung, nämlich dem Anthrakokali*. Leipzig 1837. *Nach der lateinischen Handschrift des Verfassers übersetzt von Dr. K. L. SIGMUND.*

Deze schrijver brengt alle slepende huidziekten onder *herpes*; verdeelt dezelve in eenvoudige en in zamengestelde; naar derzelfver uitwendigen vorm in peukelachtige, blaasvormige, puistige, schubachtige, zwerende, enz. De eenvoudige *herpes* ontspringt uit eene eigene, diep in de bewerktuiging gewortelde en in de huid vegeterende *dyscrasie*. De zamengestelden ontstaan, wanneer andere *dyscrasiën* zich met de herpetische verbinden: zoo ontstaat de scabieuze, de venerische, de leproze, de roosaardige en de kankerachtige *herpes*.

De naaste oorzaak der *herpes* bestaat in eene eigene reactie, opgewekt door de eigene *dyscrasie*, die specifiek is; en derhalve, even als alle andere *dyscrasiën*, specifieke geneesmiddelen vordert. In het *anthrakokali* wil POLYA's het specificum tegen de *herpes* gevonden hebben, en hetzelfde tot een universeel geneesmiddel ook tegen alle complicatiën verheffen, mits hetzelfde met de specifieke geneesmiddelen tegen de bijzondere aanwezige *dyscrasiën* verbonden worde: met de zwavel bij de scabieuze, met het kwik bij de syphilitische, met het spieësglas bij de leproze, met jodium tegen de carcinomateuze *dyscrasiën*, enz.

Het *anthrakokali* (kool en kali) bestaat uit eene oplossing van steenkool en bijtend kali: (men neemt de bruine en niet de

Veelvuldig hebben de oude Geneesheeren de adders tegen de *lepra* aangeraden, en ze op verschillende wijzen toegediend. Zij gaven het gedroogde vleesch in poeders, de versche adders tot bouillon gekookt of als

de zwarte steenkool, want deze is onoplosbaar). Tot de bereiding neemt men zeven oncen bijtend en versch bereid *kali* met vijf oncen zeer fijn steenkoolpoeder, en laat dezelve onder aanhoudend omroeren gloeijen. Van het vuur genomen, laat men het praeparaat in eenen warmen mortier fijn wrijven, tot dat men een fijn, gelijkmatig zacht poeder verkregen heeft. Men beware dit middel op eene drooge plaats in warmgemaakte goed geslotene fleschjes, die ééne once bevatten kunnen. Het gezwavelde *anthrakokali* (*anthrakokali sulphuretum*) wordt op dezelfde wijze, alleen met bijvoeging van eene halve once bloem van zwavel tot de bruinkool, bereid.

Het *anthrakokali* is een zwart, zacht afverwend poeder, met eenen scherpen loogzoutachtigen smaak; het verwekt een brandend gevoel op de tong en verbreidt eenen roetachtigen reuk; trekt vochtigheid uit den dampkring aan, maar wordt niet vloeibaar; in drooge lucht verliest het de vochtigheid, tegelijk met den loogzoutachtigen smaak.

In *alkohol* wordt er weinig van opgelost; in gedistilleerd water lost het zich gemakkelijk op. Goed bereid, is de oplossing een gelijkmatig zwart vocht, dat ook gefiltreerd zijne kleur behoudt: als het deze verliest, dan is het praeparaat niet goed bereid.

Werking. Aan een' gezond' persoon gaf men, bij een diëet tot drie soepen daags beperkt, 10 greinen *anthrakokali* in den tijd van 10 uren. Hierop volgde een sterke toevloed van vochten naar de huid met branding, verhaaste pols en loomheid der leden; — des nachts een ruim zweet; bij voortdurende uitwaseming des morgens twee zwarte buikontlastingen. De huid bleef nog twee dagen vochtig.

Ge.

als soepen bereid, en door middel van jonge hoenders, die men gedurende eenigen tijd met addervleesch, gemengd onder hun gewoon voedsel, gevoed had. Thans is dit middel genoegzaam buiten gebruik.

De

Gebruik. Lijders, door slepende huidziekten aangetast, die eene goede spijsvertering hebben, geeft men:

R. *Anthrakokali* gr. ii
pulv. rad. liquir. gr. v
m f. pulv. pro-dosi
 drie tot vier giften daags.

Bij eenige lijders volgt reeds in den eersten nacht, na voorafgaande vliegende hitte, volle verhaaste pols, algemeen zweet en brandend gevoel in de huid. Bij andere lijders volgen deze verschijnselen eerst den 5den, 7den, 14den, 25sten — bij een klein getal den 30sten dag. Het zweet is meerendeels warm, zelden koud; het keert van tijd tot tijd, ten laatste iederen nacht terug, zonder te verzwakken; in tegendeel, het verbetert den algemeenen gezondheidstoestand der lijders.

Na het ophouden van het zweet, blijft er een plaatselijk koud of warm zweet terug, onbepaalder van duur. Meeren-deels vindt men dit zweet op de plaatsen, die met uitslag bezet zijn, verder onder de okselen, aan de handen, de scheenen, den rug van den voet, de billen en de teeldeelen; het duurt dikwijls voort tot dat de ziektestof geheel vernietigd is.

Zelden is het zweet gelijktijdig algemeen en plaatselijk; beide zijn de gevolgen van de algemeene werkingen van het geneesmiddel. Zoodra het nachtzweet begint, worden de herpetische vlekken grooter, rooder van kleur, en de afscheiding der ziektestof wordt ruimer; met jeukte ontwikkelen zich nieuwe plekken, of de zieken worden door netelroos, bij scabieuze complicatie door scabieuze roos aangetast; bij andere

De spaansche-vliegentinctuur heeft men tegen de *lepra* even als tegen de andere hardnekkige huidziekten sterk aangeraden. WILLAN en FALCONER hebben dit middel zonder vrucht aangewend. BIETT,

RAYER

lijders ontstaan peukels, die hevig jeuken en des morgens verdwijnen.

Gedurende den onbepaalden duur van deze plaatselijke wederwerking, wordt de jeukte des nachts minder, insgelijks de roodheid en de afscheiding der ziektestof. De eenvoudige *herpes* verbetert blijkbaar. Bij zeer sterke lieden grijpen bij volle maan recidiven plaats.

Deze algemeene en plaatselijke wederwerkingen zijn niet toereikend om de herpetische ziektestof te vernietigen, omdat zij zonder koorts blijven. De speciële of specifieke reactie wordt door koorts aangewezen. Om deze op te wekken, moet het *anthrakokali* langdurig, namelijk tot verzadiging van de bewerktuiging en doorgestaan zweeten, gegeven worden.

De eerste reactie is de algemeene werking van het geneesmiddel, gekenschetst door plaatselijk en algemeen zweet. De laatste is de speciële, aangewezen door de koorts, die het geneesmiddel verwekt heeft. Gedurende de koortsachtige wederwerking verergert de *herpes*, en alle hem eigene verschijnselen treden hoogst ontwikkeld te voorschijn. Nadat de koorts bedaard is, verbetert het voorkomen der lijders, en de genezing komt allengskens tot stand. (Deze plaatselijke en algemeene verslimming heeft ook GREEN als een stellig bewijs beschouwd, dat de genezing tot stand komt).

Wanneer de algemeene reactie hevig is, moet het *anthrakokali* achterwege blijven, en geene door nitrum gematigd worden; — anders laat men het middel door gebruiken.

Alleen in het begin der opgewekte wederwerking lijdt despijvertering. De regelmatige pols geeft te kennen, dat de reactie haar eindperk bereikt heeft; — de verbetering en genezing der dijserasie, dat dezelve wezentlijk heeft plaats gehad.

Het

RAYER en GREEN daarentegen noemen de spaansche-vlieginctuur als een der meest vermogende middelen tegen de *lepra*; zelfs in zeer verouderde gevallen volgde de genezing binnen vier tot zes weken. Men geeft dezelve van vier tot vijf drop-pels in een verzachtend vocht, opklimmende tot 10, 15 en 20 droppels. Van grootere giften en langdurig gebruik behoort men zich te onthouden; want dit middel bederft de spijsvertering en oefent eenen schadelijken invloed uit op de geheele bewerk-tuiging.

Uit het plantenrijk zijn vele middelen tegen de *lepra* in gebruik gebragt, namelijk, de *sassaparilla* (de *lobelia syphilitica*, de *angelica* en de *cochlearia*, de laatste in de vooronderstelling, dat de Romeinen reeds in *Vriesland* en *Engeland* van dit middel zich zouden bediend hebben), de *rhus radicans*, de *cortex mezerei* en *ulmae campestris*. — In een door mij in de Jaarboeken van het Genootschap *Arti salutiferae*, 3de deel, 3de stuk, pag. 198 me-

Het gezwavelde *anthrakokali* werkt sneller dan het eenvoudige, doch verdient het laatste menigwerf de voorkeur, omdat eene langzame werking eene duurzame — eene schielijke slechts eene schijnbare genezing tot stand brengt.

Ondersteunt door eenen goeden leefregel volgt de genezing bij jonge lieden onder gunstige omstandigheden ongeveer binnen zes maanden. Bij lieden, tusschen de 40 en 60 jaren oud, binnen een tot twee jaren. Deze langzame genezingen pleiten niet zeer voor dit middel, en verwekken het vermoeden, dat hetzelfde, even als zoo vele andere, spoedig zal vergeeten worden.

medegedeeld geval van *lepra Græcorum*, volgde de volkomene genezing onder het gebruik van den olmenbast inwendig in afkookfel van 1—2 oncen op 12 oncen, terwijl een tweede, fterk uitgeperst afkookfel van dezelfde basten tot waschmiddel der lijdende deelen gebruikt werd.

Ook de komkommers en augurken, versch en met azijn ingemaakt, vindt men aangeraden; zoo ook de afkookfels der vruchten en bladen van deze planten.

Van de zwarte en witte nieswortel-tinctuur heeft WILLAN in niet lakferende giften met goed gevolg gebruik gemaakt.

De *dulc-amara* is, volgens CHRICHTON, alleen in staat, de *lepra* te genezen. Men geeft het afkookfel van ééne once op één pond vocht in giften van twee oncen driemaal daags, opklimmende tot dat er één pond daags gebruikt wordt; uitwendig bezigt men een afkookfel tot wasfching. Eerst na verloop van acht dagen bespeurt men eenige werking. Bij zwakke, teedere, aandoenlijke lijdens ontstaen fomwijlen hartkloppingen, misfelijkheid en duizelingen; door de giften te verminderen houden deze toevallen op; ook wordt dit middel beter verdragen, wanneer men tusfchen beiden eene aromatische tinctuur laat gebruiken. Van een getal van 23 zieken, werden op deze wijze 21 genezen.

Uitwendige middelen. Van het groote aantal der uitwendig tegen de *lepra* gebruikte middelen, verdienen het meest in aanmerking te komen: de wasfchingen met afkookfels van den olmbast en de dullebes-ranken; de kwikbereidingen, als het
ung.

ung. neapol., al of niet met *flores zinci* verbonden; de *sublimaat*-oplossingen, het *unguentum nitratis hydrargyri*, het *unguentum jodureti sulphuris*, XII—XV greinen op ééne once reuzel; de teerzalf, uit eene once teer en vier oncen reuzel (*pommade de Goudron*, L. FLEURY), waarmede de lijdende deelen des avonds worden ingewreven, en des morgens met warm zeepfop of met eene zwakke loog afgewaschen; inwendig geeft men gelijktijdig een afkookfel van de veldviool (*viola arvensis*) of limonade met zwavelzuur bereid. De korsten worden er door los, de huid smeedig en de jeukte laat na. De genezing volgt van twaalf tot honderd en negen dagen zonder schadelijke gevolgen. Somwijlen grijpt een ligt *erythema* plaats. Ook kan de teerzalf met kwikmiddelen en andere metaalbereidingen, naar gelang der omstandigheden, verbonden worden.

Het gebruik der baden maakt een zeer wezentlijk deel der behandeling uit, zoowel om de huid te zuiveren, als om den uitslag te genezen. Men beginne met warme waterbaden, waschingen, stovingen en dampbaden, wanneer de uitslag tot eene kleine uitgestrektheid beperkt is, of andere omstandigheden het gebruik der baden niet gedoogen. Daarna de natuurlijke of door kunst bereide zwavelbaden, de loog- en zeebaden, de laatste eerst behoorlijk verwarmd, later in de opene zee. Dezelve dienen eenige zomers achtereenvolgend herhaald te worden, om instortingen te verhoeden. Het water te *Bath* schijnt uitnemende krachten tegen de *lepra*

te bezitten; men laat het drinken en als bad gebruiken. Van 83 lijders, op die wijze behandeld, wil men 52 genezen en 24 verbeterd uit de behandeling hebben ontslagen.

Tot de verdere vroeger en later aangeradene uitwendige middelen behooren: de aluin, de zwavel, de salpeter, de ongebluschte kalk, het vitriool, enz.; de drekstoffen van muizen, geiten en vossen, de urine van menschen, beerengal, enz.; de *helleborus*, het *collophonium*, de bollen der witte leliën, *ajuin*, *bryonia-alba*, stinkende gouwe (*chelidonium* de *ranunkel* en *anemone*. Intusfchen heeft de ervaring geleerd, dat geen dezer middelen de *lepra* in alle gevallen vermag te genezen. De fcherpste der genoemde en andere brand- en bijtmiddelen, noch de Spaanfche-vliegenpleisters, die vernielend op de huid werken, brengen de genezing in alle tijdperken tot stand; zelfs zag men na de fchijnbare, op die wijze bewerkte genezing, op de door de bijt- en brandmiddelen verwoeste huiddeelen, den uitflag op nieuw uitbotten en zijn gewoon beloop volgen.

Door reinheid, eenen goeden leefregel en doelmattige verpleging, met geduld en volharding in het werk gefield, draagt men, naar mijne overtuiging, het meest bij om de *lepra* te genezen. Zelfs komt het mij waarfchijnlijk voor, dat de meeste genezingen aan de natuur en de omftandigheden, die derzelve pogingen begunftigen, en niet aan de gebruikte geneesmiddelen zijn toe te fchrijven.

b.) *Psoriasis*, *psora*, *scabies sicca*, *psora leprosa*. — *Dartre écailleuse*, *squameuse*, *lichénoïde*, *dartre squameuse sèche* (RAYER).

Droog kraauwfel, droog schubachtig
huidmos, drooge schurft.

Met naauwkeurigheid te bepalen, welke ziekten Naam.
de onderscheidene geneeskundige schrijvers, vooral die der oudheid, bedoelden met de verschillende benamingen aan schubachtige huidziekten gegeven, blijft een onoplosbaar vraagstuk. Dezelfde verwarring en onzekerheid, waarover men zich bij de meeste slepende huidziekten te beklagen heeft, heerscht ook ten deze. *Psora* wordt door de oude schrijvers veelal de *scabies* genoemd, maar tevens ook de drooge schubachtige huidziekten (*scabies sicca*) en de natrovige (*impetigo*). Het is buiten twijfel, dat eene wijziging van de melaatschheid der Joden tot de *Psoriasis*, in haren hoogsten trap van ontwikkeling, behoord heeft. R. WILLAN bestempelde met den naam *Psoriasis* eene soort der schubachtige huidziekten, en beschreef dezelve onder dien naam; — de latere schrijvers volgden algemeen dit voorbeeld. SAMUEL PLUMBE daarentegen wil de *Psoriasis* van de *lepra* niet onderscheiden, maar beide ziekte als eene en dezelfde ziekte beschouwd hebben.

Eene slepende ontsteking der huid, met ligt Bepaling.
verhevene, in haar middelpunt niet ingedrukte, ruwe, gekorvene vlekken, onregelmatig van gedaante en van verschillende grootte, tot een enkel deel des ligchaams beperkt of over eene grootere oppervlakte verbreid, zelden de geheele oppervlakte des
lig-

ligchaams gelijkmatig bedekkende. Dunne, witte, schilferende schubben, die aan de randen los zijn en in haar middelpunt vast zitten, worden spoedig op de vlekken ontwikkeld. Zij blijven van elkander afgezonderd staan of vloeijen tot groote vlekken in een, met onregelmatig gevormde en weinig boven de gezonde huid verhevene randen.

Naar aanleiding der verschillende vormen, waarin de *Psoriasis* voorkomt, heeft men onderscheidene soorten, grootendeels door R. WILLAN vastgesteld, aangenomen; waarbij de gedaante des uitlags, zijne uitgebreidheid, duur en de deelen, welke aange- tast worden, tot onderscheidings-kenmerken zijn gebezigd.

A.) Algemeene op alle deelen des ligchaams
voorkomende *Psoriasis*.

- 1.) *Psoriasis guttata*. Het drupvormige drooge kraauwfel.
- 2.) ——— *diffusa*. Het uitgebreide, afspattende drooge kraauwfel.
- 3.) ——— *inveterata*. Het verouderde drooge kraauwfel.
- 4.) ——— *gyrata*. Het gekronkelde slangvormige drooge kraauwfel.

B.) De plaatselijke *Psoriasis*.

- 1.) *Psoriasis pistoria*. Het drooge kraauwfel der bakkers.
- 2.) ——— *lotorum*. Het drooge kraauwfel der bleekers.

3.) *Pso-*

- 3.) *Psoriasis palmaria*. Het drooge kraauwfel der handpalmen.
- 4.) ——— *labiorum*. Het drooge kraauwfel der lippen.
- 5.) ——— *genitalium*. Het drooge kraauwfel der teeldeelen.
- 6.) ——— *ophthalmica*. Het drooge kraauwfel der oogleden.
- 7.) ——— *infantilis*. Het drooge kraauwfel der kinderen.

A. Algemeene *Psoriasis*.

1. *Psoriasis guttata*. Het drupvormige drooge kraauwfel.

Kleine, afgezonderd staande vlekken, met dunne Bepaling. schubvormige plaatjes van onregelmatige gedaante, niet ongelijk aan een' druppel zoutoplossing op de huid gestort en gekristalliseerd, van de grootte van een hennipzaadje tot die van een dubbeltje, zelden tot die van een' gulden, omgeven door eenen weinig of niet verheven' en ligt ontstoken rand.

De eerst opkomende, eenigzins roode vlekken, Beloop. verheffen zich weinig boven de huid, missen de kringen en eironde gedaante der *lepra*, en hare hoekige, gekartelde randjes spatten met onregelmatige verlengfels. Tusschen de vlekken blijft de huid gezond; zij nemen gedurende eenige dagen in omtrek toe, en bedekken zich allengskens met dunne schilferende schubben, die door wrijven en waschen lichtelijk weggenomen kunnen worden. De ontbloote vlekken zijn rood, glinsterend, gekorven,

ven, fomwijlen kleverig en vochtig. De *psoriasis guttata* tast zonder onderscheid van jaren, leefwijze, landstreek en andere betrekkingen aan, doch menigvuldiger na, dan voor den twintigjarigen leeftijd, en meer mannen dan vrouwen. De nek, de buitenzijde der ledematen, de borst en de lenden zijn de deelen, welke zij bij voorkeur inneemt. Op deze volgen het aangezicht en het hoofd, het zij alleen tot een of meer dezer deelen bepaald, of, doch zelden, over al die deelen gelijkmatig uitgebreid. De eerste uitbotting komt gewoonlijk op de buitenzijde der ledematen of in het aangezicht te voorschijn, en breidt zich allengs over andere deelen uit, meerendeels voorafgegaan door pijnen in het hoofd, de maag en de ledematen. Bij kinderen grijpt fomwijlen plotseling eene algemeene uitbotting plaats; binnen weinige dagen wordt de geheele oppervlakte des ligchaams met vlekken overdekt, gepaard met stoornissen in de verrigtingen der buksingewanden en met een algemeen kwaalijk bevinden. De *psoriasis guttata* gaat dan eens met geringe, dan weder met hevige jeukte gepaard; verdwijnt in den zomer, en kan in dit seizoen door gepaste uitwendige middelen ligt verdreven worden; in den herfst en de lente komt zij terug om andermaal te verdwijnen. Deze wisselingen kunnen jaren lang voortduren; fomwijlen springt zij één jaar over, om met eenen veel heviger aanval terug te keeren. De genezing begint in het middelpunt der vlekken, en gaat van daar naar de randen voort. Men kan dezelve verwachten: wanneer de schubben ge-

gelijktijdig verdroogen, los worden, en afgeval-
 zijnde, steeds door dunnere en kleinere gevolgd
 worden; wanneer de vlekken glinsteren en zich
 als bepoederd voordoen. Allengskens bekomen de
 vlekken eene donkerroode blaauwachtige kleur. Er
 verloopen nog eenige maanden alvorens de huid
 hare natuurlijke kleur en gedaante terug erlangt.

2. *Psoriasis diffusa*. Het uitgebreide of spat-
 tende drooge kraauwfel.

Grootere spattende vlekken van eene onregelma- Bepaling.
 tige gedaante, ruw op hare oppervlakte, door
 vele verhevene lijnen en voren van ééne tot twee
 lijnen diepte, in eene menigte kleine vakjes ver-
 deeld, en met dunne schilferende schubben bedekt.

De ontwikkeling dezer ziekte begint gemeenlijk Beloop.
 met eene menigte kleine, ruwe, peukelachtig ver-
 hevene vlekjes, beter door het gevoel dan door het
 gezigt waar te nemen. Binnen een kort tijdsver-
 loop bedekken zich de vlekken met dunne schubben
 met witte loslatende randen en een donkerkleurig
 vastzittend middelpunt. Door uitbreiding der vlek-
 ken wordt de opperhuid in derzelfver omtrek al-
 lengskens ruw, en scheurt; later vertoont zij zich
 rood, verheven en gerimpeld. De natuurlijke lijnen
 der huid veranderen in diepe kloven, binnen welke
 dunne, meermalen affschilferende schubben ontwik-
 keld worden. Somwijlen wordt een grootere om-
 trek der huid, zonder dat andere aandoeningen
 vooraf gingen, droog, ruw, rood, en scheurt
 zich

zich met schubben overdekkende. Meerendeels zijn de vlekken onbepaald van gedaante en omtrek, klein als bij de *psoriasis guttata*, of grooter tot den omtrek eener handpalm. De zich steeds uitbreidende vlekken vloeijen ten laatste in elkander en bedekken gelijkmatig het geheel der lijdende deelen. Het menigvuldigst ziet men dezen uitslag op de wangen, de kin, de bovenste oogleden, de wenkbrauwen, de slapen, het uitwendig oor, den nek, de buitenzijde der voorarmen, en de meest vleeschige deelen der onderste ledematen. De rug der handen en der vingers zijn somwijlen geheel met losse, zamenhangende schubben bedekt. Zeer zelden vestigt zich deze ziekte op het behaarde deel des hoofds; maar waar zulks plaats vindt, worden, volgens RAYER, de haarwortelen somwijlen aangedaan, en de haren vallen uit. De nagels worden wanstaltig, splejten en bladderen oppervlakkig af. Zelden is en blijft de uitslag tot een deel bepaald; meermalen breidt hij zich achterevolgens over alle deelen uit, in dier voege, dat hij op het eene deel op nieuw uitbot, wanneer hij op een ander verdwijnt, tot dat hij ten laatste tot die deelen terug keert, welke hij het eerst verliet.

De *psoriasis diffusa* gaat met hitte en zeer lastig jeuken, vooral des nachts in het bed en bij hitte, gepaard. De kloven en scheuren der huid, de meest kenschetsende teekenen dezer ziekte, zijn zeer pijnlijk, en ontlasten eene witachtige, spoedig verdroogende wei. Wanneer men de schubben door waschen en smeren met vette zelfstandigheden weg-

wegneemt, dan vindt men de oppervlakte der vlekken week en glinsterend, met diepe voren gegroefd, die zich het eerst weder met zeer fijne, meelachtige schubbetjes bedekken. Wordt eenig deel met geweld van de nog vastzittende schubben ontdaan, dan ontlast zich eene dunne bloedige wei, die het linnengoed door opdrooging stijf maakt, en vlekken in hetzelfde terug laat. Neemt de ziekte eenen gunstigen keer, dan verliest de huid hare ruwheid; in het middelpunt der vlekken verdwijnen de schubben; de eersten worden bleek, zijn minder boven de huid verheven, de kloven en scheuren minder diep, en er vormt zich eene nieuwe opperhuid; eerst rood, droog en gerimpeld, om na verloop van eenige weken tot haren natuurlijken toestand terug te keeren.

De uitbotting der *Psoriasis diffusa* wordt door hoofdpijn, bedorvene spijsvertering, drukking en pijn in de maagstreek, misfelijkheid, koude en kramp in de ledematen, gevoel van zwakte en afgematheid, koorts en ontsteking voorafgegaan en vergezeld. Gedurende het beloop dezer ziekte nemen deze toevallen af, of houden geheel op; maar keeren telkens terug, zoo menigmaal nieuwe uitbottingen plaats grijpen.

De *Psoriasis diffusa* behoort tot de langdurigste en hardnekkigste ziekten. Zeer zelden komt zij met ééne uitbotting regelmatig ten einde, maar keert jaren achtervolgend, somwijlen gedurende het geheele leven terug, zamengesteld uit eene reeks van aanvallen, over jaren verdeeld. Iedere

aanval duurt zelden korter dan twee tot drie maanden; ook gebeurt het, dat dezelve zoo spoedig op elkander volgen, dat er meer remissie dan intermissie plaats heeft, en aan de huid de noodige tijd ontbreekt, om haar natuurlijk weeffel te herstellen. — Het behoort tot de afwijkingen, als de uitslag steeds tot een en hetzelfde huiddeel bepaald blijft, en altijd tot dezelfde plaats terug keert.

3. *Psoriasis inveterata, Psoriasis agria.*

Het verouderde drooge kraauwfel.

Bepaling. De geheele oppervlakte des ligchaams is met schubben bedekt; de huid is droog, ruw, verdikt, en veelvoudig door kloven en scheuren doorneden.

Beloop. In den vorm der *Psoriasis guttata* of *diffusa* komen eerst eenige vlekken op de ledematen te voorschijn, die door telkens plaatsgrijpende uitbotting zeer talrijk worden, zich uitbreiden, ineenvloeijen en de geheele oppervlakte des ligchaams overdekken. De roode, drooge, in haar weeffel ontaarde huid kan moeilijk of in het geheel niet in plooijen worden opgenomen, zij bemoeijelikt de beweging der gewrichten, en scheurt op de plaatsen, waar zij gespannen of uitgerekt wordt. De ontwikkeling en het afruijen der schubben heeft zoo spoedig plaats, dat men dezelve in het bed, dat de lijder beslaapt, vindt opgehoopt; bij dag overdekken ze zijne kleederen en kan men

ze

ze in menigte opvegen daar, waar hij gezeten heeft (*).

De *Psoriasis inveterata*, wegens hare hardnekkigheid en langen duur met dezen naam belegd, is dikwijls, maar niet altijd, eene aangeërfde ziekte; want zij ontwikkelt zich ook uit de andere voorafgegane wijzigingen der *Psoriasis*, of oorspronkelijk uit de eigene dyscrafie, waarmede zij in alle gevallen verbonden is. Zij gaat met hevige jeukte en pijnen gepaard, en verwekt al die onttaardingcn der huid, haren en nagels, doch in een' hooger en trap, welke bij de *Psoriasis diffusa* voorkomen.

Op den onderbuik is de huid zeer rood, diep gekorven en droog. De half doorschijnende witte schubben vallen met groote lappen af. Door de drukking der kleedingstukken, het schuren om de jeukte te matigen, en de wrijving van elkander aanrakende deelen aan den balzak, tusschen de billen, in de liezen, enz., ontstaan hoogst pijnlijke ontvellingen.

In de latere tijdperken dezer ziekte, als zij haren hoogsten trap bereikt heeft, wordt de opperhuid

(*) Hiermede schijnt overeen te komen de *Prurigo*, ruidigheid of kraauwte der Joden, van welke gezegd wordt: deze schurft wordt dus genoemd wegens hare brandende hitte en de droogte der schubben, veel gelijkende naar het aardrijk, dat door de hitte der zon gekorven of gespleten is.

huid in wijd uitgestrekte plekken vernield, en het weeffel der huid diep verwoest, zoodat al de ledematen, de rug, de billen, enz. gelijktijdig ontveld zijn, en er uitzien of ze gevild waren. Eene groote hoeveelheid kwalijk riekend, naar etter gelijkend vocht, wordt afgescheiden (*). Opdroogende vormt zich eene zekere drooge, ruwe, celtachtige opperhuid, die schubsgewijs afvalt, en op dezelfde manier op nieuw gevormd wordt. Onder afwisselende verbetering en verslimmering duurt deze ziekte vaak het geheele leven voort; eenige lijders bereiken daarmede eenen hoogen ouderdom; andere bezwijken in den bloei hunner jaren door waterzucht, uittering of andere ziekten der ingewanden. Bij HENSLER vindt men eene belangrijke hiertoe behoorende waarneming. In een mij voorgekomen geval, stierf een meisje van in de twintig jaren oud, door de *Psoriasis inveterata* in den hoogsten graad aangetast, na een onbeschrijfelijk lijden door uitputting der krachten en etteraffcheiding in de luchtpijp en longen.

De verbeteringen, welke in het beloop der *Psoriasis inveterata* voorkomen, misleiden menig-

WEIN

(*) In deze gedaante komt zij overeen met de ziekte, waardoor MIRJAM, de zuster van den Hoogepriester AÄRON was aangetast, voor welke hij bidt: »Ach, Heer! laat haar toch niet gelijk zijn een doode, van wiens vleesch, als hij uit zijns moeder ligchaam uitgaat, de helst wel verteerd is.»

werf met de ſchijnbaar tot ſtand gebragte genezing; want in het eerſtvolgende voor- of najaar komt de ziekte met vernieuwde kracht terug, ſtelt den lijder te leur, en beſchaamt den geneesheer in den lof aan eenig geneesmiddel toegewaaid, wegens de genezing, die hij meende daarmede tot ſtand gebragt te hebben.

Jonge lieden worden zeldzamer dan bejaarde, de meeste in den middelbaren leeftijd aangetast. Met den toenemenden ouderdom verbetert menigwerf de algemeene gezondheidstoestand, zoowel als de uitſlag. Het leven wordt voor den lijder minder onaangenaam, en hij verliest allengs zijn afzigtelijk en walgelijk voorkomen.

4. *Psoriasis gyrata. Tyriasis. Ophiasis.*

Tyria. Serpigo. Het gekronkelde, ſlangvormige, drooge kraauwſel.

Deze thans zeer zelden voorkomende huidziekte (BIËTT zag haar ſlechts vier of vijf maal onder een groot getal van huidziekten) was aan de oude geneeskundigen onder verſchillende benamingen, afgeleid van de gedaante des uitſlags bekend, en werd door hen als eene wijziging der *Elephantiasis* beſchouwd.

Bepaling en
beloop.

Bandvormige ſtrepen van een tot twee vingeren breed, ſlingeren zich in verſchillende rigting en uitbreiding over onderſcheidene deelen heen. Zij zijn regtlĳnig, kringvormig, ſlangsgewijs, regelmatig of onregelmatig gevormd, weinig boven de huid verheven, hebben eene donkerroode of

bruinachtige kleur, door dwars loopende lijnen, als de bloedzuigers en regenwormen, gekorven, en meerendeels met fijne schilferende schubbetjes bepoederd. Deze kleine, dunne schubben gaan nimmer in dikke platen of korsten over. Merkwaardig zegt R. WILLAN is de gelijkmatige verdeling dezer bandvormige strepen. „Ik heb gezien, dat zich een groote kringvormige flinger op beide zijden der borst boven de tepels bevond; twee of drie andere zag men lager op beide de zijden der borst, slangvormig gekronkeld, regt tegenover elkander. De rug is somwijlen bont gevlekt of getijgerd, doordien de strepen op beide zijden gelijkmatig van gedaante en rigting der kronkelingen hier en daar elkan- der aanraken en ineenvloeijen.” De rug, de ledematen, de hals en het onderste gedeelte des aangezigts zijn de gewone zitplaatsen dezer ziekte; echter kunnen ook alle andere deelen er door aangetast worden. Volgens BLÉTT tast deze ziekte bij voorkeur jonge, blonde voorwerpen aan, die eene teedere, weeke en bleeke huid hebben. In het eenige voorbeeld, dat ik van deze ziekte gezien heb, was de lijder een man van ongeveer vijftig jaren, met zwart haar en van een grof, vast huidweeffel. De *Psoriasis gyrata* volgt hetzelfde beloop als de *diffusa*, verdwijnt, keert weder, is langdurig en moeilijk te genezen. Somwijlen gaat zij met eene andere huidziekte gepaard, in dier voege, dat het deel, waarop zich de eene huidziekte genesteld heeft, van de andere verschoond blijft.

B. De

B. De plaatselijke *Psoriasis*.1. *Psoriasis pistoria*. Het drooge kraauwfel der bakkers.

Deze plaatselijke *psoriasis* heeft de gedaante der *diffusa*, somwijlen ook die der *guttata*. Zij blijft steeds tot den rug van eene of beide de handen bepaald, en komt het menigvuldigst bij bakkers voor, van waar zij dan ook haren naam bekomen heeft. Zij schijnt met het beroep dier lieden in een wezentlijk verband te staan, daar men dezelve zoo wel in *Engeland*, als *Frankrijk*, *Duitschland* en ook bij ons bijna uitsluitend bij de bakkers waarneemt. Het verdient intusschen opmerking, dat deze ziekte geneest, zonder dat de lijdens noodig hebben van beroep te veranderen; dat zij niet aan de leerjaren, maar aan den meer gevorderden ouderdom eigen is, en dat er bij dezelve, schoon de herstelden hun beroep voortzetten, voor zoo verre mijne ervaring reikt, hoogst zelden, bijna nimmer recidiven plaats grijpen. Behalve bij de bakkers, ziet men haar ook enkele malen, doch gewijzigd, bij andere lieden: zij wordt alsdan gewoonlijk voor een uitwerkfel van galachtige ophooping in de eerste wegen beschouwd, en in de volkstaal gal genoemd.

Met eenige kleine, ligt verhevene vlekken, met witte schilfertjes bezet, die spoedig ineenvloeijen, en den rug der handen en vingers met schubben overdekken, begint en verloopt de *psoriasis pistoria*.

De huid verandert meer en meer van weeffel ; waar de fchubben worden weggenomen , is zij rood , glad , met eene menigte kloven doortrokken , die eenigzins vochtig zijn. De nagels deelen in dit lijden , ontaarden , fchilferen en vallen af , om door andere niet minder ziekelijk gevormde vervangen te worden (*psoriasis unguum*) fomwijlen blijft deze alleen tot de vingertoppen en de nagels bepaald , terwijl alle andere deelen vrij zijn. De duur der *psoriasis pistoria* loopt van drie tot zes maanden , of zij volgt het beloop der *psoriasis diffusa* , verdwijnt in den zomer en winter , om in het voor en najaar weder te keeren ; ook gebeurt het , dat zij in de *psoriasis inveterata* overgaat en levenslang voortduurt. Ik ken eenen heelmeeſter , thans 73 jaren oud , die van zijne jeugd af aan op den rug van beide de handen aan deze ziekte lijdt. Bijna jaarlijks , en wel in het voor en najaar , fomwijlen ook in het heetſte van den zomer , keert de uitſlag , zonder belangrijke veranderingen ondergaan te hebben , terug. De gezondheid des lijders ſchijnt minder voldoende te zijn , wanneer de uitſlag achterwege blijft.

2. *Psoriasis lotorum*. Het drooge kraauwſel der bleekers.

Niet zelden ziet men op de handen , de armen , in het aangezicht en den nek , meermalen bij vrouwen dan bij mannen , eene plaatſelijke *psoriasis* , die het beloop der *guttata* of *diffusa* volgt. Bij den eigenent aanleg dezer ziekte , opgewekt door de werkzaam-

he-

heden tot het beroep der bleekers en der waschvrouwen behoorende, ontstaat deze ziekte; want door verandering van beroep komt de genezing allengs, zonder het gebruik van hulpmiddelen, tot stand, terwijl de ziekte, zoo lang de lijders hun beroep blijven uitoefenen, niet genezen wordt.

Psoriasis palmaria. Het drooge kraauwfel der handpalmen.

Eene zeer hardnekkige plaatselijke wijziging der *psoriasis diffusa*, tot de handpalmen bepaald, zelden deze grenzen overschrijdend. Zij begint met eene enkele vlek aan de muis van den duim, en breidt zich van daar met hoekig voortlopende randen over de geheele handpalm uit; somwijlen ook over de binnenste oppervlakte der vingers en der voorhand. Waar de schubben loslaten, is de huid ruw en vochtig; de handen zien er uit, alsof zij vuil waren door verzuim van de noodige reiniging door waschen. De voren en kloven zijn diep, vooral op die plaatsen, waar, bij het holmaken der hand, plooijen ontstaan; zij zijn zeer pijnlijk en ligt bloedend, bijzonder bij die bewegingen der handen en vingers, waarbij eenige krachtinspanning wordt gevorderd. Zij volgt het beloop der *psoriasis diffusa*; haar duur is niet te bepalen. Schoonmaaksters, koper- en blikslagers, zilverfmeden en andere werklieden, die metalen bearbeiten, worden er bij voorkeur door aangetast; in het algemeen meer vrouwen dan mannen: iets, waarvan het weekere huidweeffel der eersten wel de oorzaak zijn mag.

R. WILLAN zag dezelve bij vrouwen gedurende het kraambed; ook komt zij in verband met de jicht voor: beide ziekten wisselen alsdan met elkander af, en de eene vervangt de andere. Gelijktijdig met de handpalmen of bij afwisseling, worden somwijlen ook de voetzolen aangetast; beloop en toevallen zijn dezelfde. In dit laatste geval, gaat de *psoriasis* met voetzweet gepaard, wordt als een gevolg van dit gebrek beschouwd, en niet erkend voor datgene, wat zij wezentlijk is.

4. *Psoriasis labiorum*. Het drooge kraauw-
fel der lippen.

Deze plaatselijke, enkel en alleen tot de lippen beperkte *psoriasis*, die RAYER tot de *pityriasis* wil geteld hebben, kenschetst zich door dunne bruinachtige schubben, met talrijke regtstandige scheuren en kloven. De schubben zijn groot, aan de randen los, in haar middelpunt vastgehecht; een bruinkleurige, ligt schilferende rand omgeeft de lijdende deelen ter breedte van eenige lijnen. De onderste lip wordt meermalen en sterker dan de bovenste aangedaan; de bruine kring is derhalve rondom de eerste gewoonlijk het duidelijkste aanwezig. De afvallende schubben ontblooten eene teedere opperhuid, die spoedig uitdroogt en binnen weinige uren scheurt en afschilfert, om door eene andere vervangen te worden, waarmede telkens hetzelfde plaats vindt. Lieden met dikke, opgeworpene lippen worden er bij voorkeur door aangetast. Van de eenvoudig springende lippen, door koude en oostelijke winden veroorzaakt, onderscheidt zich de

psoriasis labiorum door haar langdurig beloop, de talrijke afschilferingen, de diepe kloven en den bruinen rand, die de lippen omgeeft zonder dat er venerische aandoeningen voorafgingen of aanwezig zijn. De duur der *psoriasis labiorum* is onbepaald, gewoonlijk zeer lang, somwijlen jaren, getrouw aan het geslacht, waartoe zij behoort, met afwisselende verbetering en verslimmering, gelijk mij onderscheidene gevallen bekend zijn. Zacht, goed weder oefent eenen gunstigen, koud en bar weder eenen ongunstigen invloed op deze ziekte uit.

5. *Psoriasis genitalium*. Het drooge kraauw-
fel der teeldeelen.

Bij mannen zijn de voorhuid en de balzak, het zij ieder dezer deelen alleen of gelijktijdig, — bij vrouwen de groote lippen menigwerf de zetel eener plaatselijke *psoriasis*, verbonden met de algemeene soorten dezer ziekte, of alleen op zich zelve beflaande. Het drooge kraauwfel der voorhuid (*psoriasis praeputialis*) kenfchetst zich door in de lengte loopende, talrijke diepe kloven, eenen bruinachtigen rand, die gelijk bij de *psoriasis labiorum* de voorhuid omgeeft. Het lijdende deel is pijnlijk gezwollen, met dunne, schilferende schubben bedekt, en ligt bloedend, zoo dikwijls er pogingen gedaan worden om de voorhuid terug te trekken, ten einde het roedehoofd te ontblooten. Menigmaal is er *phymosis* aanwezig, die den bijslaap moeilijk of ondoenlijk maakt, en alleen door de befniydenis kan verholpen worden.

Bij de *psoriasis scrotalis*, het drooge kraauwfel
van

van den balzak, is dit deel ruw, met dunne schubben bedekt, gepaard met jeukte, spanning en roodheid; later wordt het huidweefsel dieper aangedaan; de huid verdikt, is hard en bar; pijnlijke kloven en ontvellingen komen te voorschijn, die moeilijk genezen. De kloven en ontvellingen geven een kleverig vocht van zich, dat spoedig opdroogt. Wanneer deze vochten etterachtig worden, zegt PLUMBE, dan heeft de ziekelijke reactie opgehouden en de genezing is begonnen. Wanneer zich de *psoriasis diffusa* over den balzak uitbreidt, dan levert dezelve geene belangrijke bijzonderheden op, maar volgt in alles het beloop aan die ziekte eigen. De zuiver plaatselijke, daarentegen, geeft menigwerf aanleiding tot de ontwikkeling van knobbelachtige huidontaarding, die ligtelijk met de venerische knobbels aan den balzak voorkomende, kan verwisseld worden. Ik heb thans nog eenen lijder onder behandeling, bij wien slechts twee *psoriasis* vlekken, de grootste van omtrek eener doorgesneden hazelnoot, de andere kleiner, aanwezig zijn, die reeds zes maanden geduurd en aan vele ter genezing aangewende pogingen tegenstand geboden hebben. De geheele balzak is met een groot getal kleine beursgezweiletjes tot de grootte van eene erwt bezaaid; zij zijn boven de huid verheven, en zoo dun van huid, dat de witte papachtige, daarin bevatte stof doorschijnt.

Het drooge kraauwfel der groote lippen (*psoriasis labiorum majorum*) komt zeer zelden voor. Het heeft de gedaante der *guttata* of *diffusa* en volgt

volgt haar gewoon beloop. Het gaat veelal met witten vloed, vermeerderde uitwaseming in de liezen en pijnlijke ontvellingen door wrijving der deelen tegen elkander, gepaard. De vergezellende jeukte maakt deze ziekte zeer lastig; zij is langdurig en moeilijk te genezen.

Bij de onderscheidene wijzigingen der *psoriasis genitalium* is het belangrijk, dat men dezelve niet voor venerisch beschouwe of met venerische aandoeningen verwisfele.

6. *Psoriasis ophthalmica*. Het drooge kraauwfel der oogen.

Dit komt alleen op de deelen voor, welke het uitwendig oog zamenstellen, of gaat gepaard met schubachtige vlekken in het aangezicht. De randen der oogleden en de buitenste oppervlakte van het bovenste ooglid, hebben het meest van dezen uitslag te lijden. Somwijlen wordt het bindvlies mede aangedaan en ontstoken. Na eene ligte spanning en moeilijkheid in de beweging, beginnen de oogleden sterk te jeuken, en worden spoedig met dunne, witte, drooge schubbetjes bedekt, die veelvuldig affschilferen. De huid houdt hare natuurlijke gedaante en kleur. Zoowel hierdoor, als door den korteren duur, die zelden langer dan zes weken bedraagt, en door den niet plaats vindenden terugkeer des uitlags, onderscheidt zich deze schilfering van de *psoriasis*, en schijnt door RAYER met regt tot de *pityriasis* gebragt te worden.

7. *Pso-*

7. *Psoriasis infantilis*. Het drooge kraauw-
sel der kinderen.

Onder deze benaming beschrijft WILLAN eene wijziging der *Psoriasis diffusa*, die somwijlen bij kinderen van twee tot drie jaren, ook wel bij jongere voorwerpen gezien wordt. De vlekken hebben eene onregelmatige gedaante, verschillen in uitgebreidheid en komen meerendeels op de wangen, de kin, de borst, den rug, de dijen en de billen te voorschijn. De vlekken zijn ruw, ligt verheven, met groote en kleine schubben bedekt, die menigwerf in zamenhangende lappen van de grootte eener handpalm los worden en afvallen. De ontbloote plekken zijn zonder opperhuid, hier en daar met kloven en scheuren, maar worden spoedig weder met nieuwe schubben bedekt.

Bij al de wijzigingen, waarin de plaatselijke *Psoriasis* voorkomt, ontbreken de algemeene ziekteverschijnselen, of zijn onduidelijk ontwikkeld, zoodat de lijders schijnbaar eene goede gezondheid genieten; maar deze wordt gestoord, wanneer de uitslag spoedig verdwijnt, of de lijders door andere ziekten worden aangetast. Ontstekingen der vlekken, door toevallige oorzaken verwekt, geven aanleiding tot veretteringen; er komen hier en daar etterpuisten te voorschijn, die aanleiding kunnen geven, dat de ziekte miskend en met andere verwisfeld wordt.

Tusschen de volkomen ontwikkelde vlekken der *Psoriasis* komen wel eens gladde, glinsterende ver-

verhevenheden met platte punten te voorschijn, die eene ronde of eironde gedaante hebben. De huid behoudt hare natuurlijke kleur of wordt bruinachtig. Eenige vlekken blijven langdurig onveranderd staan; andere worden met dunne schubbetjes gedeeltelijk bedekt. Het zijn onvolkomen ontwikkelde *Psoriasis*-vlekken, het zij wegens de geringere hevigheid der ziekte, hetzij dat aan de natuur de krachten ontbreken om dezelve tot volkomene rijpheid te brengen. Aan den anus en op de billen gaan dezelve menigwerf tot verettering over, en krijgen alsdan eene groote overeenkomst met de venerische knobbels: het scherpste oog is vaak niet toereikend, om de eene van de andere te onderscheiden. Alleen de alsdan niet voorafgegane venerische besmettingen kunnen tot wegwijzer verstrekken. Niet minder moeilijk is het, de *Psoriasis* der kinderen van de schubbighe vlekken te onderscheiden, welke onder de gevolgen der geërfde *secundaire syphilis* voorkomen. De leefwijze en gezondheidstoestand der ouders, de jeugd des lijders, de gelijktijdige aandoening der keel en der mondhoeken, alsmede de heesche stem bij de *secundaire syphilis*, die kort na de geboorte der kinderen zich doet hooren, stellen ons in staat juist te oordeelen.

De *Psoriasis* gaat steeds met eenen algemeenen Oorzaken, ziekte-toestand der bewerktuiging gepaard, voortvloeiende uit eene specifieke dyscrasie. Naar mate gene meer of min duidelijk is ontwikkeld, vertoont zij zich als aanleg van deze ziekte. Gewoonlijk noemt

noemt men als oorzaken de gemengde temperamenten, vooral het sanguinisch-melancholische; traagheid in de verrigtingen van het bloedaderlijke vaatstelsel en der afscheidingen; eene aandoenlijke huid, die door geringe oorzaken in hare verrigtingen wordt gestoord; de leeftijd tusfchen de twintig en veertig jaren, en, volgens WILLAN, het vrouwelijk geflacht, het kraambed en de bleekzucht, welke laafte echter met de waarnemingen van anderen, noch met de mijnen overeenftemt. Ook vond WILLAN bevestigd, wat GALENUS beweert, namelijk, dat de *Psoriasis* met jicht en rheumatismus verbonden voorkomt. Meer waarfchijnlijk komt het mij voor, dat de pijnen, welke meermalen bij *Psoriasis*-lijders voorkomen, tot het wezen dezer ziekte behooren, en door geene andere aandoeningen der bewerktuiging ontftaan. Intusfchen behoort de beflifing van dergelijke vraagftukken aan die geneesheeren te verblijven, welke door hunne plaatfing bij inrigtingen voor huidziekten over eenen grooteren fchat van ervaring kunnen befchikken, dan de geneesheer, die zijne kunst in den burgerftand uitoefent. Het zijn niet alleen de gewrichten en fpieren, maar ook het hoofd, de borst en de buik, benevens de daarin gelegene ingewanden, welke gedurende nieuwe opwellingen des uitflags door pijnen worden aangedaan.

Gelegenheid
gevende en
toevallige
oorzaken.

Ten aanzien van deze zijn wij niet verder gevorderd, dan bij de *lepra* en andere huidziekten. Gewoonlijk worden gerookt en gezouten vleesch en

en visch, varkensvleesch, versche zeevisch, schelpdieren, melk, zure wijnen, slecht bereide bieren, zure vruchten, koude baden in ongeschikte jaargetijden, koude dranken bij een verhit ligchaam, spijzen uit veelsoortige zelfstandigheden zamengesteld, zedelijke invloeden, enz., als oorzaken der *psoriasis* genoemd. Ook voorafgegane huidziekten, de *prurigo senilis*, de *lichen* en het *eczema impetiginodes*, schijnen bij de ontwikkelde voorgeschiedheid der *psoriasis*, als gelegenheid gevende oorzaken, in aanmerking te komen. Maar noch deze, noch gene alleen kunnen eene *psoriasis* voortbrengen, waar de aanleg voor deze ziekte niet aanwezig is; hoe groot toch zoude anders hier te lande het getal der *psoriasis*-lijders moeten zijn!

De invloed der jaargetijden op het verheffen en aflaten der *psoriasis* is kennelijk en onwederfprekelijk, maar volgt echter geene algemeene onveranderlijke regelen, noch is op alle voorkomende ziektegevallen toepasfelijk; want alhoewel de verheffingen in het voor- en najaar, het aflaten in den zomer en winter plaats vinden, komen dezelve toch ook in andere jaargetijden voor, en wel te dikwijls om als enkele uitzonderingen op den regel beschouwd te worden.

Dat behoeftige lieden, — zij, die met geringen kost gevoed worden, met zorg en kommer beladen zijn, en zwaren arbeid verrigten of voor den mensch schadelijke stoffen verwerken moeten, meer dan andere aangetast worden, is buiten twijfel, maar tevens is het ook waar, dat de hoogere,

in overvloed en weelde levende standen niet altijd verschoond blijven. Eenige ambachten en neringen begunstigen de ontwikkeling van deze en gene wijziging der *psoriasis*: bakkers, bleekers, waschvrouwen, enz., leveren daarvoor de noodige bewijzen op. In geen geval is de *psoriasis* besmettend; maar even als de *lepra*, doch zeldzaam, erfelijk.

Naaste oorzaak.

Gelijk bij de *lepra* en de meeste andere huidziekten, vindt men zich genoodzaakt, eene specifieke oorzaak of eigene dyscrasie aan te nemen, waardoor er in het geheel der organische verrichtingen wijzigingen ontstaan, welke de natuur bezigt om eene verhoogde en veranderde huidwerkdadigheid tot stand te brengen, met afscheiding en verwijdering dier stoffen, welke in de vochten gevonden worden, en het zij door hoeveelheid of door hoedanigheid schadelijk zijn. Invloeden, welke deze tot instandhouding van het leven noodige werkdadigheid der huid plotseling onderdrukken, geven aanleiding, dat de uitslag plotseling verdwijnt, en heete ontstekingsaardige of slepende ziekten der ingewanden geboren worden. Met het waargenomene door BIËTT, schijnt het gestelde overeen te komen; want ook deze schrijver zag de *psoriasis* met andere algemeene of plaatselijke ziekten der ingewanden afwisselen.

Onderscheidingsteekenen. Diagnostica.

De *psoriasis* kan alleen met de schubachtige huidziekten verwisseld worden. De hoekige gedaante der vlekken, de dunne schilfers met bruine stippen in haar middelpunt, de verhevenheid der vlek-

vlekken met platte randen, de kloven en scheuren, welke dezelve in alle rigtingen doorkruisen, de van tijd tot tijd verdwijnende en telkens wederkeerende uitslag, de hardnekkige langdurigheid, en de algemeene ziekelijke toestand, met den uitslag verbonden, of plaats grijpende als deze verdwijnt, — geven de noodige kenteekenen aan de hand, om verwisfelingen met andere huidziekten te verhoeden.

De afwezigheid van venerifche verschijnselen bij de *psoriasis*, en de bruine kleur der schilferende, kringronde vlekken der *syphilis*, laten beide ziekten gemakkelijk van elkander onderscheiden. Bij de *lepra* hebben de vlekken eene ronde gedaante; de schubben hoopen zich tot roofachtige korsten op, en zijn in haar middelpunt ingedrukt.

De *psoriasis* behoort, wegens de hardnekkigheid ^{Voorzegging.} en den langen duur derzelve, tot de zware ziekten. De tijd, dien de ziekte reeds geduurd heeft, de vorm der ziekte, de individuele gesteldheden der lijders, de betrekkingen, waarin zij leven, en de geëardheden der oorzaken leiden de voorzegging. De *psoriasis guttata* wordt doorgaans spoediger dan de *diffusa* genezen; de *inveterata* is de hardnekkigste van allen. Complicatiën met andere ziekten moeten volgens hare geëardheden beoordeeld worden.

Verdwijnt van zelve door opdrooging en afrij- ^{Uitgangen.} jing, waarna de huid hare natuurlijke geëardheid terug bekomt. De *guttata* en *diffusa* gaan in de *inveterata* over. Ziekten, die tusfchen het beloop der *psoriasis* invallen, doen haar verdwijnen, en

geven aanleiding tot verplaatfingen naar de ingewanden, die een doodelijk einde kunnen nemen. De genezing fchijnt meer het werk der natuur dan der kunst; maar er komen ook gevallen voor, die voor beiden onverwinbaar blijven. Voortdurende verflimmeringen met fteeds toenemende ontaardingen der algemeene bekleedfelen worden door ftoorniffen in alle verrigtingen gevolgd, die voortduren tot dat de dood een ellendig leven ten einde brengt.

Geneeskundige behandeling.

Wanneer de uitbotting der *psoriasis* plotfeling plaats vindt, en met koorts of algemeene ontftekingstoevallen gepaard gaat, dan beginne men de behandeling, naar gelang der toevallen, met een braakmiddel uit braakwortel, lakfeermiddelen met calomel, eene aderlating of bloedzuigers; daarna geve men de bloem van zwavel met antimonium, wijnsteen en magnesia, of de vaste loogzouten; wasfchingen met warme, verzachtende flijmachtige afkookfels, en warme baden; — men beperke den lijder tot eene ligtvoedende en fchrale diët, en verbiede alle onder de gelegenheid-gevende oorzaken genoemde fpijzen en dranken. Ligte gevallen, bij gunftige individuele gefteeldheid der lijders voorkomende, kunnen op deze wijze binnen den tijd van een tot twee maanden genezen worden.

In zware, reeds verouderde en verwaarloosde gevallen, wordt eene meer omflagtige geneeswijze gevorderd. Men beproeve alsdan de fpiesglasbereidingen in ruime giften, het *sulphuretum hydrargyri nigrum* (*aethiops antimonialis*) en *sulphuretum hydrargyri et flibii* (*aethiops mineralis*) de gewone

wone houtdranken, de afkookfels van den oimenbast, de *sasaparilla*, de *dulc-amara*, de drie-kleurige violen, de zwavelhoudende minerale wateren om te drinken en als baden, en tot inwrijvingen het kwik en de zwavelhoudende zalven. Ook het afkookfel van den *cortex radicis mezerei* vindt men aangeraden. Dit middel wordt gezegd de zonderlinge uitwerking te hebben, dat onder deszelfs gebruik de genezing aan de randen begint en naar het middelpunt voortgaat; terwijl in alle andere gevallen de genezing in het middelpunt der vlekken begint en naar de randen voortgaat. De *psoriasis inveterata* willen WILLAN en BATEMAN op dezelfde wijze als de *lepra vulgaris* en *alphas* behandeld hebben. De laatste verwerpt de vochtverbeterende en de kwikmiddelen in alle gevallen, en raadt tot het gebruik der anti-phlogistische lakseermiddelen, de gezwavelde loogzouten en het afkookfel van den koortsbast. Om de pijnen en de jeukte te lenigen, wordt de melk van bittere amandelen met *saccharum saturni* of *flores zinci* tot stovingen met vrucht gebruikt. S. PLUMBE bezigt in ligte gevallen de verzachtende en bedarende geneeswijze, ondersteund door warme baden en kwikbereidingen; in hardnekkige gevallen de arsenik-bereidingen met damp- en zwavelbaden. Ook BIËRT is van meening, dat de behandeling der *psoriasis* van die der *lepra* niet verschilt. In het *arsenicum* meent hij een zeker geneesmiddel gevonden te hebben. Een lijder, die sedert 15 jaren ziek was, genas bij het gebruik van dit

middel binnen 26 dagen. Hij geeft aan de Aziatische pillen de voorkeur boven de oplosfingen van FOWLER en PEARSON. Later wil hij zich met vrucht van de *arsenicæ ammoniæ* tegen de *psoriasis inveterata* bediend hebben. De nablijvende vlekken laat hij met eene zalf, uit vijftien greinen *protonitratis mercurii* op eene once reuzel inwrijven, in hardnekkige gevallen met *deuto-joduretum mercurii* bereid. Waar ook deze niet helpen mogten, maakt hij van de zalf van AUTENRIETH en spaansche-vliegenpleisters gebruik. JON. GREEN, die de arsenik-bereidingen de allervoortreffelijkste middelen tegen de *psoriasis* noemt, schijnt later tot inkeer te zijn gekomen; want de daarna door hem gevolgde behandeling, bestaat in aderlatingen, zacht lakferende dranken, de *liquor potassæ* met afkookfel der *sassaaparilla*, uitwendig weekmakende middelen, warme water- en dampbaden, en ten laatste zwaveldamp-berookingen.

De behandeling van RAYER bepaalt zich mede tot het gebruik van lakferende en verkoelende middelen, vochtverbeterende dranken, kwikbereidingen, algemeene plaatselijke en dropbaden. Van de arsenik-bereidingen heeft hij geene of slechts eene tijdelijke verbetering verkregen, en hij zegt er van: „dat die verbetering niet kan opwegen „tegen het gevaar, met het gebruik van dat „middel verbonden.”

Behalve de reeds genoemde, vindt men nog vele andere geneesmiddelen tegen de *psoriasis* aangeraden. In de eerste plaats verdient de *graphit*,
ver-

verbonden met bittere extracten , en uitwendig de zelf , met dat middel bereid , aanprijzing ; met gunstig gevolg heb ik mij meermalen van dit middel bediend. Volgens de ervaring van onderscheidene Geneesheeren is het *anthrakovali* van POLYA's een heilzaam middel tegen deze ziekte. Ook het middel der Indianen , door GUTHRIE bekend gemaakt , verdient beproefd te worden. Het is van deze samenstelling :

R. *Hydrargyri* dr. i
flor. sulphuris unc. β.
Succi expressi foliorum ocymi sancti unc. ii
Colophonii unc. β.
Boracis dr. i
Lactis caprae. dr. ii
Exactę miscis fiunt Boli magnit: nucis moschati.

S.

Tot gebruik worden een of meer dezer brokken in wijnazijn opgelost , om de lijdende deelen driemaal daags mede in te wrijven. Men laat het middel opdroogen , en voor de volkomene genezing niet afwaschen. De tinctuur der spaansche vliegen , van het *jodium* , de teerzalf , het *protojoduretum mercurii* , het *proto-* en *deuto-Bromuretum mercurii* , welke laatste ik echter niet geloof , dat eenige voorkeur boven de gewone kwikbereidingen verdienen , worden almede aangeraden.

De behandeling der plaatselijke *psoriasis* op dezelfde leest geschoeid als die der algemeene , vor-

dert wijzigingen, waarvan ik hier de voornaamste laat volgen.

De *psoriasis palmaria* en *pistoria* heb ik met *aethiops antimonialis*, *resina guajaci* en *extract. dulcamarae* inwendig, uitwendig eerst met verzachtende stovingen, daarna met *unguentum neapolitanum* en *flores zinci* in de handpalmen ingewreven, of de sublimaat oplosfingen tot wasfchingen, steeds met een tamelijk goed gevolg behandeld, zoodat de genezing meermalen binnen een tot twee maanden tot stand werd gebragt. In de plaats van het *unguent. neapolitanum* met *flores zinci*, kunnen ook de zalven met *proto-* en *deutoduretum mercurii* en het *joduretum sulphuris*, de loogbaden en een smeersel, uit *liquor potassae* unc. i *olei olivarum* unc. β *aquae rosarum* unc. ii gebruikt worden. In de hardnekkigste gevallen kan men de vlekken met *lapis infernalis* strijken, of den raad van R. W. HUL opvolgen en tweemaal in de week twintig elektrische schokken door de lijdende deelen laten gaan.

De *psoriasis labialis* vordert gewoonlijk het inwendige gebruik der kwik- en spiesglasbereidingen; uitwendig eene zalf uit olie en was met eene geringe hoeveelheid witte *praecipitaat*, spiauterbloemen of loodwit verbonden.

De *psoriasis ophthalmica* vordert bloedzuigers wanneer het bindvlies ontstoken is; stovingen met melk van bittere amandelen met eene kleine hoeveelheid *acetis plumbi*; later de gewone kwikbereidingen in smeersels of waschwaters.

De *psoriasis genitalium* behandelde men insgelijks met verkoelende lakseermiddelen en verzachtende stovingen, zoo lang tot dat de geprikkelde toestand der lijdende deelen genoegzaam gematigd is; daarna de zwavel-, kwik- en spiesglasbereidingen inwendig; uitwendig lood- en kwikzalven. Bij de *psoriasis scrotalis* berookingen met vermiljoen of zwavel.

De *psoriasis infantilis* vordert dezelfde behandeling, gewijzigd en toegediend naar aanleiding van den leeftijd en andere individuele gesteldheden der jeugdige lijdens.

Somwijlen ontstaan op de scheenen, ten gevolge der *psoriasis inveterata*, langdurige en ligt bloeddende zweren met gekartelde en uitgeknaagde randen, die hevig jeuken, en in plaats van etter eene kleine hoeveelheid kleverige wei afscheiden. De genezing is altijd moeilijk en zelden duurzaam; de geringste oorzaken doen de likteekens op nieuw openbreken. De behandeling is die der *psoriasis diffusa*, met opdroogende zalven plaatselijk.

Niettegenstaande het groote getal van geneesmiddelen tegen de *psoriasis* in gebruik gebragt, en den ophef, waarmede derzelver lof werd verkondigd, blijft dezelve toch veelmalen eene ongeneeslijke ziekte (*). De tot stand gebragte gene-

(*) Daar het meer dan waarschijnlijk is, dat de *psoriasis* tot de melaatschheid der Joden behoorde, zoo wil ik hier

nezingen laten het twijfelachtig, of men deze aan de natuur of aan de kunst moet dank wijten, en of de herstelling van eenen lijder, gedurende het gebruik van het eene of andere geneesmiddel, ook waarlijk aan dat middel mag toegeschreven worden. Want de intermissiën der *psoriasis*, die van tijd tot tijd plaats vinden, vertoonen eene genezing, die slechts schijnbaar en niet wezentlijk is. Gedurende deze, wordt de lijder, dien men waant hersteld te zijn, uit de behandeling ontslagen. Tot zijne betrekkingen terug gekeerd, wordt hij uit het oog verloren, en de plaatsgrijpende recidiven blijven onopgemerkt; te meer, daar het grootere deel dier lijdens, afgeschrikt door vruchteloze kuren, en de geneeskunst en de geneesheeren vlieden.

Ieder *psoriasis*-lijder geeft den geneesheer, die deze ziekte en haar beloop kent, de gelegenheid aan de hand, om een geliefkoosd geneesmiddel in naam te brengen, of zich zelven eenen naam te maken.

Se-

eene aanmerking maken, waaruit blijken moge, dat deze ziekte toen ter tijd even moeilijk of niet te genezen was, als thans. De Joden hielden de melaatschheid voor eene straffe Gods, die door geene menschenhulp noch geneesmiddelen kon worden opgeheven. Daar dezelve onmiddellijk van God kwam, zoo kon God alleen dezelve wegnemen of verzachten; weshalve deze ziekte den priesteren alleen was aanbevolen, welke offeranden vorderden en plegtigheden in het werk stelden,

Sedert vijf en twintig jaren behandel ik eenen lijder met *psoriasis inveterata*, die het geheele ligchaam overdekt. Gedurende dit groote tijdsverloop kwamen de schijn-genezingen meermalen tot stand, zoo wel bij het gebruik der spiesglas en kwikbereidingen, het *decoct. lignorum*, zwavel en spiesglas, olmenbast, aderlatingen, kina met minerale zuren; kwik- en teerzalven, kwikwasfchingen, afkookfels van den olmenbast, oplosfingen van borax, enz., als door nietsbeduidende en dwaze huismiddelen: onder anderen, het dragen van eene gedroogde tong aan eenen levenden vos uitgesneden — en dit middel heeft zich roem verworven! — Maar telkens keerde de ziekte in het voor- en najaar terug. Thans is deze lijder 57 jaren oud, gezond, sterk en goed gevoed; maar nog vinden van tijd tot tijd ligte opwellingen des uitflags plaats. Het was bijzonder opmerkenswaardig, hoe spoedig de wanstaltige nagels, de vogelklaauwvormige kromming der vingers en de diepe kloven en scheuren, gedurende de tijdelijke verbeteringen, herstelden; maar wederkeerig ook bij verslimmeringen tot hunnen eersten toestand terug keerden. — De genezing van dezen lijder, alhoewel nog niet volkomen, is gewis meer het werk der natuur dan der kunst.

C.

Pityriasis Porriga. J. P. FRANK. Zemeluitslag. Ruidigheid.

(*Dartre furfuracée volante*, *Ephelides hépatiques*, ALIBERTI).

Bepaling. Vlekken van onregelmatige gedaanten en verschillende grootte, uit vele kleine zamengesteld, algemeen over het geheele ligchaam verbreid of tot een enkel deel beperkt, door dunne, witte schubbetjes bedekt, die bij herhaling zemelachtig afruijen en weder ontwikkeld worden, nimmer tot roven en korsten op een pakken. Deze oppervlakkige aandoening der huid, met eene geringe slepende ontstekingsverbonden, dringt niet diep in het weeffsel der huid door, gaat met meer of minder jeukte en een kriebelend gevoel onder de huid gepaard, en is nimmer besmettend.

Verdeeling. Naar aanleiding van de deelen, waarop de *pityriasis* te voorschijn treedt, en de gedaanten, welke zij aanneemt, geeft zij tot de volgende rangschikking aanleiding, overeenstemmend met die van BATEMAN, GIBERT, GREEN en andere.

1. *Pityriasis capitis*. Zemeluitslag van het hoofd.
2. ——— *versicolor*. De met kleuren spelende zemeluitslag.
3. ——— *rubra*. De roode zemeluitslag.
4. ——— *nigra*. De zwarte zemeluitslag.

P. RAYER verdeelt de *pityriasis* in de algemeene, over het geheele ligchaam voorkomende, en in de plaatselijke, die zich slechts op enkele deelen vertoont. Tot de plaatselijke brengt hij onderscheidene huidaandoeningen, die door andere schrijvers, ook in dit werk, tot de plaatselijke *psoriasis* gebragt zijn. Hij verwerpt, even als BIËTT, de *pityriasis versicolor* en *nigra*. Beide schrijvers brengen deze wijzigingen tot de vlekken en huidverkleuring.

Ik moet hierbij aanmerken, dat de beschrijving, die RAYER van de *pityriasis* geeft, mij toefschijnt, meer op *eczema chronicum* en *psoriasis* te passen. Die van de plaatselijk op het hoofd voorkomende, geeft blijkbaar eene verwisfeling met de *porrigo favosa* en *furfuracea* te kennen. Strijdig met alle andere schrijvers over deze huidziekte, welke R. WILLAN tot voorman gekozen hebben, beschouwt RAYER de *pityriasis* als eene hoogst belangrijke en gelukkig zeldzame huidziekte, die hij zelfs eenmaal met den dood zag eindigen.

Ook SAM. PLUMBE verwerpt de door mij met eenige wijziging gevolgde verdeeling, zeggende: „over de variëteiten der *pityriasis rubra* en *versicolor* heb ik niets te zeggen. Zij fchijnen alleen „dienstig om de ftuderende jeugd te verwarren, „en met eenen digten fluijer een onderwerp te „omhullen, dat weinig te beteekenen heeft en ligt „te bevatten is.

P. RAYER fpreekt ook nog van eene aandoening van het flijmvlies der mondholte, die meermalen, ook bij ons, echter niet zeer menigvuldig, voorkomt

komt. Op de *chronisch* ontstokene binnenste oppervlakte der wangen en der tong, vindt eene duurzame affschilfering van het *epithelium* plaats. In eenige van de mij voorgekomene gevallen dezer aandoening, was de buitenste oppervlakte der wangen, gelijktijdig door eene schubachtige huidschilfering aangedaan, welke echter meer naar *lichen circumscriptum* en *psoriasis diffusa*, dan naar *pityriasis* geleek. Ook kan dezelve van eene *syphilitische* geaardheid zijn. Met uitsluiting van RAYER's gezegde, weet ik mij niet te herinneren, ergens gewag van deze ziekte gemaakt te vinden.

1. *Pytiriasis capitis*. Zemeluitslag van het hoofd.

Aan het bovenste gedeelte van het voorhoofd en aan de slapen, komt deze uitslag, meerendeels bij kinderen, als eene weinig in het oog loopende, witte, drooge huidschilfering voor, zonder roodheid noch kennelijke ontsteking. Het blijft tot die deelen bepaald, of breidt zich met plekken, die van elkander verwijderd staan, en met grootere, half doorschijnende schubben bedekt zijn, over het hoofd uit. Somwijlen wordt het geheele met haren begroeide hoofd, door aaneen liggende en elkander aanrakende schubben bedekt. Ook bij volwasfenen komt de *pityriasis capitis* voor, meerendeels bij lieden, die eene donkerkleurige huid, bruin en zwart haar hebben, of van gemengde Indiaanschen oorsprong zijn. De opperhuid schilfert in grootere schub-

schubben dan bij kinderen en zeer talrijk af, zonder eenige andere verscheidenheden op te leveren.

Wanneer het haar dun is of kort afgesneden, dan laten zich de schilfers door borstelen, wrijven en waschen met zeepfop, of door eene zwakke oplossing van loogzout met weinig moeite wegnemen. Door verzuimde reiniging van het hoofd worden de schubben met opgehoopte onreinheden tot korsten verdikt, die, opeengepakt, met de haren zamenkleven, en het hoofd met digte, bruine schubben bedekken, welke bij jonge kinderen ligtelijk verwisfeld kunnen worden met die korstige aangroeiingen op het hoofd, welke door het gemis eener zorgvuldige verpleging ontstaan. Onder die korstige schubben doen zich ligtelijk etterpuisten op, die een scherp vocht afscheiden, dat de huid prikkelt, en eene complicatie met *porrigo favosa* kan te weeg brengen.

De *pityriasis capitis* behoort tot de geringste, naauwelijks den naam van ziekte verdienende huid-aandoening, die met geenen algemeenen ziekte-toestand der bewerktuiging gepaard gaat, en die, behalve eene zelden hevige jeukte, geene ziekteverschijnselen oplevert. Maar de voortdurende schilfering der huid, die de bovenkleederen verontreinigt, en hare hardnekkige langdurigheid, vooral bij volwassenen, maken haar tot eene onaangename en walgelijke ongesteldheid. Meerendeels wordt zij bij kinderen door veelvuldige reinigingen van het hoofd overwonnen, of zij verdwijnt met de intredende manbaarwording.

Eene

Eene veranderde werkdadigheid , door zwakte in de vaten , welke de stof tot vorming der opperhuid afscheiden , het zij aangeboren of verworven , ſchijnt de oorzaak dezer huidaandoening te zijn.

De behandeling vordert geene inwendige geneesmiddelen , ten ware dat er gelijktijdig algemeene ziekelijke aandoening der bewerktuiging mede gepaard gingen. Tot de uitwendige behandeling behoort in de eerſte plaats , dat men de haren zoo kort mogelijk laat afſnijden , of kan het zijn afſcheren , en dat men het hoofd door borſtelen en wasſchingen met zeepſop of verdunde loog rein houde. Indien daarmede de genezing niet tot ſtand komt , bediene men zich van zacht zamentrekkende en prikkelende middelen , als :

R. *Acetis zinci*
aq. diſtillat.
alcohol ʒ unc vi.
 m. s. — Hoofdwasſching.

R. *Medullae osſium bovis* dr. x.
olei amygd. dulc. dr. ii.
pulv. cort. per. rubri dr. i.
 m.

om het hoofd mede in te wrijven.

Door verwisfeling der metaalbereiding en der ſpiritueuze bijmengfels , kunnen de wasſchingen op velerlei wijze veranderd en gewijzigd worden.

2. *Pityriasis versicolor*, *Chloasma rayeri*.

De met kleuren spelende zemeluitslag.

De borst, de armen, de zijde en de buik, in het algemeen de met kleederen bedekte lichaamsdeelen, worden er door aangetast. De geel- of bruingekleurde vlekken zijn onregelmatig over de huid verdeeld. In het aangezicht en op de handen komen zij zeldzaam, op de billen en onderste ledematen meermalen, op de binnenzijde der bovenste ledematen menigvuldiger voor; waar zij zich vestigen, geven zij aan de huid een eigenaardig gespikkeld en bont aanzien. Bij de eerste uitbotting zijn de vlekken klein, komen het eerst in den hartkuil, rondom de borst en in den omtrek der sleutelbeenderen te voorschijn. De trapsgewijze vereenigingen der kleine vlekken vormen grootere plekken van verschillende gedaanten: nu eens breiden zij zich taksgewijs uit gelijk het geelgebladerde mos op de schors van boomen; dan weder zijn zij niet ongelijk aan eene landkaart, waarop landen, water en eilanden met verschillende kleuren zijn afgezet. De oppervlakte der vlekken is ruw en met kleine zemelachtige schubbetjes bedekt, die spoedig afruijen, maar niet minder spoedig door andere worden vervangen. De natuurlijke lijnen der huid zijn op de vlekken iets dieper ingedrukt dan op de vrijgeblevene deelen. De vlekken zijn door geene verhevene, noch ontstokene randen omgeven, maar verliezen zich door

III Deel. V eenen

eenen zachten overgang in de natuurlijke kleur der huid.

Zeer zelden wordt de geheele oppervlakte des ligchaams gelijkmatig door de *pityriasis versicolor* aangetast. Rondom den navel, aan de borsten en in de zijde van den romp zijn de vlekken het flechtst gekleurd, minder op den rug, het minst boven het borstbeen. De ongekleurde huiddeelen, die tusschen de vlekken inliggen en met eenige ligt ingedrukte schubbetjes bedekt zijn, ziet men het meest en met den grootsten omvang op het onderste gedeelte van den rug en den onderbuik.

De *pityriasis versicolor* is eigenlijk geene ziekte der opperhuid, zegt R. WILLAN; want wanneer men deze van eene der vlekken wegneemt, blijft de tegennatuurlijke kleur in de huid of in het slijmweeffel terug. BATEMAN daarentegen heeft in twee gevallen het tegendeel waargenomen, nadat men de gekleurde opperhuid had weggenomen, herstelde zich eene nieuwe rood doorschijnende opperhuid, zoo als overal plaats vindt.

Deze zonderlinge huidaandoening gaat met geene algemeene ziekteverschijnselen, noch met eenig verontrustend toeval gepaard. Ook in den hoogsten trap van ontwikkeling blijft dezelve eene weinig beteekenende huidziekte. Ook de vergezellende jeukte is niet bovenmatig, maar wordt heviger, wanneer zich de lijders naar bed begeven, of na zware ligchaamsinspanning en na het gebruik van warme prikkelende en geestrijke dranken.

Er

Er komen gevallen voor, waarin tusschen de vlekken der *pityriasis versicolor* een spoedig verloopende uitflag of een voorbijgaand *lichen pilaris* gezien worden, welke echter op het beloop en de oorspronkelijke gedaante der eerste ziekte geen invloed uitoefenen. De *pityriasis versicolor* is altijd langdurig: er kunnen jaren verlopen, zonder dat de genezing tot stand komt. Zij komt bij beide geslachten, in alle leeftijden en in alle gewesten voor. Omtrent hare oorzaken heerscht almede onzekerheid. Men heeft dezelve als een gevolg van deze of gene spijzen, voornamelijk van vruchten en champignons willen beschouwd hebben; andere beschuldigen plotfelinge verwisfeling van hitte en koude, sterke bewegingen, uitputtende krachtingspanningen, het dragen van flanel op de bloote huid, het verblijf in de gewesten tusschen de keerkringen als voortbrengende oorzaken, en als schadelijkheden, die dezelve onderhouden en verslimmeren, waar zij reeds aanwezig is.

Van de leverschvlekken en andere huidverkleuringen, waarmede de *pityriasis versicolor* verwisfeld wordt, onderscheidt zich dezelve daardoor, dat zij gewoonlijk op de met kleederen bedekte deelen, zelden op de ontbloote voorkomt, en met eene schubachtige schilfering gepaard gaat; terwijl de *ephelides* het meest op de onbedekte huiddeelen voorkomen, niet schilferen, en ten hoogste in zeldzame gevallen als met eene fijne stof bepoeërd zijn. Van de venerische vlekken onderscheiden zich die der *pityriasis versicolor* door de ko-

perkleur en de regelmatigte ronde gedaante der eerste, verbonden met andere venerifche verschijnselen en de voorafgegane leefwijze der lijders.

Behandeling. Veelal ligt de *pityriasis versicolor* buiten de grenzen van het gebied der werkdadige geneeskunst; zij wederstaat jaren lang alle zoowel in- als uitwendig tegen haar gebruikte middelen. Zuren, loogzouten, kwik- en spiesglasbereidingen, houtdranken, baden in alle gedaanten, enz. worden menigmaal te vergeefs gebezigd. WILLAN bragt in een geval de genezing tot stand door het gebruik van warme zeewaterbaden, die later met baden in de opene zee verwisfeld werden. BATEMAN meent aan het *acidum muriaticum oxygenatum* geneeskrachten in deze ziekte te mogen toekennen. In hardnekkige gevallen geeft hij pikpillen inwendig, en bezigt uitwendig prikkelende waschmiddelen, zamengesteld uit gelijke deelen zoutzuur en wijngeest, twee of drie drachmen op eene flesch water, of eene drachma bijtende loog op dezelfde hoeveelheid water. Waschingen met de melk van bittere amandelen met *acetis plumbi liquidæ* of *flores zinci*, of eene zalf met *magisterium bismuthi*, ééne drachma op ééne once ongezouten boter, hebben almede goede diensten bewezen.

3. *Pityriasis rubra*. De roode zemeluitslag.

Deze komt het menigvuldigst bij volwasfenen, zelden bij kinderen voor. De chronifche ontsteking is bij de *pityriasis rubra* meer ontwikkeld,
en

de vlekken zijn rood gekleurd, alvorens zich met schubben te bedekken; het is misfchien uit dien hoofde, dat zij den naam van roode verkregen heeft. Ten gevolge dezer ontsteking heeft zij eenige gelijkenis met de *psoriasis guttata* en *diffusa*, en kan in hare hoogste trappen van ontwikkeling met deze verwisseld worden.

De kleine roode vlekken, die de grootte hebben van een doorgesneden hennipzaadje, zijn bij hare opkomst alleen ruw van oppervlakte, becomeu spoedig een bepoederd aanzien, om zich daarna met dunne, witte, doorschijnende, aan de randen losse schubbetjes te bedekken, zamengefeld uit verschillende los op elkander liggende dunne plaatjes, die men een voor een met de nagels kan opkrabben. Aan zich zelven overgelaten, grijpen menigvuldige afschilferingen plaats. De ontbloote vlekken blijven rood, zoo lang de ziekte duurt, en bedekken zich na iedere afruijing op nieuw met telkens grooter wordende schubben.

De ontwikkeling der *pityriasis rubra*, alhoewel eene weinig beteekenende ziekte, gaat gewoonlijk met ligte stoornisfen in de spijsverteringswerktuigen, onrust, lusteloosheid en loomheid der ledematen gepaard. De huid blijft droog, en de uitwafeming schijnt op de meest aangedane deelen geheel onderdrukt te zijn. De ledematen en de borst waren de deelen, welke in de gevallen, die mij voorgekomen zijn, het meest met vlekken bezet waren.

De *pityriasis rubra* behoort tot de geneesbare,

echter in de meeste gevallen tot de langdurige en hardnekkige, ligt wederkeerende huidaandoeningen, lastig door de hevige jeukte, krieuweling en veelvuldige affschilferingen.

Bij jonge lieden volgt de genezing meermalen spoedig; bij bejaarde na een lang tijdsverloop. De genezing mag als naderend beschouwd worden, wanneer de vlekken ophouden te schilferen, beginnen te verbleeken, eerst eene vuile gele kleur aannemen, die zich allengskens in de natuurlijke kleur der huid verliest.

Betrekkelijk de oorzaken, geldt hetzelfde, wat reeds ten aanzien van de andere wijzigingen der *pityriasis* gezegd is. Vrouwen en kinderen, en voorwerpen, welke eene teedere huid hebben, lieden, die veelvuldig aan groote hitte blootstaan, of door hevige gemoedsaandoeningen geschokt worden, staan er meer dan andere voor bloot. Of de scheede, waarmede de opperhuid de wortels der haren omkleedt, de oorspronkelijk en wezentlijk lijdende deelen in deze ziekte zijn, komt mij niet onwaarschijnlijk voor; aangezien de eerste ontwikkeling der vederen bij jonge vogels met eene huidschilfering gepaard gaat, waarmede de *pityriasis* bij den mensch de grootste overeenkomst heeft.

Behandeling. Deze vordert het gebruik van zwavel, magnesia, spiesglas en houtdranken, met lakfeermiddelen verbonden, wanneer de buiksonstastingen ontoreikend zijn. Daarna bittere afkookfels met eene halve once *sulphatis sodae* of een tot twee drachma
kali

kali carbonicum acidulum op XXIV oncen , ondersteund door eene niet prikkelende diëet en verbonden met warme waterbaden. Wanneer de huid zeer prikkelbaar is , en de schubben meer dan gewoon dik zijn , verbonden met hevige jeukte , dan moet de behandeling der *psoriasis* gevolgd worden ; want beide ziekten hebben alsdan veel met elkander gemeen.

In zeer hardnekkige gevallen roemt BATEMAN de *tinctura veratri albi* in kleine giften. Uitwendig bezige men verzachtende omflagen , zoo lang de huid in eenen geprikkelden toestand verkeert. Later zijn de zacht zamentrekkende waschmiddelen met metaalbereidingen en wijngeest , de oplosfingen van borax , aluin , loogzouten , zee- en zwavelbaden naar omstandigheden te beproeven. De zwavelberookingen worden ook door GREEN in zijnen , naar het mij toefschijnt , overdrevenen ijver voor dat middel , met warmte aanbevolen , en als een onfeilbaar middel tegen deze ziekte gewaardeerd.

Bij de aandoening der mondholte volge men inwendig dezelfde behandeling en bezige de aangeradene waschmiddelen , nog meer verdund als mondspoelingen. Zijn de wangen of de kin op hare buitenste oppervlakte aangedaan , dan bediene zich de lijder van geene scheermesfen om den baard af te nemen , maar make gebruik van eene schaar.

Volgens GIBERT wordt *pityriasis* ligt en gemakkelijk genezen door zure dranken , lakfeermiddelen en eenen gepasten leefregel. Bij sterke lieden en

aanwezige ontstekingstoevallen kunnen zonder zwaarigheid bloedontlastingen in het werk worden gesteld. Zeer zelden zijn volgens dezen schrijver de middelen noodig, welke door de Engelsche Geneesheeren zijn aanbevolen, namelijk de *chlore*, de zweetmiddelen, de kwikbereidingen, de zeebaden, de waschingen met *chlor*-water, de loog, de oplosfingen en zalven met borax, aluin, loodbereidingen, enz.

4. *Pityriasis nigra*, *Melasma Rayeri*.

De zwarte zemeluitslag.

De *pityriasis nigra*, waarvan R. WILLAN gewag maakt, die BATEMAN echter nimmer gezien heeft, en welker bestaan ten minste twijfelachtig is, komt bij kinderen voor, die in *Indië* geboren zijn en naar *Europa* worden overgebracht. Zij begint schijnbaar met *eczema*-blaasjes, en eindigt met eene donkere huidverkleuring en zemelachtige afschilfering. Somwijlen wordt slechts de helft van een der ledematen er mede bezet.

De *pityriasis nigra* van BIETT, die in 1828 en 1829 te *Parijs* epidemisch geheerscht heeft, kenstetste zich even als de andere wijzigingen der ziekte, door eene zemelachtige vervelling; maar deze schilfering had hier op eene zwarte, somwijlen van eene zeer donkerzwarte oppervlakte plaats. Deze *pityriasis* kwam in twee onderscheidene gedaanten voor. In de eene was de opperhuid zelve gekleurd, en weggenomen zijnde, kwam eene roode oppervlakte bloot. In de andere wijziging daar-

daarentegen was de opperhuid doorschijnend en de daaronder gelegene laag van weeffel was de zetel der zwarte kleurverandering. Men volgde dezelfde behandeling als bij de *pityriasis rubra*. De baden en de plaatselijke berookingen hebben dikwijls gunstige uitkomsten opgeleverd.

d.) *Ichthyosis*. Vischschubbige uitflag.

Eene ruwe, drooge, schubbige ontaarding der Bepaling. opperhuid, niet ongelijk aan de schubben van vischen en aan die, welke de pooten der hoenderaardige vogels bedekken. Zij hebben de dikte van ééne tot vier lijnen, en zijn in haar weeffel gelijk aan de eeltachtige verdikking der opperhuid, opklimmende tot de vastheid van eene hoornachtige zelfstandigheid. De huid geeft geene of niet merkbare teekenen van ontsteking. De uitflag blijft tot een deel des ligchaams bepaald (*Ichthyosis localis*), of breidt zich meer algemeen over hetzelfde uit (*Ichthyosis universalis*); is dikwijls aangeboren, somwijlen verworven, meerendeels ongeneesbaar, zonder verbonden te zijn met inwendige ziektegesteldheden, noch met algemeene ziekteverschijnselen.

Niet algemeen hebben de schrijvers over de huidziekten de *Ichthyosis* tot de schubachtige, maar gelijk RAYER en andere tot de ziekelijke gedaanteverwyselingen der opperhuid gebragt.

De verscheidenheden, welke de gedaante, de dikte en de kleur van de ziekelijke voortbrengfels der huid, bij de *Ichthyosis* opleveren, hebben

aanleiding gegeven, eenige foorten aan te nemen. De rangschikking tot de twee volgende schijnt mij toe het meest met de natuur overeen te stemmen.

1. *Ichthyosis simplex*. De eenvoudige vischschubachtige huidziekte.
2. *Ichthyosis cornea*. De hoornaardige vischschubachtige huidziekte.

Eene andere ziekte, waarbij de opperhuid op eene zeer zonderlinge wijze ontaard en met hoornaachtige uitwasfen van verschillende gedaanten en lengten in eenen grooteren of kleineren omvang bedekt is, vindt men veelal als eene wijziging der *Ichthyosis cornea*, ook door ALIBERT, beschreven. Ik heb gemeend dezelve, in navolging van andere schrijvers, daarvan te moeten afzonderen, en te brengen onder de stekelvarkenaardige en hoornaachtige ontaarding en uitwasfen der huid. (*Hystri-
cismus, cerostosis, hystrix*).

1. *Ichthyosis simplex*. De eenvoudige vischschubaardige huidziekte.

Bepaling. Deze is aangeboren of verworven, en ontwikkelt zich eerst eenige jaren na de geboorte. Zij is algemeen over een groot deel des ligchaams verbreid of slechts tot een enkel deel beperkt. De vischschubachtige gedaante der ziekelijke voortbrengfels, welke als een buitengewoon omkleedfel de lijdende deelen bedekt, heeft aan deze ziekte haren naam gegeven. De schubben zijn op eene geheel eigendommelijke wijze geplaatst en verbreid;

breidt; zij zijn het talrijkst, waar de opperhuid dik en ruw is; in den omtrek der gewrichten van den elleboog, de knie en aan de buitenzijde der bovenste en onderste ledematen. Aan de dij en op de scheen zijn de schubben kleiner en minder dik. Op deelen, die eene fijne en dunne opperhuid hebben, aan de voorhuid, op de oogleden, onder de okselen en in de liezen ontbreken de schubben geheel. Ook op de middellijn van den rug, langs den loop der wervelkolom, op de heupen, aan de muis van den duim, onder de voetzolen, aan de binnenste oppervlakte van de dij en van het ellebooggewricht, komen de schubben zelden, en ook dan eerst in het verdere beloop der ziekte, na eenigen tijd geduurd te hebben, te voorschijn. Zeer zelden worden kinderen met de reeds ontwikkelde ziekte geboren, en men ontdekt nergens bij hen schubachtige onttaarding der opperhuid, niettegenstaande de ziekte, die zich later ontwikkelt, voor aangeboren moet beschouwd worden. De huid van dusdanige kinderen mist de fijnheid en molligheid, aan dit levenstijdperk eigen; zij is daarentegen droog en ruw. Eerst na verloop van twee tot drie maanden, begint de huid te schilferen, bedekt zich allengs met kleine, ongelijkvormige, grijze schubbetjes, en bekomt het aanzien der drooge huid van hoogbejaarde lieden, gepaard met eene ruwheid, die weêrstand biedt aan de daarover heenstrijkende hand. In dezen ligten en eersten trap van ontwikkeling, kan de *Ichthyosis* levenslang stil blijven staan, of eerst in

een meer gevorderd levenstijdperk tot eenen hooger trap van ontwikkeling opklimmen. Echter kan zij ook vroeger, reeds weinige maanden na de geboorte, in hare volkomene gedaante te voorschijn treden. De schubben, welke de huid bedekken, liggen menigwerf niet op, maar naast elkander, gelijk aan die, welke bij hoenderaardige vogelen de pooten bedekken. ALIBERT vergelijkt dezelve met de schubben der slangen, en geeft aan de ziekte in deze gedaante den naam van *Ichthyosis nitida serpentina*. Zijn de schubben daarentegen grooter en dakpanvormig over elkander gelegen, gelijk de schubben op den rug der vischen, dan bestaat die wijziging, welke ALIBERT met den naam van *Ichthyosis nitida cyprinea* bestempelt. In de eerste wijziging zijn de schubben gewoonlijk kleiner dan in de laatste; bedekken eene groote of meer beperkte vlakte, of zitten geheel afgezonderd van elkander verwijderd, hetwelk echter zeldzaam plaats vindt. Meermalen ziet men de geschubde plekken met lijnen doorneden, welke ten gevolge eener zeer fijne affchilfering een bepoederd aanzien hebben. De schubben hebben gewoonlijk eene grijze kleur; somwijlen zijn zij wit en glinsteren. Zonder pijn te verwekken, kan men dezelve opligten en wegnemen, mits men de grootste, die gewoonlijk vaster zitten, onaangeroerd laat; want deze, opgeligt wordende, verwekken eene onaangename gewaarwording. De weggenomene schubben worden spoedig door andere vervangen.

Op de deelen, welke van den uitflag bevrijd blijven, is de huid perkamentachtig droog, en de huiduitwaseming, vooral ook op de plaatsen, die met schubben bedekt zijn, onderdrukt, of zoo gering, dat zij niet wordt waargenomen. Op de voetzolen en in de handpalmen is de opperhuid eeltachtig, bar en met pijnlijke kloven doortrokken. Somwijlen komen ook verstrooide etterpustten en zeer pijnlijke etterbuilen op verschillende deelen des ligchaams te voorschijn.

Het afbladderen der opperhuid in lappen van verschillende dikte en grootte, die op elkander kleven en langdurig zitten blijven, zoo als aan de beenen van kwaadsappige en waterzuchtige lieden meermalen plaats vindt, wordt door aanhoudende of telkens wederkeerende roosachtige ontstekingen dier deelen veroorzaakt, en kan bij eene oppervlakkige beschouwing voor eene gewijzigde *Ichthyosis* worden gehouden. De wijziging, door WILLAN onder de benaming van *Ichthyosis cruris* afgebeeld, stelt dit voortbrengfel eener roosaardige ontsteking voor. De eerst blaasvormige opheffing der opperhuid met de daarin bevatte wei, die vervolgens met de opperhuid tot perkamentaardige lappen verdroogt, kenschetsen het eigendommelijke der huidontaarding, waarvan wij gesproken hebben. Ook de schubachtige vereeltheden, waarvan RAYER spreekt onder de benaming van plaatselijke *Ichthyosis* op het voorste onderste gedeelte der dij bij schoenmakers, ter plaatse, waar de spanriem zijn rustpunt heeft; in den omtrek der gewrichten van hand-

handwerkslieden, bij welke de uitoefening van hun beroep eene sterke drukking op die deelen uitoefent; ik mag er bijvoegen: de schubachtige verdikking der opperhuid op de kniën van Roomsche Katholieke geestelijken en andere personen, die veel knielen, behooren, evenmin als de ziekelijk vergroote tepeltjes der tong, tot de *Ichthyosis*. Het zijn niet anders dan veranderingen in het weeffel der opperhuid, door werktuigelijke, uitwendige oorzaken voortgebracht, geheel en al van deze afhankelijk. Zij verliezen zich allengskens, zoodra de voortbrengende oorzaken hebben opgehouden te bestaan.

2. *Ichthyosis cornea*. De hoornachtige, vischschubbaardige huidziekte.

Bepaling. Het ziekelijke voortbrengfel der lijdende deelen bestaat in eene laag hoornachtige zelfstandigheid, ter dikte van ééne tot vier lijnen, van eene donkerbruine of zwarte kleur. Eene menigte, zich in alle rigtingen snijdende fijne lijnen verdeelen dit korstaardige omkleedfel in vele kleine drie- en vierhoekige stukjes, waarvan eenige, die meer of minder vooruitspringen, een wrataardig aanzien bekomen, terwijl andere, die zich tepelvormig boven de oppervlakte verheffen, breede, onregelmatig gevormde punten hebben. Nergens zijn dezelve ingedrukt, en liggen dakpanvormig niet op maar naast elkander. De verdeeling in kleine stukjes en de zich hier en daar verheffende gedeelten, geven aan het geheel eene groote ruwheid,

heid, die, als men er de vlakke hand overheensrijkt, eene gewaarwording verwekt, gelijk aan die eener vijl, zeer ruw sagrijn, of den rug van een' visch, tegen den loop der schubben gestreken. Meerendeels tast de hoornachtige *Ichthyosis* de buitenzijde der ledematen aan, en overdekt dezelve, gelijk de schors eens booms. PLUMBE vindt, dat dezelve meer gelijkenis heeft met de huid des olifants, des rhinoceros, en andere met weinig haar begroeide dieren.

Niet alleen echter op de ledematen vindt men de *Ichthyosis cornea*; zij komt ook op andere deelen des ligchaams voor; somwijlen slechts op eene enkele plek van geringen omvang. BATEMAN heeft dezelve in het aangezicht, op eene der wangen waargenomen, en onder den naam van *Ichthyosis faciei* beschreven en afgebeeld.

Men kan deze hoornachtige aangroefels gemakkelijk wegnemen, wanneer men dezelve, terwijl de lijder een warm bad neemt, stuksgewijze met de nagels voorzigtig oplicht. De aldus weggenomene korsten worden wel niet terstond, maar later weder door andere vervangen. De ontbloote opperhuid blijft hard en droog, zonder haar natuurlijk weeffel en hare molligheid terug te bekomen. Volgens R. WILLAN kan door herhaalde warme baden, met wrijvingen verbonden, de vorming van nieuwe korsten verhoed worden.

Even als de *Ichthyosis simplex*, kan ook de *cornea* algemeen en plaatselijk zijn, aangeboren en verworven voorkomen. R. WILLAN meent, dat de

de laatste door overerving niet wordt voortgeplant; volgens zijne ervaring, wordt nooit meer dan één voorwerp van dezelfde ouders geboren aangestast. Aangeboren zijnde, ontwikkelt zich de *Ichthyosis* van twee tot drie maanden na de geboorte, somwijlen eerst in den ouderdom van twee jaren, of komt nadat de lijders de kinderpokken hebben doorgestaan, en duurt alsdan van zes tot zeven jaren onveranderd voort.

In *Engeland* en *Frankrijk* schijnt de *Ichthyosis* niet zeer zeldzaam te zijn. ALIBERT althans zegt, dezelve dikwijls genoeg in het hospitaal *St. Louis* gezien te hebben. BIETT maakt van vijftig gevallen, in dat hospitaal voorgekomen, gewag, met de opmerking, dat op twintig gevallen slechts ééne vrouw voorkomt. RAYER zegt: „de *Ichthyosis* is geene zeer zeldzame ziekte in *Frankrijk*; „ik heb er meer dan veertig voorbeelden van gezien.” Bij ons en in *Duitschland* daarentegen, behoort de *Ichthyosis* in beide hare gedaanten tot de zeer zelden voorkomende ziekten. De weinige gevallen, welke men hier en daar vermeld vindt, zijn niet altijd beslissend, en laten het twijfelachtig, of de beschrevene ziekten wezentlijk tot de *Ichthyosis*, dan wel tot de *psoriasis* of tot eene andere huidziekte behoord hebben. Eenmaal zag ik de *Ichthyosis simplex*, in haren hoogsten trap van ontwikkeling bijna over het geheele ligchaam uitgebreid, bij eenen kriegsgevangenen Russischen korporaal in het jaar 1799, in het hospitaal te *Honscholnerdijk*. De man was overigens gezond en

en vertrok met zijne kameraden naar het depôt voor de krijgsgevangenen te *Bergen op Zoom*. Eene vrouw, aan den omtrek van het linkerbeenvoetgewricht door *Ichthyosis cornea* aangetast, hier ter stede woonachtig, bevindt zich thans nog onder mijn toezigt; want na vergeefs onderscheidene middelen beproefd te hebben, wordt alleen eene zalf gebruikt, zamengesteld uit gelijke deelen *unguentum neapolitanum* en *althea*; de korsten worden daarmede lenig gehouden, en de beweging van het gewricht gemakkelijk gemaakt. Gedurende de hitte des zomers wordt de huid somwijlen van haar ziekelijk omkleedfel bevrijd, maar met den naderenden herfst met een nieuw voorzien. Ook in andere jaargetijden, maar zeldzaam, komen zoodanige afruijingen voor. De huid van alle aangroefels gezuiverd, geeft geene blijken van ontsteking, onverschillig of men de korsten door baden en andere uitwendige hulpmiddelen heeft weggenomen, of dat zij van zelve zijn afgevallen. De kleur der huid is natuurlijk, met uitzondering van de kleine verhevenheden, die men op hare oppervlakte waarneemt, en die meer ontwikkeld zijn dan in den gezonden toestand. De uitwaseming en de afscheiding der smeerkliertjes blijven onderdrukt of zijn niet waar te nemen.

De *Ichthyosis* beveiligt niet tegen andere ziekten: hare lijders kunnen door de pokken en andere heete huidziekten, zoowel als door inwendige ziekten worden aangetast. Gedurende derzelver beloop wordt de huid

van haar ziekelijk bekleedfel ontdaan, of de korsten worden dunner, de huid verliest gedeeltelijk hare dikte en ruwheid; maar alles keert tot het oude terug, zoodra de genezing der bijgekome ne ziekte is tot stand gekomen.

Zonder complicatiën met andere ziekten, levert de *Ichthyosis* geene ziekte-verschijnselen op. Zij verloopt zonder jeukte en pijn; alleen de bewegingen der aangedane ledematen worden er door bemoeijelijkt. Ook schijnt zij, niettegenstaande hare langdurigheid, geene schadelijke invloeden op de bewerktuiging uit te oefenen. RAYER is van meening, dat eene vermeerderde afscheiding in de longen en in de nieren, zoowel als de overvloedige uitwaseming der handpalmen en der voet-zolen, de onderdrukte huiduitwaseming vervangen, en daardoor de gezondheid en de stand wordt gehouden.

Het ziekelijk omkleedfel, waarmede de *ichthyosis* de oppervlakte des ligchaams bedekt, schijnt niet anders te zijn dan eene overtollige ontwikkeling der opperhuid in eene bijzondere gedaante, door afwijkingen in de vormende kracht. Want noch de maceratie, noch de scheikundige ontleding van dezelve, levert andere uitkomsten dan die der gezonde opperhuid. Voor het overige rusten alle verklaringen van de ontwikkeling des uitlags, en van de veranderingen, welke het huidweeffel ondergaat, meer op gisfingen dan op daadzaken, en datgene, wat men meent gezien en gevonden te hebben, is meer uitwerkfel dan oorzaak der ziekte.

Be-

Behalve dat deze ziekte aangeboren en erfelijk zijn Oorzaken, kan, van geslacht tot geslacht voortgaande, weten wij met zekerheid zoo goed als niets omtrent de oorzaken, welke haar voortbrengen. Men heeft dezelve in den zedelijken invloed der zwangere vrouwen op de vrucht gezocht, en verviel daardoor tot geene geringe dwaasheden. Ook heeft men beweerd, dat de *ichthyosis* in *Paraguay* en eenige der Zuidzee-eilanden epidemisch heerscht, maar het tegendeel wordt door geloofwaardige reizigers bewezen. Anderen willen, dat zij in de nabijheid der zee en van vischrijke rivieren het menigvuldigst zou voorkomen, en aan de voeding met visch haar bestaan zou te danken hebben. De zeldzaamheid dezer ziekte bij ons, waar al die vooronderstelde schadelijkheden als opgehoopt zijn, is een alles afdoend bewijs voor de onschuld derzelve.

Dat de naaste oorzaak in eene veranderde stemming der vaateinden, welke de bestanddeelen der opperhuid afscheiden, en der levende en doode krachten, welke de opperhuid vormen, bestaat, kan wel niet in twijfel worden getrokken; geenszins echter is het bewijsbaar, of zij als een ontstekings-toestand dier vaten te beschouwen is, of aan den invloed der zenuwen moet worden toegeschreven.

Na al hetgeen over het beloop en de eigenaardigheden der *ichthyosis* gezegd is, kan het niet moeilijk vallen, dezelve in hare verschillende wijzigingen te herkennen en van andere ziekten te onderscheiden. Het zij derhalve genoeg, hier alleen te herhalen, dat de geheel eigendommelijke gedaante

Onderschei-
dings-teeke-
nen. Diag-
nosis.

des uitflags, deszelfs gelijkmatige, niet roofachtige dikte, zijne droogte en ruwheid, de afwezigheid van ontsteking, jeukte en pijn, en het standvastig staan blijven van het vreemdaardige huidbeksleedfel zonder afwijking, kenteekenen genoeg zijn, om verwisfelingen met andere huidziekten te verhoeden,

Voorzegging. De *ichthyosis* is geene gevaarlijke ziekte. Zij is geheel en alleen plaatselijk, en gaat met geene verschijnselen gepaard, welke eenen algemeenen ziekte-toestand en stoornissen in de bewerktuiging en van hare verrigtingen aanwijzen. Maar zij is eene onaangename, afzigtelijke en langdurige ziekte. De geërfde en aangeborene is ongeneesbaar en alleen voor eene onderhoudende (*palliative*) behandeling vatbaar. Ook de verworvene en de plaatselijke zijn zeer hardnekkig, en worden zelden, — in de gedaante der hoornachtige bijna nimmer, genezen.

Geneeswijze. De aangeborene behandel men alleen met uitwendige middelen, bezige verzachtende omslagen, warme water- en dampbaden plaatselijk, en inwrijvingen met vette oliën, om de korsten lenig te houden en te verhinderen, dat zij de bewegingen der gewrichten zoo min mogelijk bemoeijelijken, maar integendeel het lijden verzacht en dragelijk worde gemaakt.

Tegen de verworvene of toevallig ontstane *ichthyosis* vindt men onderscheidene geneeswijzen en geneesmiddelen aangeraden, die echter meerendeels te vergeefs, hoogst zelden met goed gevolg worden aangewend. WILLAN en BATEMAN raden het ge-

gebruik aan van warme water- en zwavelbaden , verbonden met het inwendig gebruik der teerpillen , in klimmende giften tot ééne halve once daags. BIETT echter verzekert , het teer in het hospitaal *St. Louis* zonder vrucht te hebben gebruikt , er bijvoegende , dat alleen uitwendige middelen iets tegen deze ziekte vermogen.

Door drukking met sluitende hechtpleisters , door zwachtelen ondersteund en met koude omslagen verbonden , langdurig volgehouden , worden de korsten los , zoodat zij gemakkelijk kunnen worden weggenomen , en komt , volgens PLUMBE de genezing tot stand.

Anderen hebben vliegenpleisters , prikkelende oplegfels , plaatfelijke baden en zwavelberookingen aangeraden. COULSON bezigt eerst dagelijks twee wasfchingen met eene oplossing van fublimaat , en daarna eene zalf met ééne halve once *unguentum citrinum* en ééne once olijfolie. Een kind werd op deze wijze volkomen genezen.

BATEMAN genas eene jeugdige perfoon door arfenik-bereiding.

ELLIOTSON herftelde éénen van twee broeders , door de *ichthyosis* aangetast , door warme baden , olieachtige fmeerfels , en inwendig teerpillen.

TURNER bezigt inwendig kwik- en fpiesglasbereidingen. THOMSON den *rumex aquaticus*.

RAYER verklaart , nimmer geflaagd te zijn in het genezen der *ichthyosis*.

Naar het mij toefchijnt , handelt men het doelmatigst , alleen de verzachtende uitwendige , en

geene inwendige middelen toe te dienen, ten einde geen kwaad te doen, waar men, op het gezag der ervarenste en beroemdste mannen, mag aannemen, geen goed te kunnen doen.

7^e. Orde.

Tubercula. Knobbels.

Bepaling. Kleine, harde, blijvende gezwellen, deels boven de huid verheven, deels in haar weeffel verborgen; waar het laatste plaats heeft, meer voel- dan zichtbaar, van verschillende grootte en begrensden omtrek, die zich, met of zonder ontsteking, in het daaronder gelegen celweeffel ontwikkelen; genegen tot hardnekkige en vernielende verzweringen, verbonden met openbare of vermoede ziekelijke aandoeningen der bewerktuiging. De knobbels, welke tot de huidziekte behooren, hebben een bewerktuigd weeffel, het zijn pseudo-organisatiën, ontstaan door wijzigingen der reproductie van eenig huiddeel. Zij onderscheiden zich alzoo kennelijk van die knobbels, welke ten gevolge der *scrophulosis* of *tuberculosis* in onderscheidene ligchaamsdeelen voorkomen, en uit eene afgescheidene, niet bewerktuigde massa bestaan. De knobbelachtige huidziekten en de *tuberculosis* (knobbelziekte) zijn diensvolgens twee geheel en al van elkander verschillende ziekten.

De huidziekten, welke onder de knobbelachtige geplaatst worden, leveren, in haar uirwendig voorkomen, in haar beloop, geëardheid en uitgangen, groote verscheidenheden op. Het zijn deze verschei-

scheidenheden , welke aanleiding geven om nu eens deze, dan weder geene knobbelachtige huidaandoening daaronder op te nemen of te verwerpen. Nu eens wil men alleen die knobbelachtige huidveranderingen hebben opgenomen , welke zonder kennelijke ontsteking verlopen ; dan weder ook diegenen , welke met ontsteking gepaard gaan , onverschillig of deze tot de haastig of slepend verloopende behoort. Gewijzigd, heb ik de rangschikking van WILLAN , BATEMAN , BIËTTEN GREEN gevolgd , alhoewel ik zeer wel inzie , dat dezelve niet minder dan andere samenstellingen van ziekten , tot deze orde gebragt, op gewigtige gronden kan tegengesproken en verworpen worden ; want er zijn ziekten onder opgenomen , die slechts onder zeer beperkte bepalingen daarbij te huis behooren , als liggende zij evenzeer binnen het gebied der heel-, als in dat der geneeskunst.

a. *Elephantiasis Graecorum*. Grieksche olifantsziekte.

b. *Molusca*. Uitwasfen.

c. *Framboesia*. Pokken der Goudkust.

d. *Lupus*. De wolf.

e. *Cancer*. Kanker of kreeftgezwel.

f. *Furunculus*. Bloedzweer.

g. *Anthrax*. Pestkool.

h. *Pustula maligna*. Zwarte blaar.

De *elephantiasis* , de *framboesia* , de *lupus* en de *cancer* behooren tot de zwaarste, langdurigste ziekten, die het menschelijke ligchaam op eene afschuwelijke wijze ontstellen , hare verwoestingen , in de be-

werktuiging aangerigt, meerendeels tot den dood toe voortzetten, daar er zelden en moeilijk genezingen worden tot stand gebragt. De *elephantiasis* en *framboesia* zijn afschuwelijk maar in *Europa* zeldzaam. De *molusca* zijn zonder gevaar; de kanker is doodelijk, de wolf vernielend; bij de bloedzweer is de ontsteking hevig en pijnlijk; de pestkool is kritisch; de zwarte blaar ontstaat door besmetting en vernielt de bewerktuiging door versterking.

De gedaante, de omvang, het getal, de kleur, en al wat tot het uitwendige voorkomen der knobbels behoort, leveren vele verscheidenheden op, zoowel ten aanzien van hunne eerste ontwikkeling als van hun verder beloop en hunne uitgangen. De onderscheidings-kenmerken der soorten rusten op deze verscheidenheden en op de veranderingen, welke het weeffel der huid en dat der knobbels zelve ondergaat, en het aandeel, dat de nabijliggende deelen daarin nemen.

Algemeene, aan alle knobbelachtige huidziekten toekomende en deze kenschetsende verschijnselen en toevallen ontbreken; met uitzondering van de harde zwelling, die ten minste in een der tijdperken voorkomt, en de ziekelijke toestand der bewerktuiging, die bij alle, als aanwezig, te vooronderstellen is, hetzij als eene slepende dyscrasie, hetzij als eene spoedig verloopende verandering van mengingen gedaante, door smetstoffen, dierlijke vergiften of andere schadelijkheden ontstaan, welke den regelmatigigen gang der krachten, die de bewerktuiging onderhouden, storen, en be-

belangrijke veranderingen en wijzigingen in de reproductieve verrigtingen te weeg brengen.

De knobbelachtige huidziekten zijn in al hare tijdperken, — zoowel in het eerste, waarin zij zich als kleine, harde beperkte en duurzame gezwellletjes openbaren, als in het tweede, waarin zij tot verwoestende verzweringen zijn overgegaan, en ook in het laatste, waarin zij den hoogsten trap van vernieling bereikt hebben, — van dien algemeen ziekelijken toestand der bewerktuiging afhankelijk, blijkens de soortgelijke aandoeningen der ingewanden, waarmede zij verbonden voorkomen, waarmede zij zich gelijktijdig ontwikkelen, of waarin zij bij de plaats vindende stoornissen overgaan.

De oorzaken der knobbelachtige huidziekten liggen met zoo vele andere in het duister, te meer, daar de zoo zeer van elkander afwijkende geëardheden der knobbelachtige huidziekten met grond tot de vooronderstelling leiden, dat de eenheid niet minder in de oorzaken, dan in de uitwerkselen ontbreekt.

a.) *Elephantiasis Graecorum, Lepra, Elephantiasis Tuberculosa, Leontiasis, Leonia, Satyriasis.* (*Lèpre Tuberculeuse Leontine*,

ALIBERTI.) De Grieksche oliefants-
ziekte, de knobbelachte melaatsch-
heid, de *Boasie* van *Suriname*.

Deze ziekte ontleent haren naam: Grieksche oliefantsziekte, van de naauwkeurige beschrijvingen, die ARETEUS en andere Grieksche schrijvers van haar gegeven hebben; maar niet, omdat zij bij

voorkeur onder de Grieken geheerscht heeft; — den naam van *lepra tuberculosa*, van de knobbelachtige geëardheid des uitflags; — dien van *leontiasis*, van de vreeswekkende dierlijke wantstaltigheid van het aangezicht, naar dat van eenen leeuw gelijkende; — dien van *satyriasis*, van de hevige, het zedelijke gevoel overweldigende teeldrift, met eene dierlijke physionomie verbonden.

ALIBERT en andere schrijvers, zijne volgelingen, hebben onder de benaming *lèpre tuberculeuse*, twee verschillende ziekten, als wijzigingen van eene en dezelfde opgenomen en beschreven: namelijk, de ware *elephantiasis Graecorum* en de *elephantiasis Arabum*. De wezenlijke verscheidenheden, waardoor zich beide ziekten kenschetsen, maken het verkieslijk, dezelve, in overeenstemming met de meeste schrijvers, afgescheiden van de eerste, volgens de uitwendige kenmerken des uitflags, op hare plaats te behandelen.

Bepaling. Niet zeer harde, boven de huid verhevene knobbels van verschillende grootte en onregelmatige gedaante, voorafgegaan door verschillend gekleurde vlekken. De eerst ligt roode knobbels worden later loodverwig, blaauw, donkerrood, geel of bruin; in den beginne met verhoogd algemeen gevoel en pijn bij het aanraken verbonden, later ongevoelig. De knobbels ontwikkelen zich uit het weeffel der huid; maar het daaronder gelegen celweeffel wordt mede aangedaan, zwelt, verhardt, vloeit met de knobbels ineen en vermeerdert derzelfver omtrek en diepte. Gewoonlijk gaan de

gezwollen tot verettering over. Het aangezigt, voornamelijk de neus, de ooren en de wenkbrauwen, en de onderste ledematen worden niet alleen het hevigst, maar ook het menigvuldigst aangetast; zeldzaam vindt men de knobbels over het geheele ligchaam verbreid. Hetgetal derzelve kan klein, maar ook zeer groot zijn; tot een klein gedeelte van de oppervlakte des ligchaams beperkt, of over een grooter deel verbreid; enkel staande of talrijk opgehoopt.

Voorboden. Deze bestaan gewoonlijk in loomheid, lusteloosheid en pijn in de kuit; eenigen tijd daarna neemt de adem eenen onaangename reuk aan; de uitwaseming neemt af en wordt geheel onderdrukt. De Neger verliest den hem eigenen boksreuk, maar bekomt eenen anderen, die nog veel walgelijker is. De stem verandert en wordt schor. Hier en daar komen kleine gevoellooze vlekken te voorschijn, die, wanneer zij eene witte kleur hebben, *morphea alba*, bij eene donkerbruine, *morphea nigra*, en bij eene roode, *le mal rouge de Cayenne* genoemd worden. Deze vlekken zijn nu eens meer, dan minder talrijk, zelden algemeen over het ligchaam verbreid, meerendeels tot enkele deelen beperkt. Volgens HASSELAAR blijven de handen en het aangezigt meermalen verschoond. Bij de Blanken zijn de vlekken bleeker en geel, bij de Kleurlingen donkerder, en bij den Neger zwarter dan zijne natuurlijke kleur. De gevoelloosheid dezer vlekken, ook dan, wanneer men eene naald diep in steekt, en eene ongeneesbare zweer onder den grooten teen, houdt men in de *West-Indiën*

Ontwikkeling, toeval-
len en be-
loop.

Indiën voor zekere kenteecken der zich ontwikkelende Olifantsziekte. Bij eenige lijders worden de handen dor, de vingers stijf en krom. In dezen toestand kunnen de lijders eenen geruimen tijd verkeeren, alvorens de ziekte en hare ontwikkeling voortgaat.

Eerste tijdperk. De speekselklieren zwellen, de neusvleugels worden breed, de neusgaten verwijd, de punt van den neus plat en ingedrukt, de stem heesch en onduidelijk; de adem heeft eenen hoogst walgelijken reuk, de ooren zwellen, wijken verder van het hoofd af; in den mond en de keelholte ontstaan onreine zweren. De vlekken worden donkerder van kleur, zwellen, worden hard en ontaarden in knobbels van de grootte eener erwt tot die eener okkernoot. In den omtrek der knobbels wordt de huid dikker en menigwerf zeer gevoelig, zoodat de geringste aanraking eene eigenaardige, onaangename, verdoovende pijn verwekt. Door de steeds toenemende zwelling en ontaarding der huid en des celweeffels gaan de afzonderlijke knobbels tot groote zamenhangende gezwellen over, door diepe voren en kloven verdeeld, welke de lijdende deelen op eene afzigtelijke wijze ontfellen.

De duur van dit eerste tijdperk is onbepaald: de ziekte kan langen tijd stilstaan. Wanneer de lijder voor de eerste maal is aangetast, met een niet groot aantal knobbels bezet is, en hij de keerkringslanden met de gematigde en koudere gewesten kan verwisselen, dan kan de genezing tot stand komen. Ik heb eenen vriend gehad, die eene reeks van jaren

jaren de geneeskunst in onze *Oost-Indische* bezittingen heeft uitgeoefend. Wegens de bij hem beginnende ontwikkeling van vlekken en knobbels der *Elephantiasis*, bespoedigde hij den terugkeer naar het Vaderland. Op den neus, de wangen, de opperarmen en de dijen, waren onpijnlijke, bijna gevoellooze blaauwe knobbels aanwezig. Onveranderd bleven dezelve tot aan zijnen dood staan, die eerst na verloop van verscheidene jaren, in eenen ruim 60 jarigen ouderdom door koortsen plaats had.

Tweede tijdperk. Meerendeels, vooral in de keerkringgewesten, het tegenwoordige Vaderland der Grieksche Olifantsziekte, gaat dezelve met snelle schreden op eene vreesfelijke wijze in hare ontwikkeling voort. Het geheele aangezicht, vooral de neus, de ooren, de wangen en de wenkbrauwen raken bezet met bultige, wankleurige knobbels, met een net van spataardig uitgezette bloedaderen doorweven en door diepe kloven verdeeld. Het aangezicht bekomt eene vieesaanjagende gedaante, de neusgaten worden nog meer verwijd, doordien de neuspunt invalt en platter wordt, de lippen zwellen, krullen om en verliezen hare natuurlijke gedaante. De spleten tusschen de oogleden bekomen, in plaats van hare langwerpige, eene meer ronde gedaante, en de oogen glinsteren. De haren der wenkbrauwen, der oogleden en des baards worden eerst wolachtig en vallen daarna uit. Bij lijders, welke vóór de manbaarwording zijn aangetast, groeit in het geheel
geen

geen baard. De huid der aangedane deelen be-
 komt eene bruine bronskleur, die zich tot over
 de slijmvliezen, waar zij met de huid zamenhan-
 gen, uitbreidt; de nagels ontaarden, worden dik,
 bultig, krommen zich over de vingertoppen,
 splijten, vallen van tijd tot tijd af, en worden
 door andere ziekelijk gevormde vervangen. De in
 omvang toenemende knobbels der andere ligchaams-
 deelen hebben eene oneffene oppervlakte met platte
 of spitse punten, door diepe voren van elkander
 afgescheiden, en omringd door spataderen. De huid
 wordt vet, smerig en glinsterend; het celweeffel zwelt,
 verhardt en verwekt eene onmatige, zeer wanstaltige
 zwellling, meerendeels van een, zelden van beide de
 beenen; in dezen toestand draagt de ziekte den naam
 van olifantsvoet (*Elephantiasis artuum*: eene wijzi-
 ging der Grieksche olifantsziekte, die bij ons,
 alhoewel zeldzaam, van tijd tot tijd voorkomt en
 tot een der beenen beperkt blijft). Eenige dezer
 knobbels breken open en ontlasten zeer stinkende
 weivochten. Waar vroeger verhoogde gevoelig-
 heid bestaan heeft, grijpt gevoelloosheid plaats;
 de zinwerktuigen verzwakken, en kunnen alleen
 door sterke prikkels opgewekt worden. De aldus
 verkregene gewaarwordingen zijn verkeerd en mis-
 leidend. Ook de geestvermogens nemen af; de
 lijdens worden mismoedig en onaangenaam in den
 omgang met anderen, of vervallen tot den hoog-
 sten trap van onverschilligheid, zonder zich over iets
 te bezwaren; zonder eene klagt te uiten, verdra-
 gen zij alle ligchamelijke smarten en morele kwel-
 lin-

lingen. De ſtem wordt hoe langer hoe ruwer, heescher en onverſtaanbaarder. De geheele bewerktuiging neemt in de ziekte deel, en toch blijft de eetlust, de ſpijsvertering en de ſlaap goed, en de pols verraaft naauwelijks eenigerlei aandoening van het vaatſtefel. De toppen der vingeren en der teenen verſterven en vallen in het eerſte lid af, zonder wonden na te laten; want de huid trekt zich over den ſtomp van het overgeblevene lid zamen, en blijft in dien toefland, tot dat er wederom een volgend lid afvalt.

De onverzadelijke teeldrift, eigendommelijk aan de *Elephantiaſis*, die gedurende de middeleeuwen *Europa* teiſterde, en nog heden ten dage in de keerkringslanden woedt, ſchijnt de lijdens, welke naar *Europa* overgebracht worden, niet te kwellen; althans SCHEDEL en CAZENAVE verzekeren, dat zij bij het kleine getal van lijdens, in het hofpital *St. Louis* verpleegd, niet is waargenomen.

Derde tijdperk. De overgang in het derde tijdperk heeft plaats, wanneer al de toevallen ſpoedig voortgaande, eenen nog hooger trap bereiken. De bultachtige knobbels, die het aangezicht misvormen, bovenal den neus en de ooren wanſtaltig maken, ontſteken en gaan tot kwaadaardige verzweringen over; deze breiden zich over de neusholte uit en vernietigen de neusbeenderen door verſterving. De zweren ontlaſten eene groote hoeveelheid van zeer ſtinkenden weiachtigen etter, die zoo ſcherp is, dat hij alle deelen, langs welke hij afvloeit, of waarmede hij in aanraking komt, ont-

ontvelt; ook verdroogt dezelve hier en daar tot zamenhangende, dikke, vastklevende korsten. De verftervingen blijven niet meer tot de uiteinden der ledematen beperkt, maar geheele ledematen vallen af, zoodat het niet zeldzaam is, lijdens aan te treffen, die beide armen of beenen verloren hebben. Een of beide de oogen gaan door de zwarte ſtaar verloren.

Bij den Blanken is de huid affchuwelijker dan bij den Neger, zij wordt bruin, als door de zon verbrand, paars en blaauw (*Elephantiasis Tyria*, blaauwe melaatschheid) als met lakmoes geverwd; de wangen, de neus en de ooren zijn als met rood blanketfel of met ſap van roodekool beſtreken (*Lepra alopecia*, de roode melaatschheid). Ook tot deze hoogte geklommen zijnde, op welke de lijdens door de algemeene verbreiding der ziekte over het ligchaam het affchuwelijkſte beeld van menſchelijke ellende ten toon ſtellen, blijven eetlust en ſlaap vaak goed, en de pols ondergaat naauwelijks eenige verandering; ook de dierlijke driftten duren voort en nemen zelfs toe; de honger is onverzadelijk, de teeldrift niet te bevredigen; niet zelden brengen zij nog weinige uren voor hunnen dood aan den wellust hun offer.

De ziekelijke verandering der bewerktuiging, in de lijken van de ſlagtoffers dezer ziekte gevonden, verſchillen naar mate dezelve lang geduurd heeft of hevig geweest is. De knobbels, waarmede de huid bezet is, hebben zich of uit het weeffel der huid zelve, of uit het celweeffel, door ontſte-

steking ontaard, ontwikkeld. De huid, die de knobbels bedekt, is dun en flets; bij het doorsnijden bieden de knobbels tegenstand, hun weeffel is vast en wit van kleur. De lippen en het bindvlies der oogen zijn gezwollen en vreemdaardig gekleurd. Het slijmvlies der tong is verdikt en gekloofd, dat van het zachte verhemelte, van de lei en van het strottenhoofd groepswijze met knobbels bezet, die eene etterende punt hebben; de bekervormige kraakbeenderen zijn door bederf aangedaan, en de stemkoorden zijn vernield. Het slijmvlies van de maag en van de darmbuis zijn met zweertjes bezet, welke gedeeltelijk op de aanwezige knobbels, gedeeltelijk in de kliertjes van PEYER gezeteld zijn.

Ook de longen, de lever en alle andere ingewanden zijn ziekelijk aangedaan, en vaak met harde en onrijpe, of met etterende knobbels bezet. Noch de beenderen, noch eenig ander deel der werktuiging, ontgaat aan den vernielenden invloed der *Elephantiasis*, wanneer zij zich in den hoogsten trap heeft ontwikkeld. De beenderen zijn zonder merg en broos; de zamenhang der zachte deelen is zoodanig verzwakt en los, dat een gering geweld toereikend is, om geheele ledematen af te slooten.

De Grieksche Olifantsziekte, in de middeleeuwen Oorzaken.
zoo algemeen over *Europa* verbreid, dat men genoodzaakt was, een groot aantal inrigtingen, onder den naam van Leprozen- of Lazarus-huizen daar te stellen, is thans als oorspronkelijke ziekte in *Europa* eene zeldzaamheid geworden; met uitzondering van die weinige gevallen, waarin zij

zich als plaatselijke ziekte, onder den naam van Olifantsvoet ontwikkeld, of uit de Keerkringslanden naar *Europa* is overgebracht.

Beide geslachten, volwasfenen en kinderen, de laatste zeldzamer, zijn in de heete gewesten van *Afrika*, *Azië* en *Amerika*, vooral op de *West-Indische* eilanden, aan de Griekfche Olifantsziekte onderhevig. Zij erft van de ouders op de kinderen over. Somwijlen een geflacht overspringende, komt zij bij de kleinkinderen, van fchijnbaar gezonde ouders geboren, tevoorschijn. Zij ontwikkelt zich alsdan binnen de twee eerste jaren na de geboorte; fomwijlen brengen de kinderen de teekenen dezer ziekte mede ter wereld, en bezwijken in de vroegfte jeugd. In *Europa* en de gematigde streken der aarde, is zij niet befmettend; in de heete gewesten, haar tegenwoordig vaderland, daarentegen, wordt zij, even als de *syphilis*, door den bijflaap, door het zogen en iedere andere onmiddellijke en innige aanraking medegedeeld en verbreid. Men heeft hierin aanleiding gevonden, beide ziekten voor eenzelvig te beschouwen: eene ftelling, die de ervaring weêrspreekt.

Omtrent de oorzaken, welke in ftaat zijn de Griekfche Olifantsziekte oorfpronkelijk te verwekken, heerscht groote onzekerheid en veel verfchil. Over het algemeen befchuldigt men vochtigheid, onreinheid, nabijzijnde moerasfen, flecht ingerigte woningen, veelvuldig gebruik van gezouten of bedorvene dierlijke voedfels, zware tot gisting genegene

negene planten en hare voortbrengfels ; maar vooral het varkensvleesch en onrijpe bananen.

Europeanen , die in de keerkringsgewesten zeer onregelmatig leven , en op iedere wijze , bij alle voorkomende gelegenheden , hunne driften bevredigen ; de Negerflaven , die zich bijna uitsluitend met gezoutene en bedorvene visfchen , fchelpdieren en onrijpe bananen voeden , worden zeer menigvuldig de offers dezer ziekte. De Joden worden in eene gelijke verhouding met de Negers , de Franschen en Portugezen zeldzamer , nog veel minder menigvuldig de Hollanders en de Duitschers , de Engelschen bijna in het geheel niet , en de Amerikaanfche Indianen nimmer aangetast. De leefwijze en de verschillende betrekkingen fchijnen ten deze eenen befliffenden invloed uit te oefenen. De Indianen vreezen de ziekte en vlieden de krankten ; zij eten alleen verfche fpijzen , geene gezouten noch bedorvene dierlijke voedfels , geene onrijpe bananen , maar veel casfavebrood. Ten aanzien van het een en ander omtrent de oorzaken aangehaald , mag men , mijns bedunkens , voor waarfchijnlijk aannemen , dat een toevallige zamenloop van verschillende omftandigheden met gelijktijdige ftoornisfen in de natuurnatige affcheidingen en ontlastingen eene eigenaardige dyscrafie verwekken , waardoor de vatbaarheid voor de befmetting niet alleen verhoogd , maar tevens ook de oorspronkelijke ontwikkeling der Olifantsziekte , zonder befmetting en zonder overerving tot ftand wordt gebragt. Voorts , dat landeigene en in de verschillende leefwijzen der vol-

ken gegronde invloeden den vorm der Olifantsziekte verschillend kunnen wijzigen: de *spedalskhed* of *Radesyge* van *Noorwegen* en *Zweden*, de *Lijf-landsche* en *Holsteinsche* melaatschheid, de ziekte van de *Krim* en de roos van *Asturië* leveren de noodige bewijzen. Dat echter eene of eenige weinige algemeen werkende schadelijkheden zouden toereiken, om deze vernielende ziekte voort te brengen, behoort, mijns bedunkens, tot het pathologische bijgeloof.

Onderschei-
dingsteeken-
nen. Diag-
nosis.

Hoe ligt het ook zijn moge, de Olifantsziekte, voor hem, die ze eenmaal gezien heeft, te onderkennen en met geene andere ziekten te verwisfelen, zoo is het toch blijkbaar, dat dezelve in de fchriften der Geneeskundigen meermalen met de *lepra Graecorum* en de *elephantiasis Arabum* verwisfeld is. Van de eerste onderscheidt zich dezelve door de haar kenschetsende wankleurige en zwerende knobbels, verbonden met wanftaltige zwelling der lijdende deelen en ontaarding van de huid en het celweeffel; terwijl bij de *lepra* harde, drooge, uit schubben zamengestelde korsten, zonder belangrijke veranderingen van het huidweeffel aanwezig zijn.

Bij de *elephantiasis Arabum* vindt men geene knobbels, maar eene gelijkmatige en buitengewone zwelling van eenig deel, voornamelijk van een der onderste ledematen, met verharding en ontaarding der huid en het celweeffel.

Niet ligt zal men gevaar loopen, de venerische knobbels der Olifantsziekte te verwisfelen, wanneer
men

men de voorafgegane venerifche befmetting, de koperkleur der knobbels, hare geringere uitgebreidheid en de gelijktijdig aanwezige toevallen der algemeene *syphilis* behoorlijk op prijs weet te ftellen.

De Griekfche Olifantsziekte is in al hare gedaanten en wijzigingen eene zeer zware, hoogst zelden geneesbare ziekte. Door de lijdens uit de keerkringsgewesten naar de koude en gematigde te verplaatfen, wordt de voortgang der ziekte vaak vertraagd of opgehouden en het leven verlengd. Echter bereikt men niet altijd dit doel, en het ontbreekt aan geene voorbeelden, dat lieden in de *Indiën* met deze ziekte befmet, in *Europa* wedergekeerd, even fpoedig als daar, waar zij zich de ziekte op den hals hebben gehaald, ten grave daalden.

Voorzegging. Prognosis.

Wanneer flechts weinige knobbels aanwezig zijn, dan kan in dezelve eene kritifche reäctie door toevallig ontftane ontftekingen worden opgewekt, met het gevolg, dat de knobbels allengskens afnemen en ten laafte door opflorping geheel verdwijnen; of dat zij, tot verzwering overgaande, zich met korsten bedekken, die lang blijven zitten, en onder welke de veretterende knobbels met vaste, maar blijvende likteekens genezen.

Gewoonlijk is het beloop der Griekfche Olifantsziekte hoogst onaangenaam, en het einde treurig. De lijdens verzwakken meer en meer; hunne geestvermogens verdooven; verftoken van alle genoegens des levens, worden zij eene prooi van kwade

luim, kleinmoedigheid en wanhoop of van gevoel-
looze onverschilligheid, tot dat bijkomende hec-
tische koortsen en uitputtende ontlastingen hun lijden
met den dood doen eindigen.

Geneeskun-
dige behan-
deling.

De hoogst zeldzame genezingen der *elephantiasis Graecorum* bewijzen genoeg, dat de Geneeskunde
luttel, welligt niets tegen deze ziekte vermag; dat
ons hare geneesmiddelen even onbekend zijn als
hare oorzaken, en beiden waarschijnlijk in eenen
zamenloop van gunstige of ongunstige omstandig-
heden gelegen zijn.

Aangenomen, dat de *elephantiasis Graecorum*
tot de besmettende ziekten behoort, zoo kan het
niet anders dan raadzaam zijn, de voorbehoedende
geneeskundige hulpmiddelen, tegen de verbreiding
van andere besmettende ziekten met vrucht in het
werk gesteld, ook tegen deze te bezigen. Men
scheide derhalve de gezonden van de zieken af,
en verplege de laatsten op afgezonderde plaatsen,
buiten alle gemeenschap gesteld. In *Suriname* zendt
men de zieken naar de Boasiegronden, waar zij,
buiten gemeenschap, verpleegd worden, en alleen
in geval van volkomene genezing naar de kolonie
mogen terug keeren.

Volgens HASSELAAR is men op *Curacao* de ziek-
te geheel te boven gekomen, door de besmette
personen buiten alle aanraking te stellen. Ook wil
men, alhoewel het door HASSELAAR in twijfel
wordt getrokken, dat deze ziekte vroeger in de
kolonie van *Suriname* niet bekend is geweest,
maar zich daar heeft verbreid, sedert de Engelsche
eigenaars

eigenaars van plantaadjen negers van *Barbados* aanvoerden. Lieden, bij welke zich de eerste teekenen der ziekte openbaren, is het geraden, het land, waar zij de ziekte opdeden, te verlaten, en eene gunstiger landstreek tot woning te kiezen; zich tot ligt verteerbaren, voedenden kost te bepalen, met uitsluiting van alle gezouten, gerookte en sterk gekruide spijzen, van zamengestelde en kunstmatig door gisting bereide dranken, en tot lesfching van den dorst alleen goed, zuiver water te gebruiken; — veel beweging in de vrije lucht te maken, en wekelijks eenige keeren eerst warme, vervolgens leuke, en daarna koude baden te gebruiken. Men geve geene inwendige geneesmiddelen, dan in gevallen, waarbij complicatiën en duidelijke aanwijzingen voor het eene of andere geneesplan, volgens de regelen en voorschriften der algemeene ziektekunde aanwezig zijn.

In het begin der ziekte, en zoo lang er alleen vlekken met onpijnlijke zwelling aanwezig zijn, worden drooge wrijvingen, vlugge prikkelende smeersels en kwikzalven aangeraden, met oogmerk om de kwijnende levenswerkdadigheid in de lijdende deelen op te wekken, in eene andere stemming te brengen, en langs dien weg de genezing te bewerken. *BIETT* genas, van deze stelling uitgaande, eenen jeugdigen lijder, door het gebruik van spaansche vliegenpleisters, afwisselend en bij herhaling op de lijdende deelen gelegd.

De reeds meer ontwikkelde, maar nog steeds tot een enkel deel beperkte ziekte, heeft men in het

hospitaal *St Louis* door inwrijvingen met eene zelf, zamengefteld uit een scrupel *kali hydrojodium* en ééne once vet, met goed gevolg behandeld. Ook de plaatselijke dampbaden, gedurende 15 à 20 minuten op de lijdende deelen geleid, onder aanhoudend kneden der knobbels zijn met vrucht gebezigd. Bij eene meer algemeene verbreiding der knobbels over alle of vele deelen des ligchaams, zijn de warme water- en loogbaden te beproeven.

Is de ziekte het tweede tijdperk ingetreden, of heeft zij reeds het derde bereikt, dan bezige men uitwendig prikkelende wasfchingen, warme loog- of zwavelbaden, bezige zweetmiddelen en afkookfels van de geneeskrachtige houten, wortels en basten. Het *guajac*- en *sassafrashout* de *sasparilla* en hare bijfoorten, de bast van de *daphne mezereum*, en de *asclepias gigantea* worden bijzonder geroemd. Ook de arfenik-bereidingen inwendig, en het middel van *cosmus* uitwendig op de knobbels gelegd, en de fpaanfche vliegentinctuur worden aangeraden, zonder echter door welgeflaagde genezingen dezen raad te kunnen aandringen. De fpaanfche vliegentinctuur fchijnt bij de vrouwen gunstiger te werken dan bij de mannen. Bij beide geflachten is het noodig, wanneer men van dit middel gebruik wil maken, de urin-afcheidende werktuigen en de teeldeelen niet uit het oog te verliezen: zoo lang dezelve in eenen geprikkelden toestand verkeeren, mogen de fpaanfche vliegen niet worden aangewend. De veelmalen aanwezige geprikkelde toestand der flijmvliezen van de ingewanden,

den, die vaak zoo groot is, dat dezelve verzachtende middelen en *opiata* vordert, verbiedt, zelfs volgens de vrienden van het *arsenicum*, het gebruik van dit middel.

Van inwrijvingen met een tiende tot een vierde grein *urias auri et sodae*, maanden lang onder de tong volgehouden, wil men gunstige uitkomsten gezien hebben.

De geneeswijze van HEBERDEN, alhoewel door hem en anderen in slechts weinige gevallen met vrucht aangewend, schijnt mij toe de doelmatigste te zijn; zij heeft het voorregt, in de gevolgen geen kwaad te doen. Zij bestaat in de twee volgende voorschriften:

R. *Pulv. Cort. Per. Opt.*

—— *Ligni sassaf. ā unc i*

Syr. simp. q. s.

ut f. Elect.

van twee tot viermalen daags eenen paplepel.

R. *Spirit. vini unc viii*

Lixivae potassae unc i

Spirit. sal. ammon dr. ii.

m. s.

om de lijdende deelen mede in te wrijven.

Tevens wordt eene spaansche-vliegenpleister tusschen de schouderbladen gelegd en lang opengehouden.

b) *Molusca*. Uitwasfen.

Eruptio Fungoides. Pian Fongoïde ALBERTI

Élevures Folliculeuse RAYERI.

Ik heb den naam van uitwasfen gekozen, omdat Benaming.

dezelve mij toefchijnt de geaardheid der ziekelijke voortbrengels beter aan te duiden, dan die van sponsgeswellen; te meer daar men bij ons gewoon is, aan het woord sponsgeswel eene geheel andere beteekenis te geven, en het weeffel der *molusca* in geenen deele met gene overeenkomt.

Geschiedenis. WILLAN en BATEMAN waren de eerste, die de *molusca* als eenen bijzonderen ziektevorm beschreven, en dezelve eene plaats in de orde der knobbels aangewezen hebben. Met uitfluiting van RAYER hebben de latere schrijvers dit voorbeeld gevolgd. Echter moeten de *molusca* geenszins als eene nieuwe ziekte beschouwd worden; zij was onder verschillende benamingen en rangschikkingen bekend en beschreven, waarvan de afbeeldingen door CH. F. LUDWIG ten bewijze strekken.

Bepaling. Niet zeer harde, knobbelachtige geswellen van een meer of minder vast vezelachtig weeffel, somwijlen met eene kleine holligheid voorzien, die een melkachtig vet bevat. Zij ontwikkelen zich uit het weeffel der huid zeer langzaam, het talrijkst en bij voorkeur in het aangezicht en aan den hals. Bedekt door de algemeene bekleedfelen behouden zij de natuurlijke huidkleur. Somwijlen wordt deze echter van eene donkere tint, ja hoogbruin. Zij zijn zeer langdurig, vaak blijvend gedurende het geheele leven. Hunne grootte is vanden omtrek eener erwt tot die eener hazelnoot of van een duivenei; de gedaante is rond, heel of half kogelvormig, plat, eirond of peervormiglang, door eene breede platte grondvlakte met de huid vereenigd, of gesteeld en afhangend

(*moluscum pendulum*). Gewoonlijk , in een groot aantal aanwezig zijnde , vindt men dezelve gelijktijdig bij een en hetzelfde voorwerp in alle gedaanten en grootte. Zij zijn over het geheele ligchaam verbreid ; tot één of eenige deelen beperkt.

Twee verscheidenheden der *molusca* worden gewoonlijk aangenomen ; het zijn deze :

1. *Molusca vulgaris*. De gewone uitwasfen.
2. ——— *contagiosa*. De befmettende uitwasfen.

1. *Molusca vulgaris*. De gewone uitwasfen.

Onpijnlijke , boven de huid verhevene gezwollen van een vezelachtig weeffel , in een groot aantal over de geheele of gedeeltelijke oppervlakte des ligchaams verbreid , door eene breede grondvlakte of door eenen steel met de huid vereenigd , van verschillende grootte en gedaante. De ontwikkeling der knobbels wordt door eenen ziekelijken toestand der bewerktuiging voorafgegaan. Het is eene langdurige , moeilijk geneesbare , maar zeer zelden voorkomende ziekte. Men heeft dezelve bij beide geslachten , bij kinderen en bij volwasfenen waargenomen. Somwijlen komt zij met andere huidziekten verbonden voor. In het hospitaal *St. Louis* heeft men haar , met *prurigo senilis* verbonden , waargenomen.

Bepaling ,
geaardheid
en beloop.

BIËTT maakt nog gewag van eene wijziging der *molusca* , die bij jonge vrouwen in het kraambed

voor-

voorkomt. De gezwelletjes zijn plat, klein, met onregelmatig gespletene punten; zij hebben eene bruine of roodgele kleur, zijn onpijnlijk en zeer talrijk aan den hals. Ook op de handen heb ik dezelve bij kraamvrouwen meermalen en in grooten getale gezien. Zij worden in deze gevallen gewoonlijk voor wratten beschouwd en aan de natuur overgelaten; na verloop van tijd worden ze droog en vallen af.

2. *Molusca contagiosa*. De besmettende uitwasfen.

Bepaling,
geaardheid
en beloop.

Harde, gladde, kegel- of langwerpige gezwel-
len, van de grootte eener erwt tot die eener hazel-
noot; talrijk over het geheele ligchaam verbreid,
met de huid door eene breede grondvlakte of door
eenen steel vereenigd en afhangend. Eenige behou-
den de natuurlijke kleur der huid, andere zijn
bruin, andere wit glinsterend en half doorschijnend;
een melkachtig vocht bevattende, dat door druk-
king uit eene kleine aan de punt aanwezige opening
kan ontlast worden, en het voermiddel van eene
ergere smetstof schijnt te zijn. Ook in deze ge-
daante zijn de *molusca* zeer langdurig en blijven
jaren lang onveranderd staan, verbonden met eenen
algemeen ziekelijken toestand, koortsachtige aan-
doeningen, zwelling der halsklieren en vermagering.
Ontstekingen, door in- of uitwendige oorzaken
verwekt, brengen de knobbels tot verzwering en
de genezing volgt met een likteeken.

BATEMAN, die het eesrt de besmettende geaard-
heid

heid van deze wijziging der *molusca* heeft aangenomen, deelt de geschiedenis mede van het geval eener jonge vrouw, het origineel der door hem geleverde afbeelding. Zij had den uitslag van haren zuigeling gekregen, die op de wang eenen grooten knobbel had. Dit kind was vroeger door eene andere minne besmet geworden, wier aangezicht met dezelfde foort van knobbels bezet was, en die aan nog twee kinderen uit dezelfde familie den uitslag had medegedeeld. In een ander geval, door BATEMAN waargenomen, werd een jong kind door een ander, dat ouder was en het eerste had opgepast, besmet. Ook CARSWEL deelt een geval mede, dat de besmetting buiten twijfel schijnt te stellen.

De besmettende *molusca* schijnt nog zeldzamer dan de gewone te zijn; buiten de gevallen van BATEMAN en CARSWEL vindt men geene beschreven; RAYER zegt, dezelve nooit gezien te hebben. Intusschen moet ik hierbij aanmerken, dat mij meer-malen kinderen en jonge lieden zijn voorgekomen, bij welke eene groote menigte *molusca* in het aangezicht en aan den hals aanwezig waren, die zich door de fijne opening aan de punt, de witte kleur en de melkachtige ontlasting, als zij gedrukt werden, als de besmettende kenschetsste, zonder dat zij zich immer aan andere personen hebben medegedeeld.

Uitgezonderd de besmetting, indien deze voor Oorzaken. bewezen mag gehouden worden, weet men niets met eenige zekerheid omtrent de voortbrengende oorzaken der *molusca*. In de mij voorgekomene
ge-

gevallen, die ik meen tot deze ziekte te mogen brengen, waren steeds de algemeene kenteekenen der *scrophulosis* aanwezig; ik hield dezelve voor gewrochten dezer ziekte, en behandelde dezelve diensvolgens.

Onderschei-
dingsteeken-
nen.
Diagnosis.

De vorm, de gedaante, de kleur en het geheele beloop vereenigd, maken het geenszins moeilijk de *molusca* van de *elephantiasis*, de *framboesia* en de venerifche knobbels te onderscheiden. Eerder zoude het mogelijk zijn, dezelve met die kleine pap- en honiggezwellen te verwisfelen, welke somwijlen in verschillende getallen en grootte op eenig ligchaamsdeel voorkomen.

Voorzegging.
Prognosis.

Wat het gevaar betreft, is de voorzegging bij de *molusca* gunstig. Betrekkelijk den duur is het anders gelegen: deze is onbepaald, vaak levenslang. Bij de besmettende *molusca* is de voorzegging min gunstig, want deze is even hardnekkig en langdurig als de vorige, maar tevens, door den dieper gekrenkten toestand der geheele bewerktuiging, de gezondheid verwoestend en het leven in gevaar brengend.

Behandeling. Het kleine getal van waarnemingen, als een gevolg der zeldzaamheid van deze ziekte, maakt het moeilijk een vast geneesplan te ontwerpen. Biërr heeft vele geneesmiddelen tegen deze ziekte beproefd, maar slaagde er nimmer in eene genezing tot stand te brengen. Mijne behandeling had tot doel, de gezwellen weg te nemen, het zij door afsnijden, afbinden, of, en wel voornamelijk, door het bestrijken met zeezoutzuur. Gelijktijdig werden in-

inwendig kwik- en spiesglasmiddelen gegeven ; later , waar het de algemeene gesteldheid der lijders vorderde , afkookfels van den kina-bast en *sassa-parilla* , met bijvoeging van een loogzout bij kinderen , toegediend. De uitkomst in de dus behandelde gevallen , die , wel is waar , niet de hoogte van de door LUDWIG en BATEMAN afgebeelde bereikt hadden , was van dien aard , dat ik mijne behandeling mag aanbevelen.

Bij de besmettende *molusca* heeft BIËRT , door prikkelende , zamentrekkende wasfchingen , verbetering , en bij eene jonge vrouw de genezing tot stand gebragt door wasfchingen , die dagelijks eenige keeren herhaald werden , met eene oplossing van blaauwe vitriool. BATEMAN fchijnt door het gebruik der arsenic-tinctuur van FOWLER eene gunstige werking verkregen te hebben.

c.) *Framboesia*. *Framboesia batoïdes*.

Pokken van de Goudkust. Frambozen-uitslag.

De gelijkenis van deze huidziekte op aardbeziën en frambozen hebben haar den naam van frambozen-uitslag doen geven. Het waarschijnlijke vaderland van deze ziekte is *Afrika* , vooral een gedeelte der kust van *Guinea* , van waar zij haren naam van pokken der Goudkust ontleent.

Naam.

De frambozen-uitslag is thans niet meer tot Afrika bepaald , maar tot eene *endemische* ziekte der keerkingslanden van *Azië* en *Amerika* geworden , zoo ver zich de handel der Christenen in negerflaven heeft uit-

Geschiedenis

uitgebreid. In *Europa* komt zij nimmer als oorspronkelijk ontwikkelde ziekte in den vorm des keerkrings frambozen-uitlags voor, maar alleen als eene ziekte hier ingevoerd door de uit dielanden komende besmette personen. Intusschen bestaan er twee ziekten in *Europa*, eigen aan bijzondere gewesten, welke tot den frambozen-uitlag schijnen te behooren, namelijk, de *Sibbens* in *Schotland* en de *Scerlievo* in *Illyrië*. Daar het moeilijk is aan beide deze ziekten hare regte plaats aan te wijzen, en zij met de *Framboesia* der keerkringen de meeste overeenkomst hebben, zoo komt het mij niet ondoelmatig voor, dezelve hier ter plaatse als Europeesche wijzigingen des frambozen-uitlags (*Framboesia Europea*) te behandelen.

Reeds aan de Arabieren waren de *Framboesia*, volgens K. SPRENGEL, onder den naam van *Safath* bekend. In de middeleeuwen vindt men dezelve *variola magna* (groote pokken) genoemd, ter onderscheiding van de gewone kleine of kinder-pokken, waarmede zij, behalve haar slepend en langdurig beloop, groote overeenkomst hebben. Bij de oudere schrijvers, die het eerst van de *Framboesia* gewag maken, vindt men ze in verband gebragt met *elephantiasis* en melaatschheid. WILLAN en BATEMAN hebben haar eene plaats onder de knobbelachtige huidziekten aangewezen.

Bepaling. Korrelachtige, aan de breedere grondvlakte zamenhangende, aan de punten gespletene en verdeelde zwerende sponsachtige uitwassen van verschillende grootte, gelijkende naar beziën, welke de Joden

op hare oppervlakte dragen, of naar kleine bloemkooltjes, waarvan de bloemknopjes nog niet ontwikkeld zijn. De *framboesia* wordt steeds door algemeene ziekte-verschijnselen voorafgegaan en vergezeld. De uitbotting, die eerst in peukels bestaat, welke vervolgens in puisten overgaan, alvorens zich de sponsachtige uitwasfen ontwikkelen, schijnt de *crisis* eener algemeene ziekte te zijn; want met eene volledige uitbotting laten de algemeene ziekte-verschijnselen na, en keeren met grootere hevigheid terug, wanneer gene in haar beloop gestoord of onderdrukt worden.

Waarschijnlijk staat de *framboesia* onder den ^{Algemeene} invloed der betrekkingen, waarin de mensch ^{eigenaardig-}leven ^{heden.} moet, van het klimaat, de voedingswijze en van andere toevalligheden. Alhoewel de genoemde omstandigheden alleen de ziekte niet kunnen voortbrengen, noch geheel van gedaante veranderen, zoo hebben zij toch ten gevolge, dat zich de *framboesia* in de keerkingslanden in twee wijzigingen voordoet, namelijk, in die der *Yams* en die der *Pians*. Naar aanleiding der beschrijving van beide ziekten, door verschillende Geneeskundigen gegeven, welke dezelve in haar Vaderland, zoo wel in de verschillende tijdperken van haar beloop, als in haren hoogsten trap van ontwikkeling, hebben gadegeflag, schijnt er zulk eene groote overeenkomst tusfchen beiden te bestaan, dat men ze niet anders dan voor ééne ziekte houden kan; terwijl intusfchen de verscheidenheden, in de toevallen en het beloop voorkomende, ten volle regt geven, om de *Yams*,

zoo als die door de Engelsche Geneesheeren in *Afrika* en *Amerika* zijn waargenomen en beschreven, en de *Pians*, die de Fransche Geneesheeren, zoo als zij die te *St. Domingo*, *Guadeloupe*, *Brazilië* en *Jamaica* waarnamen, hebben doen kennen, als twee verschillende wijzigingen van dezelfde ziekte aan te nemen.

Men heeft de *framboesia* der keerkringen als eene gewijzigde *syphilis* willen beschouwen. Haar geheel beloop, echter, hare genezing door de natuur en de schadelijkheid der kwikmiddelen, zijn toereikende bewijzen om het tegendeel aan te nemen. Meer gronden van waarschijnlijkheid pleiten voor het gevoelen van BLASIUS en anderen: dat de melaatschheid en de *framboesia* na-verwante ziekten zijn, aangezien de *Yams* onder ongunstige omstandigheden in de *lepra Graecorum*, en de *pians* in de *elephantiasis* ontaarden.

I.

Sycosis Indica, anthracia tubula. Yams.

Deze, in *Afrika*, *Oost- en West-Indiën* endemisch en menigvuldig voorkomende huidziekte, wordt door voorboden voorafgegaan, welke de nadering der uitbotting kenbaar maken. Gewoonlijk bestaan de eerste voortekenen in een ruim zweet, groote afgematheid, onrustigen, door hevige beenpijnen en benaauwde droomen afgebrokenen slaap en buitengewone neêrslagtigheid. Daarna volgen onregelmatige koortsaanvallen; de eetlust gaat verloren, of is buitengemeen groot en met vreemde lusten verbonden, dien de lijders met krijt, kolen,

aarde , enz. trachten te bevredigen. Nadat deze verschijnselen van eenige dagen tot eenige weken geduurd hebben , volgt eene eerste uitbotting van allengskens grooter wordende peukelachtige knobbeltjes , niet ongelijk aan die der kinderpokken. Wanneer zij in het aanzigt zeer talrijk zijn , dan zwelt het geheele hoofd sterk op. De hals , vooral in den omtrek van het strottenhoofd de okselholte , de omtrek van den aars en de schaamfreek , zijn het meest met uitslag bezet ; echter worden ook alle andere deelen er door aangedaan. Het getal der knobbeltjes en derzelver grootte staan doorgaans in eene omgekeerde verhouding tot elkander. Gedurende eenige maanden volgen nieuwe uitbottingen , die het getal der peukels vermeederen en meer algemeen over het ligchaam verbreiden. De eerst opgekome ne knobbeltjes zijn bij de latere uitbottingen gedeeltelijk reeds verdroogd , gedeeltelijk in etterpuisten overgegaan. Zoodra er geene nieuwe uitbottingen meer volgen , nemen de algemeene ziekte-verschijnselen af , om vervolgens geheel na te laten , met uitsluiting der beenpijnen , die gemeenlijk blijven voortduren. De eerst harde knobbeltjes hebben bij de blanken eene paarsche , bij de Negers eene aschgrauwe kleur , maar kunnen ook alle schakeringen tuschen rood en blaauw aannemen. Somwijlen zijn de knobbeltjes met een roodachtig slijm bedekt. In den beginne zijn dezelve niet grooter dan eene gierstkorrel of een hennipzaadje , maar worden allengskens grooter en bereiken den omtrek eener framboos tot die eener hazelnoot. Zij hebben eene breede grondvlakte ,

vloeijen , waar zij gedrongen staan , tot eenemasle te zamen. De punt wordt geelachtig wit , en langzaam voortgaande neemt de geheele knobbel deze kleur aan , en verandert in eene etterpuist , die op de etterende kinderpokken gelijkt , eenen dikken , witten , taaijen , scherpen etter bevat , openbreekt , en zich met eene dikke , vuile roof bedekt. Deze roven weggenomen zijnde , vindt men zweren , met dikke , aanmerkelijk boven de huid verhevene en zemelachtig bepoederde randen. In den hoogsten trap van ontwikkeling ontaarden deze zweren in roode spons- en korrelachtige uitwasfen , welke op frambozen gelijken en zoo groot als , of grooter zijn dan deze. Andere zweren worden grooter , knagen de nabij gelegen zachte deelen weg , openen de aanwezige spataderen , gevolgd door belangrijke bloedstortingen ; in den omtrek worden de haren wit (door THOMSON wordt dit tegengesproken) ; in de neus- en mondholte gelijken de zweren op die der *syphilis*. Gewoonlijk ontstaat er op ééne plaats , en wel in den omtrek der gewrichten , door verettering van zamengevloeiide knobbels en puisten , eene grootere zweer , die dieper in het huidweeffel indringt , eene vuile korstachtige oppervlakte heeft , en eenen dunnen , vuilen etter afscheidt , die zoo fcherp is , dat de nabijgelegene deelen , langs welke hij afvloeit , ontveld worden. Deze van alle andere door haren omvang onderscheiden zweer wordt door de Negers *mama yams* genoemd ; want zij houden deze voor het brandpunt der ontwikkeling en uitbreiding des uitflags , en als een zuiverings-werktuig ,

waar-

waarvan de natuur zich ter genezing bedient ; ook mag dezelve , blijkens de ervaring , niet vroegtijdig opgedroogd worden. Naar mate de knobbels tot verettering overgaan , nemen de pijnen en de ontsteking af , en verwekken dan alleen pijn , wanneer zij gedrukt of op eene onzachte wijze aangeraakt worden ; vooral vindt dit aan de voetzolen bij het gaan plaats. Meermalen nemen de zweren aan deze deelen eene zeer slechte geëardheid aan ; door sponsachtige vleeschgroeiing bedekt en door harde randen omgeven , ontstaat er eenige gelijkenis met de voeten der krabben , en zoowel deswege , als uit hoofde van den moeilijken gang der lijders worden zij *crabbe yams* genoemd. Wanneer in den omtrek der zweren de huid zeer dik is , door spat aardige bloedaderen omgeven , als de randen schilferen en de zweren met een droog , lederaardig , wit vleesch bezet zijn , noemt men ze drooge krabbe (*crabae siccae*) , en als zij eene vleeschkleur hebben , *crabae virides*. Ook gebeurt het , dat er maar ééne *yams*-zweer aanwezig is , zonder door algemeene uitbotting gevolgd te worden , mits men dezelve ongemoeid late ; want , ontijdig genezende , volgen er algemeene uitbottingen , die zich door kwaadaardigheid en hardnekkigheid onderscheiden.

Voor kinderen zijn de *yams* eene minder hevige ziekte dan voor volwassnen : bij de eersten verloop en zij spoediger , binnen den tijd van zes tot negen maanden , terwijl zij bij de laatsten zelden korter dan een jaar , vaak van twee tot drie jaren duren.

Bij lieden van het lymphatische temperament gaat de ontwikkeling en uitbreiding der *yams* ſchielijker voort. Ook bij dikke goedgevoede Negers bereiken de ſponsachtige knobbels ſpoediger hun toppunt, en worden grooter dan bij magere.

Wanneer geene nieuwe uitbottingen meer plaats grijpen, en de aanwezige knobbels niet grooter worden, dan heeft de ziekte haar toppunt bereikt; gewoonlijk geſchiedt zulks in den tijd van eenige weken tot eenige maanden; de knobbels blijven alſdan gedurende langen tijd onveranderd ſtaan, en de lijdens genieten daarbij eene tamelijke gezondheid. Mogen zij daarbij zich in eene goede verpleging en doelmatige geneeskundige behandeling verheugen, dan droogen de zwerende knobbels allengs op, en worden zonder likteekens na te laten genezen. Verkeeren de lijdens daarentegen in ongunſtige omſtandigheden, dan nemen de zweren ſteeds in omvang toe, het verlies van vochten put de krachten uit, er ontwikkelt zich eene hecetiſche koorts met zenuwtoevallen; verlammingen van enkele deelen komen daarbij, de ſtem gaat verloren, het geheugen verzwakt, er ontſtaat menigwerf watervrees; zuchtige zwellingen, etterachtige ſlijmlozing, kwalijk riekende adem en beenbederf grijpen achterevolgens plaats, en maken, in verband met uitputtende ontlaſtingen, een einde aan het leven.

II.

Pians, Thymosis Indica. Pians ruboïde

ALIBERTI.

De westkust van *Afrika* is het vaderland der *pians*. In het koninkrijk *Sanguin* heerschen zij endemisch, en het is van daar, dat zij door de Negerslaven naar *West-Indië* en *Brazilië* zijn overgebracht. De *pians* zijn minder algemeen verbreid dan de *jams*, en tasten zeldzamer dan deze de blanken aan. De uitslag der *pians* heeft een meer herpetisch voorkomen en beloop dan de *jams*, maar wordt, even als deze, door koorts, beenpijnen, lusteloosheid en neêrslagtigheid voorafgegaan, welke toevallen nalaten, zoodra de uitbotting heeft plaats gehad, en de uitslag in haar beloop niet gestoord wordt. De Fransche Geneesheeren onderscheiden drie soorten van *pians*, namelijk: de groote of witte, de kleine en de roode. Het zijn toevallige wijzigingen, die alleen in grootte en kleur van elkander verschillen, zonder wezenlijke verscheidenheden te bezitten. Onmiddellijk aan de uitbotting van den herpetisch afschilferenden, zeer pijnlijken uitslag, gaat een knagend en brandend gevoel in de huid vooraf; de teeldeelen, de liezen, de okselholten en de omtrek van toevallig ontstane zweren en wonden worden het eerst en het menigvuldigst aangedaan. Spoedig na deze uitbotting ontwikkelen zich kleine ronde knobbeltjes, ter grootte van eene gierstkorrel; later krijgen zij eene witte kleur, breken door,

ontlasten een geel weivocht, maar geen' wezentlijken etter, en gaan tot zweren over, die den omtrek van een' daalder bereiken, en op hare oppervlakte in sponsachtige uitwassen ontaarden. Deze zijn of wit van kleur en korrelachtig als de bloemkool (witte *pians*), of rood gekleurd (roode *pians*), welke laatste voor belangrijker en gevaarlijker dan de eerste beschouwd worden. Aan zich zelve overgelaten, worden de zweren grooter en kwaadaardig, en gaan gelijk de *yams* in andere gevaarlijke ziekten over. De nachtelijke beenpijnen treden in de latere tijdperken der *pians* nog meer op den voorgrond, en gaan met zwelling en weekworden der beenderen gepaard, welke echter niet, gelijk bij de *yams*, door beenbederf gevolgd worden. Vooral grijpen deze toevallen plaats, wanneer de uitslag ontijdig van de huid verdreven wordt. Complicatiën met de *syphilis*, met den scheurbuik en de *elephantiasis Graecorum* en *Arabum* maken de *pians* zeer hardnekkig, gevaarlijk en vaak doodelijk. Hevige pijnen met een' herpetischen uitslag, verstijving der vingerleden en der teenen, pijnlijke zweren rondom de nagels, met verdikking der huid van de handpalmen en de voetzolen, stellen nog eene andere, menigwerf voorkomende wijziging daar. Door ineenvloeiing van kleinere zweren ontstaat hier of daar eene groote zweer (*mama pian*), die in de diepte en in den omtrek de zachte deelen wegknaagt. Roode sponsachtige uitwassen, door diepe kloven verdeeld, ontwikkelen zich op hare oppervlakte, en ontlasten eene

groot-

groote hoeveelheid scherpe vochten; de randen zijn dik, verheven en schilferend.

In de lijken der aan de *yams* en aan de *pians* overledenen vindt men de huid verdikt, lederaardig of spekachtig en gespleten; in het celweeffel talkachtige klompjes vet, kaasachtige en kleine onregelmatige ophooping van knobbelftof en schijnvliesachtige weeffels; altemaal verschijnselen, welke eenen voorafgegaan ontstekingsstoestand van het celweeffel kenbaar maken. De watervaatklieren zijn vergroot en ontaard of gedeeltelijk verdwenen; somwijlen zijn geheele ingewanden in eene witte scirrheuse of kaasachtige massa veranderd.

De aanleg en de gelegenheidgevende oorzaken, welke het ontstaan der *yams* en der *pians* begunstigen, hebben buiten twijfel haren grond in de leefwijze, in het klimaat, in de landeigene omstandigheden en in de eigendommelijkheden der menschenrassen en der volksstammen. Maar waarin dezelve eigenlijk bestaan, en op welke wijze de bewerktuiging door dezelve aangedaan wordt, blijven voor alsnog raadsels. Dat de *yams* en de *pians* door besmetting worden medegedeeld, is niet te betwijfelen; evenmin dat de smetstof in de zweren wordt toebereid, en dat de daardoor afgescheidene vochten de voermiddelen van de smetstof zijn.

Door middel van inenting heeft THOMSON de *yams* voortgebracht. Door gemeenschappelijk verkeer breidt zich de besmetting onder de Negers uit; insgelijks wordt dezelve medegedeeld door andere

Oorzaken.

innige aanraking, vooral van deelen, die eene dunne opperhuid hebben of daarvan ontbloot zijn: door den bijlaap, door het zuigen, kussen, enz. Ook door infekten kan de smetstof worden medegedeeld, te eer bij den Neger, die zijnen arbeid met ontbloot bovenlijf en onbedekte ledematen verrigt, en daarenboven vaak door zwaren arbeid en zweepslagen met versche wonden en zweren bedekt is, welke de infecten tot zich lokken. Of het alleen aan deze omstandigheden moet worden toegeschreven, dat de Negers en Kleurlingen meer dan de Blanken aan de *yams* en de *pians* onderhevig zijn; of dat, ten gevolge van de verscheidenheden der rasfen, de vatbaarheid om besmet te worden bij den eenen meer ontwikkeld is dan bij den anderen, is nog onbeslist. Dat echter iets van dien aard bestaat, is hoogst waarschijnlijk, aangezien anders de Blanken, wegens hunne veelvuldige vleeschelijke vermengingen met Negerinnen, Mulattinnen en andere Kleurlingen, meermalen moesten aangetast worden.

De eenmaal doorgestane *yams* en *pians* beveiligen tegen volgende besmettingen, mits de ziekte haren loop geregeld heeft ten einde gebragt. De weinige daartegen ingebragte gevallen schijnen alleen te bewijzen: dat de smetstof der *yams* en der *pians* even als die der kinderen- en koepokken na die ziekten eenmaal gehad te hebben, door hare scherpte eene plaatselijke, spoedig voorbijgaande reäctie verwekken.

De tijd, die tusschen de besmetting en de uitbot-

botting verloopt, is onbepaald van duur: eene dame werd eerst tien maanden, nadat zij de *West-Indiën* verlaten had, op *Madera* door de *yams* aangetast; — THOMSON deelt het geval mede van gezonde Negers, die met hunne kinderen naareene suiker-plantaadje werden overgebracht, en het middagmaal hielden met de tot dezelve behoorende Negers, die door de *yams* waren aangetast. Na verloop van zeven weken werden drie der aangekomenen door de voorboden en daarna door eene uitbotting van *yams* aangetast; drie weken later werden het al de overigen: allen genazen in een tijdsverloop van acht maanden. Ook entte THOMSON een kind in met etter, uit eene *yams*-zweer genomen, die hij te voren van hare roof ontdaan had. Drie der vijf inëntings-wondjes genazen; de andere geleken, drie weken daarna, op eene kras. Vervolgens ontstonden kleine zweertjes, die ten laatste een gangreneus voorkomen kregen; zeven weken daarna kwamen peukels in het aangezicht en over het geheele ligchaam te voorschijn. Sponsachtige uitwasfen ontwikkelden zich; er greep eene talrijke uitbotting plaats, die negen maanden duurde. Ook heeft THOMSON een kind ingeënt met kinderpokstof, genomen van eene jonge Negerin, die tevens met *yams* bezet was. Het kind kreeg goedaardige pokken, maar werd na de genezing door de *yams* aangetast. Inëntingen met het bloed van eenen aan *yams* lijdenden Neger, bij vier kinderen op verschillende plaatsen, bleven zonder werking. Zelden worden de *yams* en de *pians* doodelijk; Voorzegging.

maar

maar gewoonlijk zijn het langdurige ziekten. De eersten worden veelmalen door de natuur of door eene doelmatige verpleging genezen; alleen in de zwaarste gevallen schijnt geneeskundige hulp noodig te zijn. De *moeder-yams* kan, door diep in te zweven, in de nabijheid der gewrichten verstijving van dezelve en andere belemmeringen in de beweging terug laten. Onder ongunstige omstandigheden en complicatiën met scheurbuik en *syphilis* kunnen de *yams* gevaarlijk voor het leven worden.

De *pians* daarentegen worden niet door de natuur genezen en vorderen eene krachtige geneeskundige behandeling. Bij de Blanken zijn beide ziekten, de *yams* en de *pians*, minder gevaarlijk en belangrijk dan bij den Neger.

Behandeling. De geneeskundige behandeling der *yams* en der *pians* is dezelfde; alleen met dit onderscheid, dat de laatste eene meer werkdadige, en de eerste eene meer afwachtende geneeswijze vorderen. Bij beiden moet zorg worden gedragen, dat zij niet ontijdig onderdrukt worden; want alhoewel dezelve tot de slepende huidziekten behooren, volgen zij toch, gelijk de heete huidziekten, een aan regelen en tijd gebonden beloop, hetwelk de natuur zich niet ongestraft laat betwisten. De groote verscheidenheden, die men in de behandelingen ontwaart, aangeraden door Geneesheeren, die in de gelegenheid waren de ziekte zelve gade te slaan, bewijzen, dat er nog geene geneeswijze der *yams* en der *pians* bestaat, welke op vaste grondslagen rust.

Betrekkelijk de verpleging der zieken, trachte men

men alle schadelijkheden te vermijden, en door eenen goeden, niet prikkelenden leefregel, reinheid, doelmatige woning en menschelijke behandeling der lijdende flaven, der natuur te gemoet te komen, den tijd afwachtende, dat de ziekte haar toppunt bereikt heeft, en geene nieuwe uitbottingen meer plaats grijpen. Eerst dan, en niet vroeger, geven men de uitwasemingbevorderende middelen, de *sassaparilla*, het *guajac*-hout, de zwavel- en de spiesglasbereidingen. Bij de *pians* voege men de kwikbereidingen tot genoemde middelen, maar drage zorg, dat er geen speekselvloed ontsta. Bij de *yams* in het algemeen, en bij de *pians* te vroeg gegeven, heeft de ervaring de kwikmiddelen als schadelijk leeren kennen. Dezelve bewerken wel eene kortstondige verbetering, maar daarna wordt de ziekte hardnekkiger en kwaadaardiger. Ook vindt men de *proto-* en *deuto-jodureta hydrargyri* en de *arsenik*-bereidingen aangeraden.

Wanneer *cachexiën* en *hectische* koortsen plaats grijpen, moet de leefregel voedend en opwekkend, de geneeswijze versterkend en vochtverbeterend zijn.

Voor de plaatselijke behandeling vindt men versterkende en zamentrekkende afkookfels, algemeene en plaatselijke warme water- en dampbaden aangeraden. De *mama-yams* en *mama-pians* vorderen krachtiger plaats-middelen en oplossing van wit vitriool, terwijl de *krabbe-yams* de bijtmiddelen, het salpeterzure zilver, het poeder van *COSMUS* en het gloeiende ijzer vereischen.

III.

Framboesia Illyrica Falcaldina. Illyrische
 Frambozen-uitslag. De ziekte van
Scherlievo.

Naam.

De meest bekende naam van den *Illyrischen* frambozen-uitslag is: ziekte van *scherlievo* of *scarlievo*, naar het dorp van dien naam in de nabijheid van *Fiume*. Naar het gewest *Illyrië* en *Croatië* en naar bijzondere plaatsen, als *Fiume*, *Brens*, *Falca* en *Grobaich*, draagt zij de namen van *morbus croaticus*, *fiumensis*, *framboesia falcaldina* enz., uit hoofde dezelve het eerst in eene dezer plaatsen of in alle te gelijk is waargenomen. Ziekte van *Margaritzza* wordt zij genoemd naar een openbaar vrouwsperfoon, die den naam van *Margaritha* voerde en gehouden werd de uitbreiding der ziekte bevorderd te hebben. Daar men in den beginne de *scherlievo* voor eene wijziging der venusziekte hield, ontving zij den naam van *morbus syphiliticus ulcerosus*, en dien van *morbus contagiosus scabioso-venereus*, en *scabies venerea contagiosa* wegens de onderstelde oorzaak, gegrond in de vereeniging der *syphilitische* en *scabieuse* smetstoffen. Naar de gedaante des uitlags en het gewest harer geboorte, heet zij *framboesia illyrica*.

Geschiedenis.

De *scherlievo* is thans op de kust van *Illyrië*, van *Ragusa* tot *Triëst* en *Fiume* eene endemische ziekte voor zoo verre dezelve door den *Slayonischen* volksstam bewoond wordt. Zij is eene nieuwe ziekte, die eerst na het einde van den *Turkschen*

oor-

oorlog in het jaar 1790 bekend werd. Althans het is verre af van waarschijnlijk te zijn, dat de ziekte, die in het jaar 1577 te *Brun* in *Moravië* heerschte en weder verdween zonder sporen na te laten; na ruim twee eeuwen op nieuw, en wel in een van daar ver verwijderd gewest, te voorschijn zoude gekomen zijn. Geschiedkundige bewijzen pleiten voor de meening, dat deze ziekte genoegzaam gelijktijdig door *Oostenrijksche* zeefoldaten te *Scherlievo* en door de manschappen van eenen *Franschen* kaper te *Breno* is ingevoerd en verbreid, zonder diep landwaarts in te dringen. Binnen eenen korten tijd werden vele kustbewoners uit den behoeftigen volksstand, zonder onderscheid van geslacht en ouderdom aangetast. In het jaar 1800 heerschte de ziekte epidemisch, en men telde behalve de zieken te *Breno* 2600 lijders, van welke het grootste gedeelte binnen 16 maanden genas, en de hospitalen, door de *Oostenrijksche* regering te *Fiume* opgerigt, konden opgeheven worden. In het jaar 1805 heerschte zij andermaal epidemisch, en op eene bevolking van 38000 zielen, had men niet minder dan 13000 zieken. In de epidemie van 1818 werden 4000 personen aangetast. De *Oostenrijksche* regering stelde met de grootste zorg alle mogelijke pogingen in het werk om de ziekte uit te roeijen; echter te vergeefs, want men heeft dezelve niet geheel kunnen beteugelen, noch beletten, dat zij eene endemische ziekte is geworden.

De *scherlievo* is eene ziekte der beenderen, der slijmvliesen en der huid; eene eigene smetstof tot
Bepaling.
oor-

oorzaak hebbende, die niet dan door onmiddellijke aanraking wordt medegedeeld. De ziekte begint met pijn in de beenderen, gevolgd door zweren in den raak koperkleurige vlekken en uitslag van verschillende gedaanten op de huid. Het beenweefsel wordt op eene eigendommelijke wijze aangetast, en de huid door zweren afschuwelijk misvormd. Haar beloop is zeer langzaam en langdurig.

Voorboden. Meerendeels bestaan de voorloopers in rheumatische pijnen, somwijlen zoo gering, dat zij door de lijdens naauwelijks opgemerkt worden; meerendeels echter hevig en kwaadaardig. Later ontstaan pijnen in den rug, in de gewrichten en in de lange of pijpbeenderen, die dag en nacht met gelijke hevigheid aanhouden, waardoor zij zich van de venerische beenpijnen onderscheiden. Het is de specifieke werking der smetstof op de vezelachtige- en slijmvliezen der beenderen en gewrichten, welke deze pijnen veroorzaakt.

Ontwikkeling De ontwikkeling der ziekte neemt haren aanvang
toevallen en of in het stelsel der beenderen, in de slijmvliezen,
beloop. of in de huid. Wanneer de slijmvliezen het eerst worden aangedaan, dan vindt zulks in den raak plaats. De geheele keelholte met de daartoe behoorende deelen nemen eene hoogroode kleur aan, zijn oppervlakkig ontstoken en als met fijne bloeddruppeltjes gesprekkeld. De stem wordt heesch, fchor en onduidelijk, het slikken moeilijk, en de reeds als voorboden aanwezige pijnen worden heviger. Later ontstaan aan de lippen, in den mond en in de keelholte witte strepen, die na verloop van

van

van eenigen tijd in vuile , gele spekachtige zweren , met roode verhevene randen overgaan. Deze verbreiden zich wijd en zijd over de zachte en harde deelen van het verhemelte , vernielen het strottenhoofd , tasten de luchtpijp aan , en geven tot keel- en luchtpijptering aanleiding. Het slijmvlies van den neus en van deszelfs beenderen worden verwoest ; de oogen worden mede in dit lijden betrokken , en er grijpen ontstekingen der oogleden en der oogbollen plaats ; niet zelden wordt het geheele gelaat als met ééne zweer overdekt. Ontwikkelt zich de ziekte bij voorkeur in het beenstelsel , dan zijn de aandoeningen der slijmvliesen gering en verdwijnen , naar mate het lijden der beenderen toeneemt. De beenpijnen duren dag en nacht met de grootste hevigheid voort. De beeneinden zwellen en verweken ; de lange beenderen , vooral de scheenbeenderen , verliezen hunne natuurlijke gedaante en worden wanstaltig. Niet zelden gaan dezelve tot eeltachtige , een scherp rotvocht afscheidende beenzweren en beenbederf over. Zijn de algemeene bekleedfelen de voornaamste zetel der ziekte , dan verdwijnen insgelijks de eerst aanwezige aandoeningen der slijmvliesen , en er ontstaat een huiduitslag , die op alle mogelijke wijzen van gedaante verwisfelt en zeer lang van duur wordt. Bij de eerste verschijning vertoont zich de uitslag als vlekken , die tot peukels , puisten , knobbels en zweertjes overgaan , van de grootte eens mosterdzaadjes tot wijduitspattende , geheele ligchaamsdeelen bedekkende vlekken en zweren.

De vlekken, waarmede de uitflag eenen aanvang neemt, zijn klein, niet grooter dan een speldeknoop; vele gaan spoedig in peukels, puisten en knobbeltjes over, die óf opdroogen en afschilferen, óf tot verzwering overgaan. Geëvenredigd aan de verschillende individuele gesteldheden der lijders en de aanwezige schadelijkheden, leveren de zweren groote verscheidenheden op; zij zijn daarbij oppervlakkig of diep in de huid invretend. De kleur der vlekken is koperkleurig, ros, blaauw, enz. Zij zijn over het geheele ligchaam verbreid, of tot een enkel deel bepaald; ligt afschilferend, met lijnen doorsneden, en door weinig verhevene randen omgeven. Deze vlekken hebben de grootte eener linze tot die eener handpalm. De paarsblaauwe vlekken daarentegen zijn gewoonlijk veel grooter en bedekken beide de schouderbladen, somwijlen den geheelen rug; hare oppervlakte is fluweelachtig, glinsterend als met olie bestreken. De knobbeltjes, ter grootte van gierstkorrels en boven de huid verheven, verdroogen of gaan tot verettering over. Enkel staande verdroogende peukels heeft men *scherlievo psora*, dicht bij elkander staande, bepoederde en zemelachtig afschilferende, *psora leproidea* en *herpes farinosus* genoemd.

Aan drooge, gekleurde vlekken en peukels, die overvloedig afschilferen, gaf men den naam van *lepra sicca*. Bij al deze drooge uitbottingen, welke alleen trapsgewijze naar den langeren of korteren duur der ziekte en de individuele gesteldheden der lijders verschillen, blijft de huid ruw en ongelijk,

zonder jeukte noch hitte, met behoud van hare natuurlijke gevoeligheid. Enkele veretterende puisten veranderen in zweren, die met witte likteekens genezen en nog eenigen tijd door roestkleurige randen blijven omgeven. Digt bij elkander staande puisten vloeijen door verettering in een, en geven het aanzijn aan groote, vlakke zweren, welke menigwerf geheele ledematen, den rug, de borst of andere deelen bedekken. De etter dezer zweren bestaat in een kwalijk riekend *ichor*, die hier en daar tot vuile roven, bruine schubben en korsten verdroogt. Deze in het slijmnet en de buitenste huid-oppervlakte gezetelde zweren dringen zelden dieper in het huidweeffel door. Zij genezen met likteekens, die sneeuw wit en eenigzins verheven zijn, en geven door hunne uitgebreidheid tot velerlei wanflaltigheden aanleiding. Ook wil men hebben opgemerkt, dat de weiachtige etter in deze ziekte de bijzondere eigenschap bezit, van natuurlijk gescheidene deelen, b. v. de oogleden en de lippen, zamen te kleven en met elkander te doen vergroeijen.

De knobbels zijn zeer hard en ontaarden tot ware uitwasfen van de grootte eener erwt tot die eener framboos van eene donkerroode of blaauwe kleur, terwijl de huid hare natuurlijke kleur behoudt, of eene rozenroode of ligtpaarsche aanneemt, zonder onderscheid der deelen, welke aan de knobbels tot zitplaats verftrekken. In het aangezigt echter gelijken dezelve op de knobbels der *eliphantasis Graecorum*.

Op de punten der knobbels ontstaan, zoo lang dezelve droog blijven, witte schubben, die meer-

malen afvallen, maar telkens door andere vervangen worden. Jaren lang kunnen zij in dezen staat verblijven, alvorens tot zweren over te gaan. Wanneer dit plaats grijpt, dan ontstaat er op de punt een geelwit vliesje, dat aan de randen vochtig, in het middelpunt ingedrukt is; allengskens wordt deze deuk dieper, en er ontstaat een zweertje. Waar vele knobbels dicht bij elkander staan, daar vloeijen deze zweertjes tot groote, vuile, eeltachtige, meer slijm- dan etterachtige, sponsachtige zweren te zamen, die diep invreten of oppervlakkig blijven, en dan *vitaligo ulcerosa superficialis* genoemd worden. Beide soorten van zweren zijn vaak gelijktijdig aanwezig, en de eene vrijwaart niet tegen de andere. Somwijlen genezen deze zweren van zelve, maar komen op andere plaatsen weder te voorschijn. De genezing begint in het middelpunt en gaat naar de randen voort.

Complicatiën met de *syphilis*, de *scabies*, de *tinea capitis*, de *lepra*, de *elephantiasis*, de *rachitis*, de broosheid der beenderen en de scheurbuik komen niet zelden voor, en veranderen het beeld van de *scherlievo* op velerlei wijzen.

Hoe belangrijk de veranderingen, die het beenderenstelsel en het weeffel van de slijmvliezen en de huid in de onderhavige ziekte ook zijn moge, zoo blijven de lijders toch schijnbaar gezond; de reproductieve verrigtingen lijden zoo weinig, dat men nauwelijks eene ziekte vermoeden zoude; ook de geestvermogens blijven ongestoord. Alleen bij zwakke voorwerpen en waar de ziekte haren
hoog-

hoogsten trap bereikt heeft, valt het algemeen lijden meer in het oog. Bij kinderen, welke aangetast waren, wil men hebben opgemerkt, dat hunne ligchamelijke ontwikkeling achterlijk blijft, en dat zij levenslang een teeder en zwak ligchaam om-dragen.

De aanleg van de *scherlievo* schijnt bij den flavo-^{Oorzaken.}nischen volksstam meer dan bij andere volken ontwikkeld te zijn, en door armoede, onreinheid, door kleederen van onbereide wol vervaardigd, en door al die schadelijkheden, waaraan zeekust-bewoners blootstaan, begunstigd te worden; — vooral ook door *scabieuse* en *rheumatische* aandoeningen. Geslacht en leeftijd schijnen zonder invloed te zijn, want men vindt mannen en vrouwen, zuigelingen en grijsaards onder de lijdens. De voortbrengende oorzaak kan alleen in eene eigene smetstof gezocht worden, van buiten ingevoerd, zonder te weten van waar, en welker wezen ons ten eenemaal onbekend is. Gissender wijze heeft men dezelve in eene wijziging der *syphilitische*, *scabieuse* en *lepreuse* smetstoffen, of in eene toevallige verbinding van eenige derzelve gezocht.

Van de *syphilis*, waarmede de *scherlievo* dikwijls ^{Onderschei-}verwiscfeld, of waarvan zij als eene wijziging be-^{dings-teeke-}schouwd wordt, onderscheidt zich dezelve daardoor, ^{nen.} ^{Diagnosis,} dat zij bijna nimmer door den bijlaap, maar wel door onmiddellijke aanraking der lijdende en met etter besmette deelen, en door gemeenschappelijk gebruik van kleederen, meubelen en gereedschappen, die bij het eten, drinken en rooken door *scherlievo*-

lijders en door gezonden gebruikt worden; — ten andere daardoor, dat de teeldeelen nimmer de eerst aangedane deelen zijn, en het klierstelsel weinig of geen deel aan de ziekte neemt. Wijders dat alleen de pijpbeenderen, dikwijls alleen hunne uiteinden, aangedaan worden; en eindelijk, dat van de beginnende ontwikkeling der ziekte af aan, de beenderen, de slijmvliesen en de huid de lijdende deelen zijn, en de uitslag niet in eene, maar in alle gedaanten van vlekken, peukels, knobbels, zweren en sponsachtige uitwasfen voorkomt. — Door zijn geheel eigenaardig beloop onderscheidt de *schierlievo* zich van de *lepra* en *elephantiasis*, met welke men ze echter wel verwisfeld heeft.

Voorzegging. De *schierlievo* is meerendeels eene gevaarlooze, **Prognosis.** maar slepende ziekte, die tot haar zeer langzaam beloop maanden en jaren, ja zelfs tot 20 en meer jaren noodig heeft. In haar ontwikkelingstijdperk wordt zij somtijds door de kunst, maar ook door de natuur genezen. De gevolgen der verzwerigen en aandoeningen der beenderen, de likteekens, de verftijvingen der gewrichten, de aaneengroeijing der lippen en der oogleden, de slepende ontstekingen van het uitwendige oog en van den oogbol, blijven levenslang terug. Zoowel door de talrijkheid der zweren, als door de deelen, die er mede belast zijn, en de genoemde complicatiën met andere ziekten kan de dood door tering, waterzucht, uitputtende ontlastingen en hectische koortsen volgen.

Geneeskundigebehandeling. Ook in deze ziekte neme men de voorschriften en regelen der voorbehoedende geneeskunde in acht,

acht, om de dreigende befmetting af te weren. Men drage zorg voor reinheid in het algemeen, maar vooral voor de noodige zuiveringen des ligchaams door wasfchingen, baden en veelmalige verwisfeling der kleederen. Den armen kome men door eene goede verzorging en opruiming zijner behoeften ten goede; want het zijn deze, welke door hunnen ftand en hunne betrekkingen in de maatschappij meer dan anderen voor de befmetting bloot ftaan. Na het gebruik van een warm bad, late men het ligchaam met warme olijfolie inwrijven. Maar vooral drage men zorg, dat de zieken van de gezonden verwijderd gehouden worden, en er geene kleedingftukken, bedden- of linnengoed gebruikt wordt, met fmetftof van vroegere bezitters beladen. In het tijdperk der voorboden wil men de antirheumatifche geneeswijze, de fpiesglasbereidingen en den zwavel met vrucht hebben gebezigd. De geneeswijze der volkomen ontwikkelde ziekte is veel moeilijker vast te ftellen, daar de ineeningen der Geneeskundigen aangaande de oorzaken en de behandeling zeer verfchillend zijn. De Oostenrijfsche en Fransche geneesheeren zijn doorgaans voor het gebruik der kwikmiddelen; onder deze vindt men ook den *mercurius praecipitatus ruber* van $\frac{1}{4}$ grein opklimmende tot één grein *pro dosi* aangeraden. Maar niet altijd flaagt men in de genezing door kwikmiddelen, want niettegenftaande het gebruik derzelve, blijft de ziekte vaak onverminderd in hare verwoestingen voortgaan, of er grijpen na fchijnbare genezingen recedieven plaats.

Andere Geneeskundigen beloven zich eene meer voldoende uitwerking door de kwikmiddelen met *opium* te verbinden, en de spiesglasbereidingen verbonden met zwavel, de *resina guajaci*, het *extractum dulc-amarae*, *cicutae*, etc. toe te dienen. Door afkookfels en aftreksels van de *radix lapathi acuti*, de *radix sassaaparilla*, de *stipites dulc-amarae*, de *herba ledi palustrae*, het *lignum sassafras* en *guajaci*, welke als volks- en huismiddelen in gebruik zijn, ondersteune men de genezing.

Uitwendig bezige men warme baden gedurende het geheele beloop der ziekte, inwrijvingen met olijfolie, waschingen met chloor-water, met oplossing van sublimaat, of een smeersel met roode kwik-*praecipitaat*. In hardnekkige gevallen beproeve men het blaauwe vitriool in oplossing of tot drooge bestrijking der zweren: een middel, waarvan men goede uitwerkingen wil gehad hebben. Den eetregel beperke men tot zachte, voedende spijsen, met uitsluiting van alle, die scherp en verhittend zijn. De warmtegraad der ziekenverblijven moet meer warm dan koud zijn, en de lijders moeten aangehouden worden, zich dagelijks in de vrije lucht te bewegen. De nablijvende wanstaltigheden, aaneengroeijingen van bijzondere deelen, enz. leert de heilkunde behandelen en herstellen.

III.

Framboesia scotica. F. Cromwelliana. De Schotſche frambozen-uitſlag. De *ſibbens*, *ſivvins*, *ſivvens*.

Deze in het weſten van *Schotland* endemiſche ziekte wil men, dat aldaar in het jaar 1650 door de ſoldaten van CROMWEL en in het jaar 1718 door Engeliſche ſoldaten is aangebragt en verbreid, en dat het dezelfde ziekte is, die in *Canada* heerſcht, waarvan de naam *mal de la baie de St. Paul* gegeven, en die door Engeliſche ſoldaten in de jaren van 1780—1790 is ingevoerd. Ook hebben de *ſibbens* eene groote gelijkenis op de *yams* en de *ſcherlievo*.

De *ſibbens* beginnen, even als de *ſcherlievo*, met aandoeningen der ſlijmvliezen of der huid. Worden de ſlijmvliezen het eerst aangedaan, dan ontſtaan er oppervlakkige zweren in de holte van den mond en van den raak, die, zich al verder uitbreidende, eerst de zachte deelen verwoesten, en vervolgens de beenderen van het verhemelte, de bovenkaak en den neus vernielen, gepaard met doffe pijnen in de lijdende deelen, die met ſtekende pijnen afwiſſelen of daarin overgaan. Wordt de ziekte in haren voortgang niet opgehouden, dan wordt het geheele aangezicht in eene afſchuwwekkende zwerende oppervlakte veranderd. De geel-witte zweren hebben een fluweelachtig aanzien, dat zij behouden tot dat de genezing tot ſtand komt. Wanneer de huid het eerst wordt aangedaan, dan ontſtaan op verſchil-

lende deelen des ligchaams koperkleurige vlekken, het talrijkst echter in het aangezicht, die spoedig zemelachtig affschilferen, en vervolgens óf in zweeren, óf in harde, wrataardige, pijnlijke knobbels overgaan, met affcheiding van eene taaije stinkende vloeistof. Op alle deelen des ligchaams, waar een vlekje, eene ontvelling of een zweertje door toevallige oorzaken ontstaat, onverschillig van welken aard deze ook zijn mogen, groeijen sponsachtige uitwasfen van de grootte en gedaante der frambozen. Somwijlen ziet men foortgelijke uitwasfen ook in de mondholte, zelden aan de teeldeelen, maar nimmer als eerste aandoening. Ook gebeurt het, dat de ziekte zich gelijktijdig in de slijmvliesen van de mondholte en in de huid ontwikkelt. Zij is alsdan zeer kwaadaardig, en veroorzaakt niet zelden den dood.

De reproductieve verrigtingen blijven meerendeels ongestoord, en het algemeen lijden is gering. Eerst wanneer de *sibbens* haren hoogsten trap bereiken, zeer lang geduurd hebben, door de lijders verwaarloosd of ondoelmatig behandeld worden, treedt het algemeen lijden meer ontwikkeld te voorschijn.

Oorzaken. Dezelfde onzekerheid, die ten aanzien van *scherlievo* en in het algemeen omtrent den frambozen-uitslag heerscht, bestaat ook ten aanzien der *sibbens*. Waarschijnlijk bestaan er landeigene invloeden en volkseigendommelijkheden, welke deze ziekte tot den uitsluitenden eigendom van het Schotsche Hoogland gemaakt hebben, en ook wederom kunnen wijzigen, naarmate zij zelven door verande-

deringen in de leefwijze , de gewoonten des volks en andere omftandigheden gewijzigd worden. Voor de waarheid dezer ftelling pleit , dat de *fibbens* tegenwoordig in de gewesten van *Airshire* en *Galloway* , waar zij voorheen zeer algemeen waren , zelden meer en alleen bij de armfte en onreinste menfchen voorkomen.

Men heeft de *fibbens* eerst als eene wijziging der *syphilis* , van de druiper-fmetstof en van de fchurft befchouwd ; later hare *scrophuleufe* geaardheid aangenomen en verdedigd. Maar hoe het daarmede ook zijn moge , dit is buiten kijf : dat de *fibbens* door eene eigene smetstof medegedeeld en verbreid wordt , die tot de vaste behoort ; zelden of nimmer door den bijlaap , maar door huisraad , kleedingftukken , beddegoed en gereedfchappen tot eten , drinken en rooken in gebruik , medegedeeld wordt.

Dat ook complicatiën met andere ziekten , vooral met de *syphilis* , de fchurft , de *scrophula* en de fcheurbuik voorkomen , kan niet wel in twijfel getrokken worden , ten aanzien van een land , waarin de genoemde ziekten algemeen zijn. Het geheele beloop , de voorzegging , de onderscheidingsteekenen der *fibbens* , komen in het algemeen zoo nabij aan die der *fcherlievo* , dat het niet noodig is , ons daarmede onledig te houden , daar het eene herhaling van het reeds gezegde zijn zoude.

Ten aanzien van deze , is het voor de lijders Behandeling, noodig , dat zij eenen goeden eet- en leefregel volgen , en de hoogstmogelijke reinheid in hunne woningen , hun beddegoed en hunne kleeding in acht
ne-

nemen. Geneeskundig handelt men even als tegen de *schierlievo*. Ook in deze ziekte brengt men door het gebruik der kwikbereidingen eene kortstondige, maar geene duurzame genezing tot stand.

Het eigendommelijke der *sibbens* en van al de wijzigingen der *framboesiae*, namelijk door de kwikmiddelen eene verbetering te ondergaan, en dikwijls alleen door de natuur genezen te worden, heeft in de eerste plaats tot het dwaalbegrip aanleiding gegeven, van aan de kwikmiddelen voldoende krachten ter genezing der *sibbens* toe te schrijven; en ten andere, tot de nog verderfelijker, van de Schotsche artsen uitgegane stelling: dat de *syphilis* zonder kwik kan genezen worden, verleid.

d. *Lupus, herpes exedens, herpes esthiomenes, herpes phagadaenicus s. ferus s. depascens; formica corrosiva; noli me tangere; lupus vorax s. herpeticus. Dartre rongeante* ALIBERTI. De Wolf.

Tegen de onderscheidene namen, aan de ziekte, waarvan wij nu spreken, gegeven, kunnen gewigtige bedenkingen in het midden worden gebragt, daar dezelve geenszins de eigendommelijke geaardheid der ziekte aanwijzen, en daarenboven ligtelijk tot misvattingen aanleiding kunnen geven. *Herpes* is de naam eener orde van huidziekten, welke met den *lupus* hoegenaamd niets gemeens hebben, en de toegevoegde woorden zijn op vele andere ziekten toepasfelijk. De benaming van *noli me tangere* behoort aan den huid- en aan den gesloten kanker.

ker. De schrijvers over de huidziekten van lateren tijd hebben algemeen den naam van *lupus* aangenomen.

Eene slepende ontsteking, die de zachte deelen, Bepaling. voornamelijk de huid en de onmiddellijk onder dezelfde gelegene kraakbeenderen vernielt; voorafgegaan door harde, onpijnlijke, groepsgewijs vereenigd of enkel staande knobbels van verschillende grootte, die tot verzwering overgaan; — eerst tot eenen kleinen omtrek beperkt, later door knagende randen wijd uitspattend, die zweren vormen, met donkerkleurige vastzittende korsten bedekt zijn, zeer langdurig worden, moeilijk genezen en wanstaltigheden van de lijdende deelen teruglaten.

Of de *lupus* in al de gedaanten, waarin hij voorkomt, al dan niet tot de knobbelachtige huidziekten behoort, is ten minste twijfelachtig. Mannen, beroemd in de kunst, koesteren althans verschillende meeningen. Gevaarheid.

Het begin, de ontwikkeling en het beloop van den *lupus* leveren vele en zoo verre van elkander afwijkende verschijnselen op, dat het moeilijk is, algemeene en overal passende kenteekenen te vinden. Hij is dan eens tot een enkel deel of slechts tot een gedeelte van eenig deel beperkt, terwijl hij in andere gevallen op meer deelen te gelijk voorkomt. Ook zijne ontwikkeling grijpt op verschillende wijzen plaats; met schilferende vlekken van eene lichtroode tot paarsche kleur en met geringe zwelling; — met onpijnlijke harde knobbels of met etterpuisten. De vlekken, zoowel als de knob-

knobbels en de puisten gaan tot volkomene of onvolkomene verzwerings over, die met paarſche randen omgeven zijn, en door vernieling der zachte deelen, velerlei wanſtaltigheden veroorzaken.

Toevallen
en beloop.

De *lupus* komt het menigvuldigst in het aangezicht, zeldzamer op de andere deelen des ligchaams voor. Gewoonlijk tast hij één deel alleen aan, en zijne gelijktijdige ontwikkeling op meer dan eene plaats, behoort tot de afwijkingen van zijn gewoon beloop.

De *lupus* vertoont zich niet altijd in eene dezelfde gedaante, maar neemt verschillende vormen aan, zoowel in zijne ontwikkeling als in zijn verder beloop. Naar aanleiding van deze verscheidenheden en de vooronderſtelde oorzaken, neemt ALIBERT drie ſoorten aan, namelijk: den idiopariſchen, den ſyphilitiſchen en den ſcorphuleusen. RAYER onderscheidt slechts twee wijzigingen: den *lupus exedens* (den knagenden) en den *lupus non exedens* (den niet knagenden). De verdeeling van BLASIUS, die hier gevolgd wordt, neemt drie wijzigingen aan: namelijk: den oppervlakkigen, *lupus exfolians*, den zwerenden, *lupus ulcerosus*, en den met vergrooting der aangedane deelen gepaarden, *lupus hypertrophicus*.

De *lupus* begint met knobbels, puisten of vlekken, meermalen in dier voege, dat eerst vlekken, vervolgens knobbels en ten laaste puisten zich vertoonen, die tot verzwering overgaan.

Het menigvuldigst begint de *lupus* met knobbels, en het is uit dien hoofde, dat dezelve tot de

de knobbelachtige huidziekten gebragt wordt. Één of meer blaauwroode, verhevene, harde, niet zeer groote en onpijnlijke knobbels komen te vóorschijn, en blijven gedurende eenigen tijd weinig of niet veranderd staan. Langzaam of haastig, vaak zonder bekende oorzaken, worden de knobbels grooter, en vloeijen, waar meerdere aanwezig zijn tot wrataardige verhevene plekken van eene blaauwachtige of loodverwige kleur ineen, schilferen gedurende eenigen tijd met witte of bruine schubben af, en gaan vervolgens tot eene puistachtige verettering over.

De ontwikkeling van den *lupus* uit puisten is mede niet zeldzaam. Deze puisten zijn verschillend in gedaante en grootte, staan enkel en afgezonderd, of in groepen vereenigd en zamenvloeiend. Gewoonlijk worden dezelve door donkerkleurige vlekken voorafgegaan. De puisten bersten spoedig, en raken met gele en bruine vastzittende roven bedekt, onder welke eene diepindringende zweer verborgen ligt, die steeds verder voortknaagt en telkens door nieuwe roven bedekt wordt, zoo dikwijls dezelve worden afgestooten of weggenomen. De omtrek der puisten heeft eene eigene paarsroode kleur; de huid is ligt gezwollen, en menigwerf ontwikkelèn zich, gelijktijdig met de puisten, knobbels, welke mede tot verzwering overgaan. In het aangezicht, vooral aan de punt en aan den vleugel van den neus, altijd op ééne zijde alleen, begint de *lupus* met eene rood- en paarsgeschakeerde vlek, die onregelmatig affchilfert en met weinig zwe-

zwellings gepaard gaat. Onder de schilfers ontstaan kleine peukelachtige knobbeltjes, welke achtereenvolgend verzweren, in elkander vloeijen en tot eene oppervlakkige zweer overgaan, die zich aanhoudend zoowel in omtrek als diepte uitbreidt en met donkergele en bruine korstachtige roven bedekt wordt; deze blijven lang vastzitten en worden door anderen vervangen, wanneer zij afvallen of weggenomen worden. Somwijlen wordt de ontwikkeling van den *lupus* aan den neus voorafgegaan door eene ontstekingsaardige aandoening van het slijmvlies tot dit deel behoorende. De punt van den neus is alsdan lichtrood van kleur en eenigzins gezwollen; deszelfs vleugels en middelschot deelen in de zwelling, ontvellen, schilferen, verzweren oppervlakkig en worden met dunne roven bedekt.

1. De zwerende wolf. *Lupus ulcerosus*.

In deze gedaante komt de *lupus* het menigvuldigst voor, en ontwikkelt zich uit etterpuisten of uit verzwerende knobbels en vlekken. De zwerende wolf is oppervlakkig of diep invretend.

a) De oppervlakkige breidt zich over eene grotere of kleinere oppervlakte uit, blijft in het eene geval tot een enkel deel van het aangezicht beperkt, terwijl hij zich in een ander over het geheele aangezicht uitbreidt. De zweer heeft eene onregelmatige gedaante; harde, ligtverhevene, ruwe, met knobbeltjes en puisten bezette randen, welke mede tot verzwering overgaan, en den omtrek van het gebrek vergrooten. Gedurende het lan-

lange tijdsverloop, wanneer dit plaats heeft, ziet men meermalen de eerst aangedane deelen genezen met witte, eenigzins verhevene, onregelmatige likteekens, niet ongelijk aan die, welke na huidverbranding terug blijven. In hardnekkige gevallen worden de aldus genezene gedeelten andermaal aangetast, en dieper dan te voren vernield.

De oppervlakkige zwerende wolf tast den neus zeldzamer dan de andere gedeelten des aangezigts aan; maar breidt zich in zijn verder beloop ook over dit deel uit en verwoest hetzelfde. Ook op den tronk en de ledematen wil men, dat dezelve voorkomt. Na de genezing blijven likteekens van verschillende gedaante, dikte en kleur terug.

b.) De dieper indringende zwerende wolf.

(*Lupus exedens.*)

Deze neemt bij voorkeur en bijna uitsluitend aan de punt en eenen der vleugels van den neus zijne zitplaats; zelden ziet men hem aan de lippen, waar hij groote verwoestingen aanrigt, en nimmer, naar mijne op ervaring gegronde meening, aan eenig ander ligchaamsdeel. Met eene kleine, oppervlakkige, weinig etter gevende zweer, die zich spoedig met eerst dunne, later dikke bruine roven bedekt, neemt de knagende wolf (die ook den naam van waren wolf, tot onderscheiding van alle andere wijzigingen, waarin hij voorkomt, verdient) aan de punt of aan eenen der vleugels van den neus zijnen aanvang. De met geringe verettering steeds dieper doordringende, en met dikker wor-

dende roven van eene donkere kleur bedekte zweer, is zonder pijn en slechts door eene matige jeukte vergezeld. De huid en het celweeffel vernield hebbende, tast hij ook de kraakbeenderen van den neus aan en verwoest deze, maar verschoont de beenderen, althans had dit plaats in alle der door mij geziene gevallen, waaronder zeer zware en belangrijke. BIËTT, BLASIUS en anderen nemen aan, dat de beenderen wel zeldzaam aangedaan worden, maar niet in alle gevallen vrijblijven. Door telkens aan de randen en in de nabijheid van de zweer opkomende knobbels en peukels, welke tot verzwering overgaan, breidt zich de *lupus* meer en meer over de nabijgelegene deelen uit, met meer of minder snelheid en zonder bekende oorzaken. De vernielde deelen, de huid, het celweeffel en de kraakbeenderen worden bij de genezing door de natuur niet hersteld: levenslang blijven wanstaltigheden terug. De likteekens zijn eerst rood en ligt ontstoken, worden allengskens bleek, laatstelijk wit, glinsterend, ingedrukt en gespannen. Meermalen grijpt er een minder gunstig beloop plaats: de likteekens in den omtrek der genezene zweer zijn hier en daar met kleine, harde knobbeltjes bezet, welke later en altijd in knagende zweren overgaan, zeer lang van duur zijn, en de reeds aanwezige wanstaltigheden vergrooten.

2. De oppervlakkige, fchilferende, niet zwerende wolf. *Lupus exfolians*.

Deze tast alle deelen des aangezigts aan, en breidt zich in zijn beloop, onverschillig op welk deel van hetzelfde hij zijn begin nam, over de geheele oppervlakte des aangezigts uit. Ook komt hij, hoewel zeldzamer, aan den hals, de bovenste ledematen en op andere ligchaamsdeelen voor. De niet zwerende wolf begint met kleine, rood gekleurde, peukel- of knobbelachtige vlekken, op welke de opperhuid los wordt, en met glinsterende, witte plaatjes loslaat en affschilfert. De afgeschilferde vlekken hebben eene roode, blaauwachtige oppervlakte, die onpijnlijk, glad en glinsterend is. De herstelde ziekelijke opperhuid wordt telkens weder los en valt met plaatjes af. De huid krimpt en verteert benevens het daaronder liggende celweeffel zonder dat er zweren aanwezig zijn.

Nadat het gebrek eenigen tijd geduurd heeft, wordt de huid dunner, en ligt vast in rimpels samengetrokken op de deelen, die zij omgeeft. Zij neemt de gedaante aan van likteekens met gespannen naden, die zich in alle rigtingen kruisen. Zoodra de affschilfering der opperhuid geheel heeft opgehouden, worden deze fchijnlikteekens (*pseudocicatrices*) harder dan de nabijliggende huiddeelen, bekomen eene witte kleur en glinsteren fterk. Wordt de neus aangetast, dan fchijnen de kraakbeenderen in te krimpen, waardoor de neus korter en stomper wordt, de neusvleugels naderen elkan-

B b 2

der,

der, en de neusgaten worden kleiner. Op den rug van den neus is de huid gespannen. Somwijlen blijft de *lupus* in deze gedaante jaren lang tot een enkel en klein gedeelte des aangezigts beperkt; meerendeels echter grijpt er uitbreiding naar alle zijden plaats: naar boven over de oogleden, die dunner worden, uitteren en omkrullen, over het voerhoofd en de slapen tot waar de haren beginnen; — naar beneden over de onderkaak en den hals tot op de sleutelbeenderen en den bovenrand van het borstbeen.

3. De wolf met vergrooting der lijdende deelen.

Lupus hypertrophicus.

Deze komt meerendeels in het aangezicht voor, en ontwikkelt zich uit knobbeltjes, die vaak zeer talrijk over het geheele aangezicht verbreid zijn. Zij zijn hard, klein en hebben eene roode kleur, gaan zelden, en dan nog maar alleen aan de punt, tot eene oppervlakkige verzwering over, en worden door dunne, vastzittende roven bedekt. Aan de grondvlakte nemen de knobbels in omtrek toe, en vloeijen met zwelling der huid en het daaronder gelegene celweeffel zonder pijn noch ontsteking in een. Vaak bereikt deze zwelling eene groote uitgebreidheid en dikte, bekomt eene donkerroode of paarsche kleur, is veerkrachtiger, harder en meer gespannen dan de gezonde huid; er grijpt eene ware hypertrophie van de huid en van het celweeffel plaats; de afschilfering der opperhuid is gering en onvolkomen; hier en daar ziet men roode, verhe-

vene

vene, knobbelachtige punten, en na verloop van tijd tusſchen dezelve witte vlekken en ſtrepen; deze zijn de likteekens van knobbeltjes, die niet door verzwering zijn vernietigd, maar door opſlorping opgeruimd. Deze wijziging van den *lupus* misvormt in haren hoogſten trap van ontwikkeling het geheele aangezicht; de hypertrophie breidt zich over al deszelfs deelen uit. Maar, naar mate deze afneemt, grijpt er atrophie plaats: de eerst uitgezette deelen flinken weg, krimpen in een en worden kleiner dan in den gezonden toestand; de natuurlijke openingen, vooral de neusgaten, worden naauwer. Menigmaal paart zich de hypertrophische *lupus* met den zwerenden, tast de punt en de vleugels van den neus met verwoesting aan, terwijl de andere deelen nog aan hypertrophie lijden. Somwijlen wordt het ſlijmvlies van den neus het eerst aangetast, en eerst na een lang voorafgegaan lijden en nadat het kraakbeenig middelfchot van den neus doorboord is, openbaart zich de *lupus* op de oppervlakte van denzelven.

Vaak gaat de *lupus* met eene groote voorgeſchliktheid tot de aangezigtsroos gepaard; en menigwerf treedt deze met den hypertrophischen *lupus* te voorschijn; gewoonlijk oefent zij eenen gunstigen invloed uit en bevordert de oploſſing der gezwollene deelen en de genezing.

Zelden gaan er algemeene ziekteverſchijnselen met den *lupus* gepaard, en de lijdens genieten — het plaatſelijk lijden uitgezonderd — eene goede gezondheid. Eene meer dan gewone uitbreiding des

gebreks en gelijktijdig aanwezige complicatiën met andere ziekten, kunnen tot algemeene ziekten aanleiding geven, en deze, zoowel door verlies van vochten, als door uitputting der krachten, ten gevolge der langdurigheid van het plaatselijk lijden, uitterende koortsen en andere slepende ziekten veroorzaken.

Onder een groot aantal *lupus*-lijders, die ik gelegenheid vond waar te nemen, zijn er geene voorgekomen, door algemeene ziekteverschijnselen aangetast, zoo lang er namelijk geene complicatiën met andere ziekten plaats grepen.

Oorzaken. De aanleg tot *lupus* is het meest ontwikkeld bij meisjes tusfchen 12 en 18 jaren oud, gedurende het tijdperk der intredende maandftonden; bij jongelingen tusfchen het 15^{de} en 20^{ste} levensjaar. Bij jongere voorwerpen komt hij hoogst zelden voor. BLASIUS zag hem nimmer bij kinderen beneden de vier jaren oud; mijne jongfte lijders hadden den onderdom van twaalf jaren bereikt. Met den toenemenden ouderdom neemt de voorgeschiedtheid weder af. Reeds in den vijf en twintigjarigen leeftijd ontwikkelt zich de *lupus* zelden, hoogst zelden bij lieden, die dertig jaren bereikt hebben, en waarfchijnlijk tast hij nimmer lieden aan, die meer dan veertig jaren oud zijn. Volgens BIETT en anderen wordt het mannelijke en vrouwelijke geflacht in gelijken getale, — volgens BLASIUS en mijne ervaring veel meer het laafte, dan het eerfte aangetast. Dat de *lupus* menigvuldiger op het platte land dan in de fteden voorkomt, moge in *Frankrijk* waar zijn, bij ons echter heeft dit geene plaats

plaats. Hier ter stede behoort de *lupus* tot de niet zeer zeldzame ziekten. Armoede en onreinheid schijnen den aanleg niet bijzonder te begunstigen, noch deszelfs ontwikkeling te bevorderen; althans, alle mij bekende lijdens, met zeldzame uitzonderingen, behoorden wel niet tot de meest gegoede en in overvloed levende standen der maatschappij, maar toch tot den minderen middelstand. Ook ten platten lande heeft, voor zoo ver mijne nasporingen reiken, hetzelfde plaats.

Eene eigene dyscrasie en de oorzaken, welke deze voortbrengen en onderhouden, zijn zonderzaken. <sup>Gelegenheid-
gevende oor-</sup>

twijfel de schadelijkheden, welke de toevallige oorzaken van den *lupus* omvatten. Maar, waarin de eene zoowel als de andere bestaan, is tot nog toe onbekend. Bij scrophuleuse voorwerpen komt de *lupus* wel het menigvuldigst voor; maar duizenden, in den hoogsten graad aan scrophuleuse verzweringen lijdenden blijven van den *lupus* verschoond. De eigene dyscrasie schijnt derhalve zoowel in hare ontwikkeling als in de voortbrenging van den *lupus* door de *scrophulae* wel begunstigd te worden, terwijl beide, de scrophuleuse en de *lupus*-dyscrasiën onvermengd en ieder voor zich blijven bestaan; want de *lupus* duurt voort, nog lang nadat alle scrophuleuse verschijnselen verdwenen zijn, en de genezing tot stand gekomen is. Hetzelfde geldt ook ten aanzien der *syphilis*. De *lupus*-dyscrasie heeft met alle andere plaatselijke ziekten voortbrengende dyscrasiën dit gemeen, dat zij met hare voortbrengfels langen

tijd kunnen bestaan, zonder dat er ziekteverschijnselen te voorschijn treden, welke een algemeen lijden der bewerktuiging bewijzen. Dat wij niet weten, aan welke schadelijkheden en uitwendige invloeden de eigene dyscrasie van den *lupus* en hij zelf is toe te schrijven, is reeds gezegd. Men mag er bij voegen: er heeft alzoo ten aanzien van de oorzaken dezer ziekte hetzelfde plaats, wat er ten aanzien van de meeste andere huidziekten niet kan worden tegengesproken. Wanneer ik in aanmerking neem, dat hier in *Gouda* gewoonlijk vier of vijf *lupus*-lijders gevonden worden, en dat op eene bevolking van ongeveer 14000 zielen, alzoo één op drie duizend; — dat ik nog nimmer twee lijders in eene familie heb gezien, terwijl velen toch tot talrijke huisgezinnen behoorden, dan wil ik liever onwetendheid erkennen, dan deze of gene spijzen en dranken, woonplaats, dampkring, belemmerde afscheidingen en ontlastingen, deze of gene scherpte, overerving en besmetting als oorzaken van den *lupus* te beschuldigen. Nog heb ik eene *lupus*-lijderes onder het oog, sedert jaren met dit gebrek behebt. Zij heeft twee onechte zoons, beide schoone jonge mannen in militaire dienst, en toch valt hun geboortetijd binnen het tijdperk, dat de moeder reeds lijdende was. Ten gevolge van oogontstekking lijdt de eene thans aan beginnende *amaurosis*.

Naaste oorzaak. De huid in de geheele uitgestrektheid van haar weeffel en het daaronder gelegene celweeffel zijn de zitplaats van den wolf. Het uitwerksel der naaste

oor.

oorzaak : een veranderd leven van de huid , waaruit eene verweeking derzelve en opflorping der verweekte deelen voorkomt. Allengskens , nu eens spoedig , dan eens langzaam , worden de nabijgelegene deelen in deze ziekelijke bewerking opgenomen en vernield. Deze huidverweeking grijpt plaats, zonder dat er eene wezenlijke ontsteking voorafging of daarmede gepaard is. Bij den zoogenaamden zwerenden *lupus* bestaat geene ware verzwering: het zijn de verweekte huiddeelen , welke door den uitwendigen invloed van lucht en warmte tot korstachtige roven verdroogen , terwijl onder dezelve de verweeking in omtrek en diepte grooter in omvang wordt. Het veroorzaakte verlies van zelfstandigheid heeft ten gevolge : dat ongeneesbare wanstaltigheden en likteekens terug blijven , en de verwoeste deelen nimmer door de natuur hersteld worden.

De *lupus* is eene door zijne eigene verschijnselen Diagnosis. zeer duidelijk gekenmerkte ziekte , ligt te erkennen en van andere ziekten te onderscheiden. Diegene , met welke hij door mingeoefenden zoude kunnen verwisseld worden , zijn de syphilitische puisten en knobbels des aangezigts, de *gutta rosacea* , de *acne indurata* en de huidkanker van het aangezicht (*noli me tangere*).

Bij de syphilitische knobbels en puisten zijn venerische besmettingen voorafgegaan ; er zijn nachtelijke beenpijnen aanwezig , koperkleurige vlekken en aandoening der neusbeenderen ; de venerische verwoestingen beginnen van binnen en gaan naar

buiten; de zweren scheiden eenen overvloedigen en zeer stinkenden etter af. De *lupus* verloopt zonder pijn, de zweren geven weinig en niet riekenden etter; hij verwoest de kraakbeenderen, maar tast nimmer de beenderen aan.

De *gutta rosacea*, over den neus en de huid, die de jukbeenderen bedekt, verbreid, heeft eene donkerroode kleur en wordt door opgezette spataderen omgeven, of is daarmede netvormig doorweefd. De huid lijdt oppervlakkig; volkomene verettering grijpt niet plaats, maar wel oppervlakkige ontvellingen door ligte afschilferingen gevolgd; er ontstaan gene korstachtige roven, en nimmer grijpt er verlies van zelfstandigheid gelijk bij den *lupus* plaats.

De *acne indurata* onderscheidt zich door hare afgezonderd staande knobbels, die langzaam tot verettering overgegaan, gevolgd door spoedig afvallende roofjes; er ontstaan geene korstachtige roven, geene likteekens blijven terug en er heeft geen verlies van zelfstandigheid plaats.

De huidkanker (*noli me tangere*) van het aangezicht zoude nog het eerst met *lupus* kunnen verwisfeld worden, wanneer men alleen op de verwoestingen, die hij aanrigt, en de hardnekkigheid, waarmede hij aan iedere genees- en heelkundige behandeling weerstand biedt, acht geeft. Hij ontwikkelt zich uit harde knobbeltjes, die eerst de natuurlijke kleur der huid behouden, en later eene donkerroode of bruine aannemen; zij bedekken zich met een dun plaatje van afgeschilferde opperhuid; zij hebben eene gekorvene oppervlakte en bloeden

lig-

ligtelijk. Er is meerendeels slechts één dusdanige knobbel aanwezig, die zich spoedig tot eenen grooteren omvang ontwikkelt, spoedig gevolgd door andere, welke met het eerste eenen bepaalden omtrek en eene ruwe, wratachtige oppervlakte hebben. Deze toestand gaat met hevig stekende pijnen gepaard, die den lijder vaak alle rust bij nacht en bij dag ontnemen. De zich ontwikkelende zweer heeft opgezette randen met kleine knobbeltjes bezet, die tot verzwering overgaan, en met voortduring der stekende pijnen, den omtrek en de diepte des gebreks vergrooten. De zweer geeft ichoreusen etter, heeft een sponsachtig aanzien, met wratachtige, vaak aanmerkelijk boven de opperhuid verhevene vleeschgroeiing. Somwijlen ook heeft de zweer eene roode, gladde oppervlakte, die zich met loszittende drooge, gele en groene roven bedekt. Gewoonlijk verwoest de huidkanker de aangetaste deelen meer in diepte dan in omtrek, noch kraakbeenderen noch beenderen verschoonende. De rug van den neus, deszelfs zijdeelen, de wangen en de ooghoeken, de rug der handen en voeten zijn de gewone zetels van dit gebrek. De aan den *lupus* eigene aandoening van het slijmvlies van den neus ontbreekt, insgelijks de eigenaardige, met roven bedekte, de huid, het celweeffel en de kraakbeenderen vernielende zweer; als ook de bijzonder gevormde likteekens en vernauwingen der natuurlijke openingen van de lijdende deelen.

De *lupus* is wel geene gevaarlijke, maar eene ^{Voorzegging.} zeer langdurige, hardnekkige en hoogst moeilijk ^{Prognosis.}

te

te genezene ziekte. De genezing is intusfchen niet onmogelijk, en wordt zoowel door de kunst als door de natuur verkregen. Na de genezing grijpen menigwerf instortingen plaats, niet minder hardnekkig dan de eerste ziekte. Men heeft instortingen te vreezen, zoo lang de likteekens gekleurd blijven en hier en daar op derzelver verhevene randen nog knobbeltjes aanwezig zijn. Door verlies van zelfstandigheid blijven er wanfstaltige likteekens na de genezing terug; het kraakbeenige gedeelte van den neus gaat menigwerf onherstelbaar verloren; de neusgaten blijven vernaauwd; de oogleden gedeeltelijk zamengegroeid en derzelver randen rood en omgekruld.

Geneeskundige behandeling.

De langdurige hardnekkigheid van den *lupus*, de onbekendheid met zijne oorzaken, en het onvoldoende van alle tot hiertoe tegen deze ziekte in gebruik gebragte middelen, maken de geneeskundige behandeling van dit gebrek moeilijk, onaangenaam en weifelend; want de geneeswijze, welke in het eene of andere geval met goed gevolg in werking scheen gebragt te zijn, wordt bij andere daaraan gelijkende gevallen te leur gesteld; bewijzende, dat er geene rationele en evenmin eene steeds doeltreffende empirische handelwijze bestaat.

De behandeling van den *lupus* splitst zich in de *inwendige* en de *uitwendige*.

Inwendige behandeling.

De inwendige stelt zich in de eerste plaats tot doel, die invloeden uit den weg te ruimen, welke met eenigen grond beschouwd mogen worden, als hebbende de ontwikkeling van den *lupus* begunstigd en daarna onderhouden; ten andere, be-
staan.

staande complicatiën uit den weg te ruimen; en ten laatste, die middelen toe te dienen, welke de ervaring der geneeskundigen in hun voordeel hebben.

a.) Men drage zorg, dat de lijder eene goede, in al zijne behoeften doeltreffende verpleging geniete; geene scherpe, gezouten en gerookte spijsen en geene gegiste geestrijke dranken gebruike; dat zijn verblijf droog, luchtig zij, en eenen gematigden warmtegraad hebbe, en dat de reinheid van ligchaam en kleeding streng worde gehandhaafd. Meermalen toch worden lijders, die langdurig aan *lupus* geleden hebben, door de natuur genezen, indien zij in alle deelen aan eenen doelmatigen leef- en eetregel onderworpen worden. Bij zeer volbloedige lieden, bij welke de ontwikkeling van den *lupus* met eene zeer opgewekte wederwerking van het vaatstelsel gepaard gaat, waar dezelve algemeen is, eene aderlating noodig zijn. Is dezelve plaatselijk, zoo wende men slechts plaatselijke bloedontlastingen, door bloedzuigers, aan.

b.) Men beperke den leefregel des lijders tot zachte, niet al te voedende spijsen, met terzijdestelling van prikkelende, scherpe en geestrijke voedingsmiddelen; geve van tijd tot tijd een lakseermiddel uit *antimonium*, zwavel en *rhabarber*, en late daarnevens een afkooksel van de *sassafras*, *guajac* en *sassaparilla* drinken.

c.) Zijn de maandstonden nog niet geregeld, of aanwezig geweest en onderdrukt, dan geve men, in plaats der andere lakseermiddelen, de *aloës* en de *hb. sabina* in plaats der houtdranken.

Na

Na deze voorbereidende behandeling gedurende veertien dagen, of zoo lang het noodig geacht wordt, te hebben volgehouden, gaat men tot de behandeling der aanwezige complicatiën over. Deze zijn gewoonlijk de *scrophuleuse*, de *syphilitische* en de *scorbutische*.

a.) De *scrophuleuse* complicatie komt het menigvaldigst voor, te meer daar *scrophuleuse* lijders eene grootere voorgeschiktheid bezitten om door den *lupus* aangetast te worden dan andere voorwerpen. De gewone en algemeen bekende *anti-scrophulosa* zijn alsdan aangewezen en voor velerlei samenstelling vatbaar. De *mercurius dulcis* met *sulphur auratum*, de *aethiops antimonialis* en *mineralis*, vooral de eerste in verband met de *spongia usta*, wanneer verharde klieren aanwezig zijn; verbonden met de *hb. violarum tricoloris*, wanneer de lijders voorheen aan den dauwworm of het hoofdzeer geleden hebben; verbonden met *hb. sabinae* bij trage of onderdrukte maandzuivering. Het *hydro-chloruretum calcis*, ééne drachma op een pond water, driemaal daags een' lepelvol, opklimmende tot twaalf lepels toe; de *terra ponderosa salita soluta*, de *tincturu jodii* en de andere bereidingen van het *jodium* met kwik, het *extractum cicutae*, etc., kan men achtervolgens aanwenden. Men houde daarmede op, wanneer de *scrophuleuse* verschijnselen geweken zijn, de lijders beter uitzien, de wasdom en de ontwikkeling des ligchaams met den leeftijd der lijders overeenstemt en door een meer krachtig ligchaamsgestel, de gezond-

zondheidmatige toestand der reproductieve verrigtingen kenbaar wordt. Door warme baden, reinheid, goeden leef- en eetregel, beweging in de opene lucht, enz. ondersteune men de behandeling.

b.) De *syphilitische* complicatie trachtte men door eene krachtige toediening der kwikmiddelen, in giften, die toereiken om spoedig eenen ligten trap van kwijling te verwekken, uit den weg te ruimen. Naar mijne meening verdient het zoete kwik of de smeerkuur de voorkeur. Echter kan men den raad van anderen opvolgen, en van het bijtende kwik, de roode *praecipitaat* of van iedere andere kwikbereiding gebruik maken. Tot ondersteuning dezer behandeling volge men dezelfde algemeene voorschriften bij de *scrophuleuse complicatie* gegeven.

c.) Waar de *scorbutische complicatie* aanwezig is, zijn de kwikmiddelen schadelijk. Men moet zich geheel van dezelve onthouden, en door delfstofzuren de vochtverbastering tot de gezondheidmatige menging terug brengen; en bij groote zwakte en werkeloosheid der vaste deelen moet men de bittere versterkende middelen toevoegen, om de verlorene veerkracht te herstellen.

De complicatiën door doeltreffende pogingen opgeruimd hebbende, zoo heeft men den *lupus* tot eene eenvoudige ziekte terug gebragt, die zoo lang voortduurt, tot dat men geslaagd is om de eigene *discrasie* op te ruimen. Tot dit einde moeten wij den empirischen weg bewandelen, en die middelen aanwenden, welke met meer of minder goed gevolg tegen den *lupus* gebruikt zijn.

Bij

Bij het langdurig gebruik van de sublimaat in giften van een achtfte grein, met één grein *extractum cicutae* en afkookfels van de geneeskrachtige houten, de *sassaparilla* en de driekleurige violen, gepaard aan behoorlijk ingerigte uitwendige behandeling heb ik in eenige gevallen de genezing zien tot stand komen. Anderen hebben zich met gunstig gevolg van de roode *praecipitaat* in klimmende giften, van de *proto- en deutojodureta hydrargyri*, van het afkookfel van ZITTMAN en van FELS be- diend.

Het *oleum animale Dippelii*, te beginnen met vijf droppels *pro dosi*, twee of driemaal daags, en opklimmende tot twintig droppels; de spaansche vliegentinctuur in gelijke giften; de arsenic-tinctuur van FOWLER en PEARSON; het *ferrum carbonicum* drie giften ieder van één *scrupel* daags vindt men aangeraden. Ook het *anthrakokali* van POLYA's zoude men kunnen beproeven.

Uitwendige of plaatselij- ke behande- ling. Bijna nimmer slaagt men in de genezing van den *lupus* door inwendige middelen alleen: het zijn de uitwendige, waarvan men het meest te verwachten heeft. De verzachtende, de opwekkende en de vernietigende geneeswijze worden beurtelings door de tijdperken en de geëardheden van den *lupus* aangewezen.

a.) De verzachtende geneeswijze is op hare plaats, zoo lang de lijdende deelen zich in eenen toestand van verhoogde werkdadigheid of wezenlijke ontstekings bevinden. Omslagen van koud water, van *aqua Goulardi* met of zonder *aqua lauro-cerasi*,
van

van sterk gezwavelde witten wijn; stovingen met afkookfel van de *hb. cicutae*, *hyosciami* en *malvae*; pappen van broodkruim met *aqua goulardi* bereid, en inwrijvingen met eene zalf uit eene drachme *magisterium bismuthi* of *flores zinci* op ééne once reuzel, of amandelolie, het laatste om bij ontvelingen der neusgaten en aandoeningen van het slijmvlies der neusholte als smeersel gebezigd te worden, voldoen aan het doel der eerste aanwijzing, namelijk, om den geprikkelden toestand der lijdende deelen te matigen, dezelve zuiver te houden en de roven en korsten weg te nemen.

b.) De prikkelende geneeswijze heeft ten doel: de kwijnende wederwerking in de lijdende deelen op te beuren, en door eene veranderde stemming van het leven der huid hare verweeking tegen te houden, de ziekelijke vegetatie te onderdrukken en de aanwezige knobbels op te lossen.

De oplossing van één grein *sublimaat* in ééne once gedistilleerd water, om de lijdende deelen eenige keeren daags te bevochtigen, heeft mij van alle aangewende middelen het best voldaan. Andere Geneeskundigen hebben zich van het *chloruretum sodii* bij het gelijktijdig inwendig gebruik van het *ferrum carbonatum* van de volgende zalf bediend.

R. *ung. mercuriale* dr. 1 β

camphor. dr. 1

spirit terebinth. dr. 1 β

axungiae porci unc 1

m. s. *ung.*

Om de lijdende deelen mede in te wrijven.

Het bestrijken met *oleum animale Dippelii*, en met *oleum cajeputi* worden medeaangeraden. Door BLASIUS werd het laatste bij een dreigende instorting met vrucht gebruikt. Grootere geneeskrachten worden aan de zwavel- en kwik *jodureta*, door BIETT hoog geprezen, toegeschreven. Van het *proto-joduretum hydrargyri* en van het *proto-joduretum sulphuris* worden twaalf greinen tot eene halve drachma, en van het *deuto-joduretum hydrargyri* van zes tot vijftien greinen met eene once vet gemengd, en daarmede de lijdende deelen een of tweemaal daags zacht ingewreven. De daardoor opgewekte ontsteking en verettering is veelal van een goed gevolg, paal en perk stellende aan de verdere uitbreiding des gebreks. Ook de andere *jodium*- en kwikbereidingen kunnen beproefd worden. De houtazijn, het *creosoot* en de *urias ferri liquida* zijn middelen, welke tot verdere proefnemingen mogen aanbevolen worden.

Bijtmidde-
len. Wanneer na het gebruik der prikkelende middelen, gelijk meerendeels plaats heeft, de *lupus* noch genezen, noch in zijnen voortgang kan beteugeld worden, dan zijn de bijtmiddelen, welke de geheele oppervlakte van het gebrek niet alleen, maar ook den grond van hetzelfde vernietigen, aangewezen. Zij kunnen derhalve aangewend worden, wanneer de *lupus* eenen bepaalden omtrek heeft en zich niet over het geheele aangezicht of eenig ander deel uitgebreid heeft. Wanneer men het bijtmiddel gebruiken wil, dan is het in de eerste plaats noodig, door weekmakende middelen de

kor-

korsten los te maken , daarna weg te nemen en de oppervlakte zuiver bloot te leggen ; ten andere , wanneer de zwerende oppervlakte niet zeer groot is , bestrijke men dezelve in haren geheelen omtrek ; daarentegen , groot zijnde , bij gedeelten , om niet onnoodiger wijze eene al te groote prikkeling te verwekken . Vooral op de randen , welke met kleine knobbeltjes bezet zijn , moeten de bijtmiddelen krachtig gebezigd worden ; want waar dit niet geschiedt , geneest de zweer wel in het middelpunt , maar de randen gaan voort bij gedeelten te verzweren en den omtrek des gebreks te vergrooten . Ook moet zorg gedragen worden , dat men de zachte deelen niet dieper door het bijtmiddel vernietigt dan noodig is , vooral op plaatsen , waar de huid bijna onmiddellijk over de beenderen heen ligt . De roven door het bijtmiddel voortgebragt , blijven gewoonlijk langdurig vastzitten . Wanneer men ziet , dat de *lupus* onder de roof beperkt blijft en niet buiten hare randen uitspat , is het raadzaam , dezelve zóó lang onaangeroerd te laten , tot zij van zelve afvalt ; — heeft het tegendeel plaats , dan zuivert men het gebrek door weekmakende pappen , en wendt daarna andermaal het bijtmiddel aan . Men houde daarbij in het oog , dat de genezing van den *lupus* bijna nimmer door eenmalig gebruik van bijtmiddelen genezen wordt , maar dat dezelve bij herhaling en meermalen gebruikt moeten worden .

Tot de meermalen nu eens met , dan weder zonder vrucht gebruikte bijtmiddelen behooren : het

acidum muriaticum, waarmede ik eenmaal eenen zeer hardnekkigen en wijd verbreiden *lupus* in het aangezicht tot genezing bragt. De *lapis infernalis* en de *lapis causticus*, het *butyrum antimonii*, de *liquor hydrargyri nitricus*, de bijtende zalf van GRAEFE, zamengesteld uit twee drachmen *sublimaat*, een scrupel water en arabifche gom. Van al de bijtmiddelen zijn er geene, waarvan men meer te verwachten heeft, dan van die, welke arfenik bevatten; inderdaad, hoe zeer ik anders tegen het arfenik als geneesmiddel wezen moge, kan ik deszelfs goede werking in den *lupus*, uitwendig gebruikt, niet tegenspreken. Men gebruike eerst het poeder van DUPUYTREN, bestaande uit 98 deelen zoet kwik en twee deelen *arsenicum album* of in grootere hoeveelheid, als de omftandigheden het vorderen om de gezuiverde oppervlakte geheel of gedeeltelijk te bestrooijen. Het fterker werkende poeder van COSMUS wordt met water tot een deeg gemengd, en deze ter dikte van eene lijn op de zweer gebragt. Ook dit middel moet na het afvallen of wegnemen der korften en roven om de veertien of een en twintig dagen herhaald worden. Volgens het oorspronkelijke voorschrift van frère COSME of BERNHARD, later op verschillende wijze veranderd, is het volgende:

R. *Cinnabaris* dr. II

cinerum soleae ustae gr. VIII

sanguin. dracon. gr. XII

arsenici albi gr. XL

m. f. pulvis.

Het

Het gloeiende ijzer tegen den *lupus* aangeraden, heeft niets boven de andere bijtmiddelen vooruit, en voldeed in de gevallen, waarin het werd aangewend, geenszins aan de daarvan opgevatte verwachtingen.

E.

Cancer superficialis, Noli me tagere. Cancer vulgaire, Ulcère cancreux. De huidkanker, de kankerzweer.

Een of meer dicht bij elkander geplaatste knob- Bepaling.
beltjes, welke zich in het weeffel der huid ontwikkelen, met weinig ontsteking, maar met hevig stekende scheuten, die telkens wederkeeren, verbonden. Zij gaan nimmer tot eene goedaardige verettering over, en worden zelden genezen.

ALIBERT, RAYER, GREEN en anderen hebben den huidkanker onder de huidziekten opgenomen, omdat hij zich uit het huidweeffel ontwikkelt, in hetzelfde zijnen zetel gevestigd houdt, en zelden of nimmer andere deelen, die onder de huid gelegen zijn, verwoest.

Gewoonlijk wordt de huidkanker als een heelkundig gebrek beschouwd, en tegelijk met den klierkanker en andere wijzigingen van dit gebrek behandeld. De verdeeling, door RAYER aangenomen, gaat buiten het gebied der huidziekten, en behoort tot dat der heilkunde.

De huidkanker behoort tot de menigwerf voorkomende ziekten. Hij ontwikkelt zich zelden voor

het veertigste, veelmalen eerst na het vijftigste levensjaar, en tast meer mannen dan vrouwen aan. De rug en de zijdedeelen van den neus, de wangen, de lippen en de rug der handen zijn de deelen, op welke de huidkanker bij beide geslachten gezien wordt. Bij mannen zijn het bovendien de roede, het roedehoofd, de balzak en de *anus*; — bij vrouwen de borsten ter zijde van den tepel, de liezen en de uitwendige teeldeelen, welke het meest voor dit gebrek blootstaan. Echter kunnen ook alle andere huiddeelen erdoor aangetast worden.

Beloop en
toevallen.

De huidkanker neemt zijn begin met een' eenigen of met meer dicht bij elkander staande knobbels. Dezelve zijn steenhard, en kunnen van de grootte eens hennipzaadjes tot op die eens guldens zijn. De huid, die de knobbeltjes bedekt, behoudt eerst hare natuurlijke kleur, wordt later loodverwig, blaauw of bruin, omgeven door eenen rooden ontstokenkring. De knobbeltjes worden spoedig of langzaam grooter en vloeijen ineen, wanneer er meerdere aanwezig zijn. De stekende pijnlijke scheuten worden heviger, en keeren binnen kortere tusschentijden terug. De punten der knobbels worden schilferachtig en gaan in eenen kleinen omtrek tot eene onvolkomene verzwering over; deze puisterige zweertjes breken open, en ontlasten een dun, weiachtig, zeer scherp, etterachtig vocht, dat de deelen, langs welke het afvloeit, ontvelt, en eenen eigenaardigen, mufftinkenden reuk verbreidt. De zweer, uit het veretterde knobbeltje ontwikkeld, neemt in omtrek toe, en paart met de steeds voort-

voortdurende stekende pijnen eene hoogst onaangename, knagende gewaarwording. De gedaantewisselingen, die de huidkanker verder ondergaat, zijn verschillend: nu eens vernietigt de zich uitbreidende zweer het weeffel der huid niet alleen, maar ook het daaronder gelegene celweeffel geheel en al, zoodat de spiervezelen, van alle omgevende deelen ontbloot, er uitzien, alsof zij voor eene ontleedkundige demonstratie waren toebereid; — dan weder worden, gedurende de onvolkomene verzweering, de knobbels talrijker, grooter, en verheffen zich wrataardig eenige lijnen boven de oppervlakte, worden blaauwachtig van kleur, en zijn door eenen deels schilferenden, deels vochtig ontvellenden, rooden, ontstokenen kring omzoomd. Ook gebeurt het, dat de zweren eenen harden, verhevenen, eenigzins omgekrulden rand hebben, terwijl hare oppervlakte met bleeke spongieuse vleeschvezeltjes bedekt wordr, die geenen etter, maar een geheel kwalijk riekend vocht afscheiden, dat zeer scherp is, en de uitbreiding der zweer over de nabijliggende deelen bevordert, zoodat dezelve vaak eene groote uitgebreidheid erlangt. Algemeene ziekteverschijnsels vergezellen den huidkanker niet. Eerst, wanneer hij lang geduurd heeft, en hij door pijn en verlies van vochten de krachten uitput, krijgt de lijder een kwaadfappig voorkomen, vermagert en bezwijkt ten laatste aan toevallen van eene hectische koorts of aan *marasmus*.

Zoowel de aanleg als de voorbeschikkende oor- Oorzaak.
zaken van den huidkanker schijnen in eene eigene

dyscrasie, die fomwijlen erfelijk is, gelegen te zijn. Want geringe uitwendige oorzaken, die bij de meeste menschen slechts eene naauwelijks merkbare reactie verwekken, geven bij de personen, tot den huidkanker voorgeschiedt, aanleiding tot zijne ontwikkeling. Veelmalen ontbreken dezelve geheel en al; het eerste knobbelkje, de geheele reeks van toevallen en gedaanteverwisselingen volgen standvastig een geregeld beloop, de natuur en de kunst trotserende, tot dat de dood volgt: ten bewijze, dat ook deze huidaandoening van eenen gewijzigden toestand der geheele bewerktuiging afhangt.

Onderschei-
dings-teeke-
nen. Dia-
gnosis.

De ziekten, waarmede de huidkanker kan verwisseld worden, zijn de Grieksche olifantsziekte, de *lupus* en de syphilitische knobbels. Van de genoemde ziekte onderscheidt zich de huidkanker door zijnen zetel in het weeffel der huid, door de hevige stekende pijnen, het wratachtig aanzien der knobbels, door de vernieling der algemeene bekleedfelen, zonder andere deelen aan te tasten en door de afwezigheid van roven en korsten op de zwerende oppervlakte. De groote en talrijke knobbels, welke het geheele aangezicht op eene schrikbarende wijs ontstellen, kenschetsen de Grieksche olifantsziekte; de onpijnlijkheid, de tot de kraakbeenderen doordringende verzwering, en de roven en korsten, die deze bedekken, den *lupus*; voorafgegane venerische besmetting, de verbreiding der knobbels over het geheele ligchaam, hunne koperkleur, en de nachtelijke beenpijnen, de venerische knobbels. Met den waren kanker kan de huidkan-
ker

ker niet ligt verwisfeld worden , want deze wordt steeds door scirrhus voorafgegaan , en ontwikkelt zich alleen in klierachtige deelen , zoowel op de oppervlakte des ligchaams als in de ingewanden ; zijn omvang is grooter ; hij ontwikkelt zich uit de dieper gelegene deelen naar de oppervlakte , en de verwoestingen , die hij aanrigt , zijn van eenen grooteren omvang.

Deze voorzegging is steeds ongunstig ; want de ^{Voorzegging.} ^{Prognosis.} huidkanker wordt door de natuur waarschijnlijk nimmer , en door de kunst zelden genezen. Aan zich zelve overgelaten , gaat hij gemeenlijk langzaam voort , zoodat niet zelden lijders gezien worden , welke eene lange reeks van jaren dit gebrek met zich rond dragen en eenen hoogen ouderdom bereiken ; terwijl de pogingen , tot genezing in het werk gesteld , wanneer zij de lijdende deelen niet in eens en geheel en al wegnemen of vernietigen , eene ongunstige uitkomst hebben , en zoowel tot de grootere kwaadaardigheid , als tot spoedig toemende verwoestingen aanleiding geven. Van daar de naam *noli me tangere* (roer mij niet aan).

Er zijn tot hiertoe geene geneesmiddelen bekend , ^{Geneeswijze.} welke , alleen inwendig toegediend , in staat zijn den huidkanker te genezen. Het zijn ijdele pogingen , om met het tallooze heir geneesmiddelen , welke tot inwendig gebruik zijn aangeraden , op nieuw proeven te nemen en de lijders te kwellen. Alleen die gevallen , welke met bekende oorzaken gecompliceerd zijn , vorderen die inwendige hulpmiddelen , welke het vermogen bezitten , deze uit den

weg te ruimen. De uitwendige behandeling alleen vermag het heil der lijdens te bevorderen. De bijtmiddelen en het mes, doelmatig aangewend, zoodat het geheele gebrek vernietigd of weggenomen wordt, kunnen den huidkanker genezen, en wel met meer zekerheid, dan zij het den klierkanker doen; de eerste toch, in zijn geheel weggenomen of vernietigd zijnde, keert zeer zelden weder, terwijl de laatste daarentegen, bijna nimmer nalaat, na korter' of langer' tijd terug te komen, hetzij in het deel, waaruit dezelve is weggenomen, hetzij in andere klierachtige werktuigen.

Het mes bezige men, volgens de voorschriften der heilkunde, in al die gevallen, waar de lijdende deelen het mogelijk maken, om den huidkanker in zijne geheele uitgestrektheid, zonder dat het geringste der ontaarde deelen terug blijft, en zonder wanstaltige likteekens na te laten, weg te nemen. De bijtmiddelen zijn aangewezen, waar de lijdende deelen het niet toelaten den huidkanker uit te snijden, dezelve eene groote uitgestrektheid bereikt heeft en wanstaltige likteekens te vreezen zijn. Van al de bijtmiddelen is er geen, dat zoo aanbevelenswaardig is, dan het middel van COSMUS; want, doelmatig aangewend, faalt het minder dan alle andere middelen de genezing tot stand te brengen. Na het afvallen der roven, door het bijtmiddel verwekt, heeft men eene eenvoudige, goedaardige zweer, die door opdroogende en de vleeschgroeiing bevorderende uitwendige middelen geneest. Is de kankerzweer groot, dan wende men

men het bijtmiddel bij gedeelten aan, en herhale hetzelfde, wanneer na de eerste toediening verdachte plaatsen in de randen of op de oppervlakte van de zweer terug blijven. Bewerkt het middel eene buitengewoon hevige ontsteking, dan moet deze door verzachtende pappen en omslagen gematigd worden. Deelt zich de arsenikaal prikkeling aan het vaatstelsel en het darmkanale mede, dan zijn plaatselijke en algemeene bloedontlastingen, en inwendig verzachtende en bedarende geneesmiddelen noodig.

F.

Furunculus. Bloedvin, Bloedzweer.

Eene zeer harde, ontstokene, donkerroode, verhevene zwelling op eenig ligchaamsdeel, van de grootte eener erwt tot die van een hoenderei, die zeer pijnlijk is, bijna nimmer tot oplossing kan gebragt worden, maar tot verettering overgaat, voor de ontlasting van eenen witten prop of kern niet geneest, en een likteeken terug laat. Bepaling.

Op een klein, lichtrood vlekje ontwaart men een hard, diep in de huid gelegen peukeltje, gepaard met brandende jeukte, dat zich vaak tot eene kleine etterpuist verheft, die zich opent, en na ontlasting der geringe hoeveelheid etter, met een geelachtig bruin roofje bedekt; maar in plaats van de verwachte genezing, volgen er stekende en boerende pijnen in de diepte; het knobbeltje in de huid wordt spoedig grooter, en gaat tot eene harde, Belooft en
toevallen.

de, min of meer uitgebreide zwelling over, afgeperkt door eenen harden, rooden, ontstokenen kring. De steeds toenemende pijnen worden zeer hevig kloppend, en roven den lijder rust en slaap. De eerst alleen plaatselijke prikkeling van het lijdende deel, breidt zich alsnu over het geheele vaatstelsel uit, en verwekt eene ontstekingskoorts, gepaard met meer of min duidelijk ontwikkelde gastrische verschijnselen; de tong is wit beslagen, de dorst groot; de eetlust ontbreekt; bij zeer gevoelige lijders treden somwijlen krampachtige aandoeningen, ijlhoofdigheid, en bij kinderen stuipen te voorschijn. Binnen een tijdsverloop van vier tot zes dagen verheft zich de zwelling met eene wecke, puistaardig gevormde punt, van geelachtige of witte kleur. Terwijl de omtrek nog hard blijft, ontwaart men in het midden der zwelling geringe, onduidelijke vochtgolving; vervolgens doorbrekende, ontlast eerst bloedige etter, later eene waterachtige, geelkleurige vloeistof, ten laatste eene vezelachtige, witte prop, de zoogenaamde pit of kern, waarna de pijnen verminderen, de harde en roode omtrek verwelkt en verbleekt; de kleine, door ontlasting van den kern ontstane holte, vult zich met vleeschheuveltjes; in den omtrek schilfert de opperhuid af. De genezing komt spoedig tot stand, maar er blijft nog gedurende eenigen tijd eene donkerroode of paarsche vlek terug, die allengskens verbleekt en tot een klein blijvend gepunteerd likteeken inkrimpt. Wanneer de ontsteking afneemt, alvorens de verettering

ring tot stand komt, dan gaat de bloedzweer tot verharding over (*Furunculus induratus*, *scirrhus*). De nablijvende verharding, van de grootte eener erwten tot die eener hazelnoot, biedt gewoonlijk aan alle oplosfende middelen tegenstand, en wordt alleen door eene nieuwe ontsteking en volkomene verettering opgeruimd. Wanneer de ontsteking zeer hevig is, de lijdens aan kwaadsappigheid lijden, de oorzaken voortduren, de bloedzweer op deelen voorkomt, waar de huid min rekbaar en gespannen is, of wanneer zij verwaarloosd of ondoelmatig behandeld wordt, kan heetvurige versterking plaats grijpen.

Op alle deelen des ligchaams kunnen bloedzweren voorkomen; het menigvuldigst echter ziet men ze op die deelen, waar het celweeffel onder de huid zeer ruim is, veel vet bevat en veelmalen aan uitwendige drukking blootstaat, zoo als op den rug, de billen, de dijen, enz. Het getal der bloedzweren is verschillend: er bestaat slechts ééne enkele zweer, er zijn eenige weinige of er is een grooter getal zweren gelijktijdig aanwezig, of ook zij volgen gedurende eenigen tijd elkander op.

Omtrent den eigenlijken zetel van de bloedzweer heerschen verschillende meeningen: men heeft denzelven gezocht in de huidkliertjes, in de smeerbeursjes, in de haarvaten der huid, in het celweeffel en in de vezelachtige verlengfelen, de grenscheiding van de binnenste huidoppervlakte en het daaronder gelegene celweeffel.

Men vindt de bloedzweer het menigvuldigst bij
kwaad-

kwaadsappige personen, bij lieden, welke van zamenvloeiende pokken en andere heete huidziekten herstellen, na rot- en andere kwaadaardige koortsen; bij syphilitische lieden en bij hen, die veel en langdurig kwikmiddelen, voornamelijk sublimaat gebruikt hebben; bij deze laatste meerendeels in eene gewijzigde gedaante. De ontstekings-toevallen zijn minder hevig; de verettering grijpt langzaam plaats, en de genezing behoeft veel tijds (*Furunculus chronicus*). Meermalen komen gelijktijdig vele van deze slepende bloedzweren te voorschijn, en haar harde ontstokene omtrek is met een' schilferenden uitslag bedekt.

Oorzaken.

Meerendeels ontstaat de bloedzweer alleen door uitwendige oorzaken, te gering om het welbevinden der lijders te storen; echter kunnen zij ook door inwendige schadelijkheden ontstaan. De voorgeschiedheid om er door aangetast te worden, is bij den eenen mensch veel meer dan bij den anderen ontwikkeld. Het laatste vindt vooral plaats bij jonge volbloedige lieden; bij hen, die de reinheid der huid verwaarloozen; die eene zeer aandoenlijke huid hebben, en veelmalen aan belemmering der uitwaseming onderhevig zijn; die dikwijls met gastrische ophooping en stoornissen in de afscheiding der vochten van de spijsvertering worstelen; met onregelmatigen stondenvloed, aanbeijen en andere belemmeringen van de afscheidingen en ontlastingen te kampen hebben. Tot de uitwendige oorzaken behooren: het paardrijden; kneuzingen; de invloed der seizoenen, vooral van het voorjaar; ver-

verhitting door geestrijke dranken en ligchamelijke inspanningen. Ook bedient zich de natuur van de bloedzweer als *crisis* van algemeene en van plaatselijke ziekten: de lijders bevinden zich dan behagelijker en genieten eene betere gezondheid; van hier dan ook het zeggen: bloedzweren zijn gezond. Een mijner genees- en heilkundige vrienden, met den zeer kennelijk ontwikkelden aanleg voor *phthisis pulmonalis*, genoot voortdurend, betrekkelijk zijne teedere bewerktuiging, eene goede gezondheid, zoo lang hij jaarlijks meermalen door een groot aantal bloedzweren werd aangetast. Eindelijk bleven dezelve achterwege, en er volgden hevige maagkrampen en bloedspuwingen, en binnen den tijd van een jaar bezweek de lijder aan de etterende longtering.

Besmettend, gelijk eenigen gewild hebben, is de bloedzweer niet, en zonder regtstreeks epidemisch te zijn, komt zij toch den eenen tijd veelvuldiger dan den anderen voor. Er ontstaat dan eene groote, die spoedig door vele kleinere gevolgd wordt, met afschilfering der opperhuid van den geheelen lijdenden omtrek. Het mag wel hoofdzakelijk wegens dit beloop zijn, dat men de bloedzweer onder de huidziekten heeft opgenomen.

Het ontstekingsachtige beloop, de verettering, de afscheiding en ontlasting van den kern en het nablijvende likteeken, dat alleen met dat der koe-
 onderscheidingsteekenen.
 Diagnosis.
 pokken kan verwisseld worden, onderscheiden de bloedzweer van alle andere ziekten der algemeene bekleedselen.

Deze

Voorzegging. De voorzegging is steeds gunstig, want de genezing komt binnen een en twintig dagen tot stand. Zeer groote bloedzweren op hoogst gevoelige deelen en bij aandoenlijke lijders, gaan somwijlen met eenige hevige koortsaanvallen en ijlhoofdigheid gepaard, zonder gevaar aan te wijzen. Het eigendommelijke der bloedzweer van meermalen terug te komen, maakt de voorzegging onaangenaam. Wijd uitgebreide verzweringen en verstervingen, met koortsen van een ongunstig karakter verbonden, behooren niet meer tot de bloedzweren, maar tot den *anthrax* en de zwarte blaar.

Geneeswijze. De inwendige of algemeene behandeling is noodig, wanneer de bloedzweren in groote getallen voorkomen en dikwijls terug keeren. Bij jonge volbloedige lieden zijn bloedzuigers, bloedige koppen en zelfs aderlatingen aangewezen, om de congestiën naar de huid te matigen. Trage en verstopte buikontlastingen vorderen lakfeermiddelen; onreinheid der huid en onderdrukte uitwaseming, warme waschingen en baden en het inwendige gebruik van zwavel, *antimonium*, *magnesia* en *cremor tartari*; *aloes*, *jalappe* of *rhabarber* bij grootere traagheid der verrigtingen van de buiksgewanden en belemmering van den bloedsomloop in het stelsel der poortader. De aanwezigheid der venerische, scrophuleuse of scabieuse dyscrasiën worden door kwik-, spiesglas- en zwavelbereidingen bestreden, ondersteund door afkookfels der geneeskundige houten. Eene fontanel, op den arm langdurig opgehouden, voorkomt de bloedzweer
bij

bij daartoe genegene personen, en verhindert, dat dezelve, achterwege blijvende, tot andere meer belangrijke ziekten aanleiding geeft.

Door bloedzuigers te zetten op het eerst te voorschijn komende puistje, wil men, dat de bloedzweer kan voorgekomen worden. Met beter gevolg heb ik mij van de graauwe kwikzalf bediend; edoch men slaagt zelden in de poging tot oplossing, en de verettering grijpt bijna altijd plaats. Het is derhalve veelal beter, terstond weekmakende, verzachtende pappen en omslagen te gebruiken, dan de lijders met vruchteloze pogingen te kwellen en den tijd te verliezen. De gewone pappen van haver-gort, van lijnkoeken-meel of kruim van wittebrood met melk verdienen, boven alle andere middelen de voorkeur: zij matigen de ontsteking, verzachten de pijn en bespoedigen de verettering, terwijl de meer prikkelende oplegfels, ook als huismiddelen veelvuldig in gebruik, juist het tegendeel bewerken. De prikkelende pleisters en zalven, de gebradene uijen, het koekdeeg, het zuurdeeg en de pikpleisters zijn meer schadelijk dan nuttig. In die gevallen, waarin de chronische bloedzweer hard blijft en niet behoorlijk tot verettering komt, zijn de prikkelende oplegfels, pleisters en smeersels noodig, om de kwijnende ontsteking tot de veretterende op te wekken. De verettering tot stand gekomen zijnde, late men de opening aan de natuur over; de aangeradene kunstmatige opening met het mes vertraagt de genezing meer, dan dat zij dezelve bespoedigt, en veroorzaakt den lijder onnoodige

Uitwendige
behandeling.

pijnen. De geopende zweer verbindt men met *unguentum basilicum*, en houde met het pappen vol, zoo lang tot dat de kern ontlast is; daarna verbindt men, droog of nat, met eene opdroogende zalf, tot dat de genezing tot stand is gekomen, hetwelk binnen weinige dagen geschiedt.

G.

Arthrax, Carbuñculus, Anthracophlyctus, Carbo Furunculus gangraenosus, Furunculus malignus, Pruna. Pestkool, Karbonkel.

Bepaling. De harde, eenigzins vlakke zwelling van verschillende grootte, ontwikkelt zich op dezelfde wijze als de bloedzweer, van binnen naar buiten. De pijn is in den beginne verdoovend, later hevig stekend; de kleur loodverwig of donker blaauwachtig, en in het middelpunt is eene kleine blaas aanwezig, gevuld met bloedige wei. Zeer zelden volgt de genezing door oplossing, maar er grijpt eene kwaadaardige, vernielende verettering met versterking plaats.

Men onderscheidt den *anthrax* in den *sporadischen* en den *contagieusen*: de eerste komt maar zelden bij enkele personen te allen tijde voor; de laatste heerscht gewoonlijk *epidemisch* (*bubo pestilentialis*), gaat met de pest en andere kwaadaardige koortsziekten gepaard en is veelmalen *critisch*.

Belooft en toevallen. Het knobbeltje, waarmede de *anthrax* begint, is eerst klein, niet grooter dan eene erwte, wordt spoedig grooter, en bereikt, vaak binnen weinige uren,

uren, den omtrek van eenige duimen middellijn. Gedurende het eerste tijdperk is de zwelling hard, weinig verheven, diep onder de huid gelegen en vastzittend, de loodkleur van het middelpunt wijkt voor geene drukking, terwijl de roosachtig roode omtrek onder den drukkenden vinger voor eenige oogenblikken zijne kleur verliest en bleek wordt. De vergezellende pijnen worden zeer fcherp en snijgend; zelden blijven dezelve stomp, drukkend en verdoovend. In omtrek grooter wordende, gaat de *anthrax* binnen drie tot vijf dagen in het tweede tijdperk over. Het middelpunt wordt nu week, deegachtig en bevat eene bloedige etterachtige stof met vlokken van half opgelost, en verteerd celweeffel. De loodkleur, die zich uit het middelpunt verder naar den omtrek uitbreidt, gaat tot heetvurige verfterving over en wordt zwart; de opperhuid laat los, en het ontbindende huidweeffel breekt door; na de uitvloeijing van eene kleine hoeveelheid bloedigen flechten etter, komt het inwendige, door verfterving aangedane weeffel bloot. Door de voortgaande verfterving wordt de opening hoe langer hoe grooter, en de geheele oppervlakte van het verstorvene gezwel, ontdaan van alle omliggende deelen (*abscessus gangraenosus*) verspreidt eenen bedorvenen reuk, minder walgelijk echter dan bij andere verfterving plaats heeft. Al-
lengskens worden de verstorvene weeffels in den omtrek en grond los, en de huid, ontdaan van hare verstorvene gedeelten, heeft een gekorven aanzien en is in lappen verdeeld. De stoffen, die

ontlast worden, bekomen een beter, meer etterachtig aanzien; de gezwollene omtrek wordt zacht en neemt af; de pijnen verminderen; de algemeene ziekte-verschijnselen ruimen meer en meer op; de huid herneemt hare natuurlijke kleur; de losse huidlappen hechten zich vast; de holte der zweer vult zich door nieuwe vleeschgroeiing. Na de genezing blijft er een tamelijk diep ingedrukt donkerkleurig likteeken terug, dat eerst na een ruim tijdsverloop bleek en wit wordt. Meermalen komt het voor, dat de *anthrax* eene zeer groote uitgebreidheid erlangt, en zoowel door verettering als door versterfing wijd uitgebreide verwoestingen, met gevaar voor het leven, in de nabijgelegene deelen aanrigt.

Alhoewel niet altijd duidelijk ontwikkelde algemeene ziekte-verschijnselen den *anthrax* voorafgaan, zich gedurende zijn beloop ontwikkelen of eerst later volgen, zoo mag toch als hoogst waarschijnlijk worden aangenomen, dat eene algemeene ziekte-gefteldheid aanwezig is, staande in een oorzaakelijk verband met den *anthrax*. Meerendeels daarentegen overtreft de algemeene ziekte-toestand in belangrijkheid ver het plaatselijk lijden; de vergezellende koorts neemt het rot- of zenuwachtig karakter aan; alle daaraan eigene toevallen treden te voorschijn, het leven des lijders verkeert in gevaar, en niet zelden, vooral bij mannen boven den vijftigjarigen leeftijd gevorderd, volgt de dood door ontbinding des bloeds en uitputting der krachten.

De *anthrax* heeft zijnen zetel in het celweeffel onder de huid, zijn begin nemende met gedeeltelijke verharding van dat weeffel, gepaard met ontsteking, die spoedig tot heetvurige verfterving overgaat, door inwendige oorzaken ontstaan.

De *anthrax* behoort tot de zelden bij ons voorkomende ziekten, die volwasfene en bejaarde, zelden jeugdige personen en bijna nimmer kinderen aantasten. Hij fchijnt aan het mannelijke geflacht vijandiger te zijn dan het vrouwelijke. Gewoonlijk heeft hij in den nek, tusfchen de fchouderbladen, den rug en de zijdedeelen van de borst en van den onderbuik zijnen zetel, zelden aan de ledematen of aan andere deelen. De zitplaats, de uitgebreidheid, de spoedig plaatsgrijpende verfterving en de belangrijkheid der algemeene ziekte-toevallen onderscheiden den *anthrax* van de bloedzweer en van alle andere huidziekten.

De *anthrax* is fteeds en in alle voorkomende gevallen eene belangrijke, meerendeels eene gevaarlijke en veelmalen eene doodelijke ziekte, vooral bij bejaarde lieden met gevaar verbonden. Der natuur ontbreken de noodige krachten om een perk te ftellen aan de zich wijd en zijd uitbreidende verfterving, terwijl de ontoereikende wederwerking van het vaatftelfel de krachten nog meer uitput en het bloed in de ontmenging deel geeft. Aan de borst en den buik kunnen de zamenftellende deelen verwoest en derzelver holligheden geopend worden. Voorafgegaan door de geheele reeks van verfchijnselen en toevallen, met de doorboring dier hollighe-

Voorzegging.
Prognosis.

D d 3

he

heden verbonden, maakt de dood een einde aan de folterende kwellingen des lijders.

Behandeling. Bij sterke volbloedige lieden kunnen zoowel plaatselijke als algemeene bloedontlastingen, gedurende de begonnene ontwikkeling van den *anthrax*, zoo lang het vaatstelsel in eene actieve ontslekingsreäctie verkeert, met vrucht worden aangewend, mits de voorzigtigheid de spaarzame hand des geneesheers bestiere. Een braak- of lakseermiddel, het laatste zamengesteld uit jalappe en zoet kwik zijn in het begin der ziekte door de gastrische verschijnselen en trage buiksontlasting aangewezen. Zij oefenen gewoonlijk eenen verbeterende invloed uit op den algemeenen ziekte-toestand, waardoor de voortgang van het plaatselijk lijden beperkt wordt. De ontlastingsmiddelen kunnen zoo het noodig is, herhaald worden. Vervolgens trachte men, de krachten raadplegende, door kina, minerale zuren, kamfer, arnica, serpentaria enz. de natuur te ondersteunen, de versterking te beperken, en de verettering te bevorderen en te verbeteren. De vergezellende koortsen moeten volgens hare geaardheden behandeld worden.

**Plaatselijke
behandeling.** Men beginne de behandeling van den *anthrax* gedurende het tijdperk van zijne ontwikkeling, waar i ch daartoe gelegenheid aanbiedt, met weekmakende en verzachtende pappen. Zoodra echter de ontwikkeling zoo verre is voortgegaan, dat zij het bestaan van den *anthrax* stellig aanwijst, en deszelfs loodkleurig middelpunt de beginnende heetvuurige versterking kenbaar maakt, dan is het tijdperk ge-

gekomen , waarin eene meer doortastende behandeling gevorderd wordt. Het gezwel niet zeer uitgebreid zijnde , doorklieve men hetzelve met eene kruisfnede , die eenige lijnen over de randen heen loopt en den *anthrax* tot op den grond verdeelt. Een grootere omvang des gebreks vordert meerdere en zoo vele insnijdingen , als er noodig zijn om hetzelve geheel bloot te leggen , en de spanning weg te nemen. Men verbindt vervolgens met balsmachtinge , ettermakende zalven , en bedekke den geheelen omtrek van het lijdende deel met eene pap uit havergort en rooden wijn of wijnmoer bereid , of zamengesteld uit andere opwekkende en bederfwerende zelfstandigheden. Om den voortgang der versterking te beperken , vindt men het houtskoolpoeder , den kamfer , de myrrhe , het *oleum terebinthinae* , het houtzuur , de oplossing van den chloorkalk , van het chloorzuur en zelfs het gloeiende ijzer aangeraden. De kina , de kamfer , en de arnica , in afkookfels , oplossingen en aftreksels of in poeder gemengd en eenige lijnen dik op het lijdende deel gestrooid , hebben mij ontheven van het gebruik van andere middelen , daar de gunstige uitslag niets beters te wenschen overig liet. Naarmate de verstorvene deelen los worden , neemt men dezelve met eene scherpe schar of bistouri weg , om de genezing te bespoedigen. Van alle bedorvene deelen ontdaan , verkrijgt men eene zuivere zweer , die men met opdroogende middelen tot sluiting brengt. De nablijvende zwakte vordert kina , en eenen versterkend voedenden leefregel.

H.

Pustula maligna, carbunculus contagiosus, carbunculus septentrionalis, pustula gangraenosa. De zwarte blaar.

Bepaling. Eene rood- of blaauwkleurige blaar, van verschillende grootte, gevuld met bloedige wei, eenen harden knobbel tot grondslag hebbende, die sterk toeneemt, met eenen hoogrood roosachtig gekleurden omtrek, die spoedig tot versterking overgaat.

Toevallen en beloop. In het aangezicht, aan den hals, op de handen of eenig ander lichaamsdeel, van kleederen ontbloot, ontstaat een knobbeltje of blaartje, ter grootte van eenen gierstkorrel, zonder algemeene ziekte-verschijnselen en pijn, maar gepaard met prikkeling en jeukte; gewoonlijk is slechts één zoodanig puistje aanwezig, zelden meer. Opengekrabd ontlast zich eene gele of bloederige wei, de omtrek wordt hard en zwelt, en is later door eenen rooskleurigen kring omgeven. Ongeopend blijvende, neemt het blaartje aanhoudend in omvang toe, en krijgt eene blaauwe of zwarte kleur. De zich meer en meer uitbreidende harde en gezwollene omtrek, wordt achtervolgend door loslating der opperhuid bedekt met blaren van verschillende grootte, welke bersten, en eene groote hoeveelheid bloedige, kwalijk riekende wei ontlasten. De blootkomende huid is droog, hard en zwart als leder; deze mumiënaardige korsten krimpen ineen, blijven op de onderliggende deelen vastzitten, en eene ver uitgebreide zweling omgeeft dezelve kringvormig.

vormig. Met weinig pijn en verschillende kleurwisselingen, verheffen zich blaren, welke, hetzelfde beloop als de eerste volgende, vaak geheele lichaamsdeelen en menigmaal het grootste deel van de oppervlakte des lichaams bedekken. De spoedig volgende overgang in versterking der aangedane deelen heeft niet alleen in den oppervlakkigen omtrek plaats, maar dringt ook in de diepte door, en gaat zoo lang voort, tot dat eene opgewekte actieve ontstekingsdaaraan grenzen stelt en eene goede verettering tot stand brengt; of, waar dit geene plaats vindt, door verdere uitbreiding den dood veroorzaakt.

Dit gewone beloop der zwarte blaas kan veelvuldige wijzigingen opleveren, afhankelijk van de individuele gesteldheid des lijders, van zijne betrekkingen en leefwijze, van de geneeskundige behandeling, van eigendommelijke wijzigingen der finetstof, van lucht- en landstreek en van andere *atmosphaerische* invloeden.

Gedurende het beloop van het plaatselijk lijden, breidt zich de ontstekingslangs den loop der waternerven als roode strepen uit, en verwekt pijnlijke zwelling in de daartoe behoorende klieren. Gelijktijdig treden algemeene ziekteverschijnselen op den voorgrond, wanneer zij niet vroeger aanwezig waren. Somwijlen worden de lijders reeds gedurende den eersten nacht, die op het ontstaan van het knobbelje of blaasje volgt, onrustig, en klagen den volgende dag over afgematheid en trekkingen door de leden, eene prikkelende ont-

waarwording in den omtrek der blaar; zij worden verdrietig, kwaadgeluimd, en al de verschijnselen, welke het ontwikkelings-tijdperk van koortsen vergezellen, treden te voorschijn. Binnen den tijd van eenige dagen verheffen de toevallen tegen den avond en bereiken eene verontrustende hoogte; de nachten zijn slapeloos; de tong is met een wit beflag bedekt, verbonden met misfelijkheid, walging en neiging tot braken. Duizeling, doffe hoofdpijn, benaauwdheden en flauwten grijpen achtereenvolgend plaats. De huid wordt droog en heet; de pols rasch en klein of langzaam en groot, gespannen, hard, onregelmatig en tusfchenpoozend; de ademhaling kort, hijgend en afgebroken; de afscheidingen ondergaan, zoowel in hoedanigheid als hoeveelheid veranderingen: behoudende pogingen der natuur, welke meermalen eene volkomene of onvolkomene *crisis* tot stand brengen. De *urin*-afscheiding is fpaarzaam, ende buiksontlasting traag of onderdrukt, de dorst neemt toe, en de lijders verlangen naar koude en zure dranken. Naar mate de plaatselijke verftoring toeneemt, verzwaren de algemeene ziekte-toevallen; de koorts verheft en ontwikkelt een bepaald karakter, opklimmende van het gastrifche tot het roten zenuwachtige. De flauwten worden menigvuldiger; de verftandelijke vermogens ftomp; de voorftellingen, verward zijnde, verwekken ijlhoofdigheid; flaapzuchten en hik verkondigen den naderenden dood. Reeds in de eerfte dagen der ziekte fterven de lijders, fomwijlen onverwacht, of de worfteling duurt langer, en het leven wordt tot den zevenden dag

dag gerekt. Geëvenredigd aan de meerdere of mindere ontwikkeling der gevaardreigende verschijnselen, is de zwarte blaar met grooter of geringer gevaar verbonden. Het langzamer verloop der ligtere gevallen verschafft aan de kunst gelegenheid en aan de natuur tijd om de ziekte te bestrijden, te overwinnen en aan den dood zijne prooi te ontrukken.

De algemeen aangenomene oorzaak der zwarte blaar is een dierlijk gif, dat in de ligchamen van dieren ontwikkeld wordt, welke door het miltvuur zijn aangetast. Oorzaken.

De zwarte blaar komt hoogstwaarschijnlijk alleen dan voor, wanneer het miltvuur onder het vee heerscht, en wel bij lieden, die zieke dieren hebben behandeld en gepleegd, of de huidharen, wol, enz., van dezelve herkomstig, hebben verwerkt; ook worden bijna uitsluitend die ligchaamsdeelen aangetast, welke door geene kleederen bedekt zijn, en derhalve voor de onmiddellijke besmetting het meest blootstaan. Het geheele plaatselijke en kleine begin des gebreks, en de van buiten naar binnen doordringende versterking, pleiten almede voor de plaatselijke besmetting, zoowel door onmiddellijke aanraking van en inenting met de smetstof door stekende infekten. Of het vleesch, het bloed, de melk, enz. van miltvuur-zieke of van daaraan gestorvene dieren, tot spijs en drank gebruikt, de zwarte blaar veroorzaken, is ten minste twijfelachtig, te meer daar het miltvuur-gif, in de maag gebragt zijnde, even als het gif van slangen, en andere dieren, ontleed en onschadelijk wordt. De

oor-

oorspronkelijke ontwikkeling der zwarte blaar bij den mensch, uit algemeene schadelijkheden en *miasmata*, en de regeneratie der smetstof in de zieke ligchamen der menschen, in dier voege, dat dezelve op gezonde overgebracht, de zwarte blaar door besmetting voortbrengt, zijn onbelliste vraagstukken, daar het aan geenen bewijze voor en tegen ontbreekt.

Bij ons, althans in de provincie *Zuid-Holland*, komt het miltvuur onder het rundvee, vooral in heete en drooge zomers veelmalen voor, zoodat ieder veehouder en landbouwer daarmede bekend is. Dat menigmaal het vleesch, het vet en de melk van miltvuur-zieke beesten tot voeding gebruikt, de huid, het haar en andere deelen verwerkt worden, is niet te betwijfelen, en toch komt de zwarte blaar zeer zelden voor. Ruim twee jaren geleden, tijdens het miltvuur meermalen voorkwam, werden achtervolgens drie mannen, zijnde twee boeren uit dezen omtrek en een schuitenjager hier ter stede door de zwarte blaar aangetast. De twee eersten hadden zich bij het afhuiden van beesten, door het miltvuur omgekomen, aan de handen gewond; de derde insgelijks, maar deze had tevens van het vleesch gegeten en een gedeelte van hetzelfde tot verder gebruik gezouten. De twee eersten herstelden, de laatste bezweek binnen weinige dagen, nadat bijna het geheele ligchaam met verftervende blaren bedekt was; maar de herstelden waren, matig levende lieden; de overledene was een dronkaard; — ook hadden nog andere personen van het vleesch gegeten en allen bleven gezond.

De

De zwarte blaar ſchijnt, gelijk andere befmettende huidziekten, het eigendommelijke te bezitten van den mensch niet meer dan eenmaal in het leven aan te tasten, en door de plaats gehad hebbende befmetting de vatbaarheid tot latere te vernietigen.

Plaatselijke omſtandigheden ſchijnen eenen gewigtigen, alhoewel onbekenden invloed op de ontwikkeling van het miltvuur bij het rundvee en op de zwarte blaar bij den mensch uit te oefenen; het laat zich anders niet verklaren, waarom beide ziekten in het veerijke *Nederland*, en nog meer in *Engeland*, waar de zwarte blaar volgens JONATHAN GREEN bijna nooit gezien wordt, veel zeldzamer dan in *Polen*, *Silezië*, *Pruisfen*, *Duitschland* en *Frankrijk* voorkomt.

Het eigendommelijke beloop en de volgreeds der eigene toevallen onderſcheidt de zwarte blaar van alle andere huidziekten; van den *anthrax*, waarmee zij bij hare ontwikkeling en haar beloop zoude kunnen verwisfeld worden, onderſcheidt zij zich door haar oppervlakkig begin en uitbreiding naar de dieper liggende deelen, door de met bloedige wei gevulde blaar, het groot getal blaren, dat achtereenvolgend ontſtaat en de ras voortgaande verſterving.

In al de gedaanten, waarin de zwarte blaar voorkomt, is zij eene gevaarlijke, vaak doodelijke ziekte. De uitgang is gewoonlijk ongunſtig, wanneer het aangezigt en de hals de deelen zijn, waarop zij zich ontwikkelt, wanneer de geheel verſche miltvuur-ſmetſtof onmiddellijk in eene nog bloeden-

Kenteeke-
nen. Dia-
gnosis.

Voorzeg-
ging. Pro-
gnosis.

dende wonde gebragt wordt; wanneer eerst in de gevorderde tijdperken geneeskundige hulp wordt ingeroepen, en de koorts reeds het rot- of zenuwachtig karakter heeft aangenomen. Minder ongunstig is de voorzegging, wanneer de zwarte blaar op de ledematen voorkomt en geene der voornoemde ongunstige omstandigheden aanwezig zijn. De genezing is waarschijnlijk, wanneer de lijder den zevenden dag overleeft, geene nieuwe blaren opkomen, de versterking stil staat en eene etterende afscheidingslijn tusfchen het doode en levende gezien wordt, terwijl de zwelling afneemt, de vergezellende koorts, na voorafgegane kritische verschijnselen nalaat, en alle andere toevallen verminderen.

Geneeskundige behandeling.

In de eerste plaats trachte men zoo veel mogelijk de besmetting voor te komen, door, tijdens het heerschen van het miltvuur, tegen alle aanraking van zieke dieren, tegen het openen en afhuiden der gestorvene, tegen de behandeling en bearbeiding van vet, huiden, haren en wol, herkomstig van vee, door het miltvuur aangetast of aan hetzelfde gestorven, te waarschuwen; de noodige vertoogen te doen, en door tusfchenkomst der besturen, de afzondering van het zieke en gezonde vee te bewerken; te verhinderen, dat geen ziek vee geslagt, niets van hetzelfde tot voedsel voor menschen gebruikt, en het gestorvene vee terstond in diepe kuilen begraven worde.

Waar de besmetting reeds plaats gehad heeft en de ziekte het ontwikkelingstijdperk is ingetreden,

lei.

leide en beftiere men de behandeling naar de volgende aanwijzigingen.

1. Men wende middelen aan, om de nog in het befmette deel aanwezige fmetstof te vernietigen, vóór dat zij door de opflurpende vaten is opgenomen en eene algemeene wederwerking verwekt heeft. Zoowel werktuigelijke als fcheikundige middelen vindt men tot dit einde aangeraden. Tot de eerfte behooren het uitfnijden van den geheel omtrek van en met het befmette deel, zoodat niets van hetzelfde terug blijft; infnijdingen en daarna uitwasfchingen der ingekorvene deelen met warm water, (waarmede azijn, zout, oplosfingen van chloor-kalk en chloor-water, naar omftandigheden kunnen verbonden worden); drooge koppen en zuigpompen. De ervaring heeft echter geleerd, dat men door deze middelen zelden flaagt, het doel te bereiken, en dat derzelver nuttigheid zich alleenlijk beperkt tot het tijdstip, dat onmiddellijk op datgene volgt, waarin de befmetting heeft plaats gehad.

Scheikundig tracht men de fmetstof te vernietigen, door het lijdende deel met eene laag poeder van houtskool te bedekken; door bevochtiging met houtazijn, wasfchingen met oplosfingen van chloorbereidingen en berooken met chloor-dampen. Het gloeiende ijzer, gewis het krachtigfte middel om de befmetting geheel te vernietigen, is alleen op die plaatsen aanwendbaar, waar de lijdende deelen in genoegzamen omvang en diepte, zonder andere nadeelige gevolgen, kunnen vernietigd worden.

den. Ook de bijtmiddelen, de hellesteen, de bijtsteen, de spiesglasboter en de delfstozuren verdienen aanbeveling.

2. Waar de besmetting reeds de geheele bewerktuiging in haren werkring betrokken heeft, ondersteune men de natuur, om den voortgang der versterving op te houden, en het reeds verstorvene van het gezonde af te scheiden. Men opene de aanwezige blaren, en bestrijke de van hunne opperhuid ontdane deelen met spiesglasboter, of bevochtige dezelve met bijtende loog, na vooraf gemaakte inkervingen, waar de versterving dieper is doorgedrongen. Insgelijks zijn de bederfwerende middelen heilzaam ter bereiking van het voorgestelde doel. De oplossing van kamfer in wijnazijn, de aftreksels der *arnica*wortel, de afkooksels der kina met kamfergeest, en de strooipoeders uit kina, kamfer, *arnica* en *myrrhe*, heb ik in de mij voorgekomene gevallen met vrucht gebruikt. De doode, door de natuur of door de bijtmiddelen gemaakte korst bestrijke men, na toereikende inkervingen met terpentijnolie, en verbind met eene prikkelende, ettermakende en bederfwerende zalf, ten einde een' ligten graad van actieve ontsteking op te wekken, waardoor de natuur de verettering en de afscheiding der verstorvene deelen bewerkt. De nablijvende zuivere zweer wordt door opdroogende middelen genezen.

Inwendige
behandeling

Zijn de algemeene ziekteverschijnselen van weinig belang; is de koorts gering, zonder bepaald karakter, dan geve men de minerale zuren in ruime gif-

gisten, en toereikend verdund tot drank. De jeugdige leeftijd des lijders, groote volbloedigheid en duidelijk ontwikkelde ontstekingsstoevallen, kunnen plaatselijke en algemeene bloedontlastingen, in het begin der ziekte met omzigtigheid in het werk gesteld, noodig maken. Gelijktijdig zijn alsdan verkoelende lakseermiddelen en het salpeter aangewezen. Waar gastrische verschijnselen aanwezig zijn, of de vergezellende koorts de gastrische geaardheid heeft, dan is een krachtig werkend braakmiddel, gevolgd door lakseermiddelen, aangewezen. De rot- en zenuwachtige geaardheden der koorts, vorderen de tegen deze aangewezene geneeswijze. In de meer gevorderde tijdperken der ziekte, trachte men de kwijnende geneeskrachten der natuur op te beuren en te ondersteunen door een ruim gebruik van kina, minerale zuren, *serpentaria*, *arnica*, wijn, kamfer, enz.

8ste Orde.

Maculae, vlekken. *Dyschroa*, huidverkleuring. *Achroa*, huidontkleuring.

Tot deze orde der huidziekten behooren de blijvende kleurveranderingen van de geheele oppervlakte of van enkele gedeelten des ligchaams, ten gevolge van de vermeederde of verminderde afscheiding der kleurstof, zonder ontsteking en zonder uitvating van bloed, met geene eigene, noch plaatselijke, noch algemeene ziekteverschijnselen verbonden.

Men onderscheidt derhalve twee soorten van vlekken, namelijk:

a) Verhoogde en veranderde kleur der kleurstof (*Dyschroa*, *Ephelis*, *Naevus*) met uitfluiting van die algemeene of plaatselijke kleurveranderingen der huid, ontstaan ten gevolge van algemeene ziekten of van het gebruik van zekere geneesmiddelen, namelijk: de donkerblauwe of zwarte kleur, *parachroma melanosus*; de geelzucht, *icterus*; de bleekzucht, *chlorosis*; de brons en zwarte kleur door salpeterzuurzilver en kwikbereidingen, *parachroma lapidis infernalis et hydrargyri*.

b) Ontbrekende of verminderde kleurstof, algemeen of plaatselijk (*Achroa*). 1 *Albinismus*. 2 *Vitiligo*.

a. 1. *Ephelis*, *Lentigo*. Sproeten.

(Zie pag. 300.)

Bepaling.

Kleine gele of bruine vlekken, die staan blijven, voor drukking niet wijken, van elkander afgezonderd zijn, of door uitbreiding tot grootere vlekken zamenvloeijen, die den omtrek van eenen cent tot die van eene en meer handpalmen bereiken.

Beloop.

De sproeten verloopenen zonder ontsteking en koorts. Geene algemeene ziekteverschijnselen gaan er mede gepaard; zelden grijpt er met weinig jeukte eene geringe huidaffchilfering plaats. Op die deelen, welke aan den invloed der zonnestralen bloot staan; in het aangezicht, aan den hals, op de borst en de handen komen dezelve het menigvuldigst voor, en

en dragen dan den naam van zomer- of zonne-sproeten (*Ephelis solaris*). Op bedekte deelen voorkomende, en minder afhankelijk van den invloed der zonnestralen op de huid, noemt men ze linzenvlekken (*Lentigo*). In beide deze gedaanten zijn de vlekken klein, niet boven de huid verheven, geel of bruin van kleur. De grootere vlekken, door ineenvloeiing van vele kleine ontstaan, hebben eene onregelmatige, hoekige gedaante, door huidstrepen, die hare natuurlijke kleur behouden hebben, onvolkomen en onregelmatig verdeeld.

Vrouwen en jonge lieden met eene fijne, teedere huid, rood of blond haar en blazuwe oogen, blootgesteld aan den invloed des weders en de brandende stralen der zon, worden het menigvuldigst er door aangetast; echter komen zij ook bij lieden met een vast donkerkleurig huidweeffel, zwarte of bruine haren en oogen gansch niet zelden voor. Bij roodharigen en blonden hebben de sproeten eene goudgele, bij donkerkleurigen eene bruingele kleur. Zij zijn even als de kleur der haren erfelijk, aan geheele familiën van de vroegste jeugd tot den hoogsten ouderdom eigen, terwijl zij in andere familiën zelden of nimmer voorkomen. Gewoonlijk verminderen of verdwijnen de sproeten in den herfst en winter, maar keeren in de lente en den zomer terug. Lieden, met een groot getal sproeten bedekt, zweeten ligt en veel, maar de vlekken zelven blijven droog en wafemen niet uit. De sproeten zijn een ligt, weinig be-

dend, de schoonheid benadeelend gebrek, maar geene wezenlijke ziekte der huid. Hare ontwikkeling wordt bijzonder begunstigd door de opvoeding, die de kinderen te veel aan de inwerking der vrije lucht ontwent, en daardoor het weeffel der huid te week en te teeder latende, de gevoeligheid en aandoenlijkheid verhoogt. De inwerking der zonnestralen in het voorjaar en in den zomer op de bloote en naakte huid van zoodanige lieden, hebben bijna onmisbaar het ontstaan der sproeten ten gevolge. Of zulks, gelijk VON HUMBOLD wil, door de ontleding van het water door de zonnestralen geschiedt, of, volgens P. FRANK veroorzaakt wordt, doordien een kleine droppel water of zweet de zonnestralen gelijk een brandglas verzamelt en eene geringe verbranding bewerkt; of wel, dat eene kleine hoeveelheid wei, onder de opperhuid uitgestort, verdroogt en eene vlek terug laat, is onbeslist. Volgens C. HOME verwekt de zonnehitte eene ligte ontsteking der opperhuid, die telkens hernieuwd wordt, gepaard met eene ruime afscheiding der kleurstof, naar DAVY overeenkomende met die van het adervlies des oogbals.

Nog bestaat er eene soort van vlekken, die gewoonlijk tot de sproeten gebragt worden. Zij zijn groot, geelbruin en gevlamd, aanwezig op de scheenen, aan de kuiten en op de binnenzijde der dijen, veroorzaakt door de hitte van vuur. Men vindt ze gewoonlijk bij de vrouwen uit den geringen volksstand, ten gevolge van het gebruik
van

van zeer heete stoven, en bij oude mannen, die digt bij opene vuren warmte zoeken. Uit hoofde der oorzaken, worden zij vuursproeten (*Ephelis Ignalis*) genoemd. Eenmaal aanwezig, blijven zij gewoonlijk levenslang bestaan. Met de vlekken, welke na spaansche-vliegpleisters terug blijven, hebben zij de meeste overeenkomst.

Groote sproetaardige huidverkleuringen aan den hals, op den rug, den buik en andere bedekte deelen voorkomende, weinig jeuken, en ten gevolge van het wrijven en krabben meelachtig afschilferen, worden levervlekken (*Ephelis hepatica*) genoemd. Zij dragen den naam van blijvende (*Ephelis hepatica persistens*), wanneer zij door lengte van tijd geene verandering ondergaan; dien van vliegende (*Ephelis hepatica fugitiva*) wanneer zij van plaats veranderen of van tijd tot tijd verdwijnen. Zij komen het meest voor bij menschen, welke bij eene zittende leefwijze hunne geestvermogens sterk inspannen. De vlekken hebben eene onregelmatige gedaante, en verliezen zich aan de randen als eene schaduw in de huid (*Ephelis hepatica umbrosa*). Menigwerf zijn de vliegende levervlekken een teeken van zwangerheid, en wijzen zoo men wil eene vrouwelijke vrucht aan (*Ephelis s. Cloasma gravidarum*). Somwijlen staan zij ook met de maandstonden in verband (*Ephelis s. Cloasma amenorrhoeicum*). Bij mannen, die aan aanbeijen lijden, en bij welke zij veelmalen voorkomen (*Ephelis s. Cloasma haemorrhoidum*).

RAYER zegt: „de sproeten zijn voor geene ge- Genceswijze

neeskundige handelwijze vatbaar,” en haalt daarbij het gezegde van CELSUS aan: „*Pene ineptiae sunt, curare varos et lenticulas et ephelides.*” De ervaring staaft deze stelling in zoo verre, dat in vele gevallen de genezing vruchteloos beproefd wordt, en in vele andere het gebrek te gering is, om de genezing te beproeven; doch zij leert tevens, dat de ontwikkeling der sproeten door doelmatig gekozene behoedmiddelen kan verhinderd, aanwezig zijnde, door gepaste geneesmiddelen somwijlen kunnen verdreven worden.

Lieden, vooral vrouwen uit de hoogere standen, welke er belang in stellen van sproeten verschoond te blijven, is het geraten, het aangezicht en den hals met eenen witten sluier te bedekken en handschoenen te dragen; zonneschijn en eene scherpe drooge lucht te mijden; zich na het waschen goed af te droogen, en zich alvorens noch aan de lucht noch aan de zon bloot te stellen. Buiten dien bestrijke men de genoemde deelen met slijm van kweepitten, gom of met wit van eijeren, om dezelve als het ware met een vernis te bedekken.

De reeds aanwezige sproeten vorderen in de eerste plaats, de noodige reinheid der huid door waschingen en baden te onderhouden. Gelijktijdig tracht men de uitwaseming op de vlekken te herstellen, hetwelk reeds door de warme baden geschiedt, en ondersteund wordt door stovingen met zoete wei, zoete melk, vlierwater met eene kleine hoeveelheid vlug loogzout of *spiritus mindereri*. Hiermede het doel niet bereikende, be-
zi-

zige men het volgende veelvuldig aanbevolen middel :

R. *Amygdal. amarum.* unc. ix.
Semin. Pinarum. unc. iii.
Terentur in pollinem subtiliorem
cui adde,
Vitell. ovorum. n^o. sex.
 m. s.

De huiddeelen, welke met sproeten bezet zijn, worden er dagelijks mede tweemaal ingewreven, om ze daarna met zachte doeken weder af te wrijven. Wasfchingen met water en wijnazijn, den *spiritus mindereri* met water verdund, azijn op mierikswortel getrokken, of met *kamfer* bedeed, eene oplossing van *borax*, van sublimaat een grein op eene once gedistilleerd water, de natuurlijke en de kunstmatig bereide zwavelwateren, alsmede het waschwater van HUFELAND, vindt men beurtelings aangeraden. Het laatste heeft deze samenstelling :

R. *Furfur. amygd.* dr. i
aq. rosar.
 — *flor. naphae* à unc viii
terent. ut fiat emuls. adde
Tinct. Benzoes dr. ii
boracis dr. i
 m. d. s.

Met niets van dit alles slagende, kunnen de vlekken door vernietiging der opperhuid, met de daaronder liggende kleurstof, met bijtmiddelen worden

weggenomen. De minerale zuren, en van deze het zeezoutzuur voldoen het best, maar er blijven oppervlakkige witte likteekens terug, voor de lijders welligt onaangener dan de sproeten.

Algemeene ziekte-verschijnselen, ongeregeldheden in den stondenvloed, en gebreken der speenaderen, vorderen de middelen, welke derzelver geaardheden aanwijzen; — de laatste bij voorkeur de zwavelbereidingen.

b.

Naevus maternus. Macula materna.

Moedervlekken.

Bepaling. Aangeborene gebreken der huid met kleurverandering, zonder ontsteking en zonder ontaarding, afhankelijk van wijzingen in het natuurlijk weeffel der huid.

Verdeeling. Wanneer deze aangeborene vlekken niet boven de huid verheven zijn, en veroorzaakt worden door verandering der kleurstof onder de opperhuid, dan dragen zij den naam van gekleurde moedervlekken (*naevus pigmenti* of *spilus*); zijn zij daarentegen boven de huid verheven, verbonden met veranderingen van het weeffel der huid, en het daaronder liggende celweeffel, of wel met verwijde en talrijke takverdeeling der bloedvaten, dan worden zij vaatachtige moedervlekken (*naevus vascularis*) genoemd.

1°. *Naevus pigmenti* of *spilus* komen op alle deelen des ligchaams voor; menigvuldiger echter
in

in het aangezicht, aan den hals en op de borst, dan op andere deelen. De kleur dezer moedervlekken verschilt van ligtrood tot blaauw, bruin en zwart. Zij zijn klein, niet grooter dan een speldekknop, of grooter, somwijlen zoo groot, dat zij de geheele oppervlakte van eenig ligchaamsdeel geheel bedekken. Hare oppervlakte is glad, onbehaard, met wol of met stevige borstels bezet. De veelvuldige verscheidenheden, welke hare gedaanten opleveren, en wezenlijke of gezochte gelijkenissen met deze of gene voorwerpen der natuur, hebben tot velerlei benamingen aanleiding gegeven. Men noemt ze wijn- en vuurvlekken, wanneer de lijdende deelen er uitzien, alsof zij met wijn overgoten waren, naar de randen toe pleksgewijs verbleeken en zich gevlamd vertoonen (*naevus flammans*). Spinnen, wanneer uit het middelpunt straalsgewijze lijnen naar den omtrek loopen (*naevus araneus*). Bladvormig, wanneer de scherp begrensde vlekken, gelijk boombladeren, in de lengte en breedte met lijnen doortrokken zijn (*naevus foliaceus*). Kersen, aalbeziën en druiven, wanneer zij, met eene gladde oppervlakte, de kleur en gedaante der genoemde vruchten nabootsen. Muizen en ratten, wanneer hare oppervlakte met vaal, ros of bruin haar begroeid is. Gewoonlijk blijven de *naevi pigmentarii*, klein zijnde, levenslang onveranderd, of worden alleen in zoo verre grooter, als de deelen, welke zij innemen, door den natuurlijken groei in omvang toenemen. Het voorjaar en de zomer oefenen meerendeels eenigen invloed op de-

zelve uit, en wel in dier voege, dat zij, even als na opwekkende hartstogten, het gebruik van wijn, van geestrijke vochten, en na het gebruik van sterk gekruide spijzen, eene hooger roode kleur aannemen.

De oorzaken der *naevi pigmentarii* zijn nog niet opgespoord, en gelijk die van andere aangeborene wanstaltigheden waarschijnlijk gegrond in omstandigheden, welke wijzigend op de vormdrift inwerken. Betrekkelijk de oorzaak, door het algemeen aangenomen, herhale ik met BATEMAN: „Het zoude eene beleediging voor den Lezer zijn, indien ook één woord gebezigd wierd, ter wederlegging van de volksmeening, dat de moedervlekken door gemoedsaandoeningen der zwangeren vrouwen ontstaan; eene meening toch, die met de aangenomene grondbeginselen der physiologie, met de bewijsbare hoedanigheden van het verband tusfchen vrucht en moeder, en met juiste beoordeeling der waarnemingen onbestaanbaar is.

Behandeling. De moedervlekken zijn voor geene inwendige geneeskundige behandeling vatbaar. Alleen door uitwendige middelen kunnen dezelve opgeruimd worden. Men kan ze uitsnijden op al die plaatsen, waar men geene likteekens behoeft te fchroomen, en deze geene grootere wanstaltigheden nalaten, dan de vlekken zelve zijn; — of door bijtmiddelen wegnemen, waar zij niet diep in het weeffel der huid en het daaronder liggend celweeffel doordringen; want waar dit plaats vindt, blijven diepe en witte likteekens terug. Kort na de geboorte,
be-

bedien ik mij met het beste gevolg van het zeezoutzuur. De vlekken worden dagelijks of om den anderen dag daarmede ingewreven, tot dat er vervelling en afschilfering volgt. De nablijvende likteekens zijn oppervlakkig en vergroeijen met de jaren, zoodat witte, naauwelijks zichtbare, geen' misstand veroorzakende vlekken terug blijven.

2°. *Naevi vasculares*, de vaatachtige of verhevene moedervlekken. Deze meer of min boven de huid verhevene aangeborene gebreken hebben in de meeste gevallen eene hoogroode kleur, en ontleenen haar bestaan uit afwijkingen van het natuurlijke weeffel der huid en der vaten, zoowel van de slag- als bloedaderen. Door de korrelachtige, of gladde verhevene oppervlakte gelijken dezelve naar kerfen (*naevus cerasus*); naar moerbeziën (*naevus morus*); naar frambozen (*naevus rubus fragarius*), enz. Niet verheven zijnde, maar als een zegel in de huid ingedrukt, noemt men ze *sigillum*. *Moles* worden ze genoemd, wanneer zij eene bruine kleur hebben, en met eene breede grondvlakte met de huid vereenigd zijn; gesteelde, wanneer de grondvlakte kleiner is dan het breedere hangende gebrek (*naevus dependens*, s. *tuberculofus*). Het weeffel van dezelve is vast vleeschachtig of los, en van binnen met holligheden en talrijke vaatverbindingen voorzien (*naevus cavernosus*), voor opzwellling en uitzetting vatbaar, vooral bij gehoedsaandoeningen en prikkels, welke het geheele vaatstelsel tot verhoogde reäctie opwekken (*Tumorec*

rec

res erectiles, aneurisma per anastomosis, Telangiectasis, Tumeurs érectiles).

De vaatachtige en verhevene moedervlekken kunnen op alle deelen van het ligchaam voorkomen; waarſchijnlijk blijven ook de inwendige deelen er niet van verſchoond. Eene uitgebreide, aan opzwellling onderhevige moerbeziënvlek zag ik eenmaal over het geheele zachte verhemelte en den wortel der tong uitgebreid, met verſtikking dreigend. Ook op de tong en in het oog heb ik ze meermalen gezien.

Bij de geboorte zijn deze gebreken of enkel aanwezig, of men vindt ze op onderscheidene deelen des ligchaams verdeeld. Ten aanzien van het weeffel en beloop der gelijktijdig aanwezige moedervlekken, bestaan geene verſcheidenheden; maar betrekkelijk hunne grootte en gedaante vinden vele afwijkingen plaats.

Bij de geboorte zijn dezelve ſomwijlen niet grooter dan een ſpeldeknop; maar ſpoedig nemen zij in omvang toe, en bereiken, nu eens ſpoediger, dan langzamer, eene met laſtige bezwaarniſſen gepaarde uitbreiding. Meermalen blijven dezelve levenslang onveranderd, ook gebeurt het, dat zij eerst in eenen vergevorderden ouderdom grooter worden, hetzij door onbekende oorzaken, hetzij door uitwendige beleedigingen, in welk laaſte geval gewoonlijk een ongunſtige uitgang volgt.

Wanneer het weeffel dezer gebreken, door de grootte en talrijkheid der vaten, tot zwellling en

opzetting zeer genegen is, een korrelachtig aanzien eene hoogroode kleur heeft en door eene dunne huid bedekt is, dan kunnen geringe uitwendige oorzaken, belangrijke bloedstortingen verwekken. Vooral zijn deze te vreezen bij kleine, bloedroode, wrataardige, boven de huid verhevene, aangeborene gezwellletjes, die doorgaans weinig geteld worden, en welke mingeoefenden vaak door afbinden trachten op te ruimen, om te laat hunne onbezonnenheid te beklagen. De verhevene bruinkleurige moedervlekken (*moles*) hebben een vast vleeschachtig weeffel, en kunnen met de wennen en beursgezwellen verwisfeld worden. Somwijlen gaan de moedervlekken tot ontsteking en verettering over, en worden er door vernietigd; maar dikwijls geeft de verettering tot langdurige zweren aanleiding, die tot in het celweeffel doordringen en ontfierende likteekens terug laten.

De moedervlekken oefenen geenen de gezondheid storenden invloed op de bewerktuiging uit. Zij zijn van alle andere huidgebreken gemakkelijk te onderscheiden, doordien zij reeds bij de geboorte aanwezig zijn, dikwijls genoeg voorkomen en algemeen bekend zijn. Met gevaar gaan dezelve dan alleen gepaard, wanneer zij zeer groot zijn en ligt bloeden, of op deelen voorkomen, welker belangrijke verrigtingen er door belemmerd worden.

Men kan dezelve afbinden, wanneer zij eene Geneeswijze. smalle grondvlakte, eenen hals of steel hebben; met het mes wegnemen, wanneer men geene likteekens behoeft te vermijden; of door bijtmiddelen ver-

vernietigen. De laatste aangewezen zijnde, heb ik mij steeds met het beste gevolg van het zeezoutzuur bediend. Ook andere bijtmiddelen kunnen met vrucht worden aangewend, als het bijtmiddel van RUST uit zwavelzuur met saffraan, de spiesglasboter, het bijtende kwik, de ongebluschte kalk met groene zeep en andere, naar verkiezing des handelenden geneesheers.

De ligt bloedende moedervlekken kunnen door het mes, door het gloeiende ijzer en door onderbinding der voornaamste slagadertakken, waaruit zij hare twijgen ontvangen, weggenomen worden.

Bij *naevi*, die niet groot zijn, die met geene bloedvloeijingen dreigen, die zich in de nabijheid van deelen bevinden, welker verrigtingen, door ze weg te nemen, zouden lijden; die zich op deelen bevinden, op welke de nablijvende likteekens onaangenamer dan het gebrek zouden zijn; handelt men het doelmatigst, door dezelve onaangeroerd te laten, en alle kunsthulp af te raden.

B.

Achroa. Huidontkleuring.

1. *Albinismus*, *Leucopathia*. Witte huid.

Bepaling. Eene aangeborene of later ontstane ontkleuring der huid en haren door gebrek aan kleurstof.

Gevaarheid, De huid over de geheele oppervlakte des lichaams heeft reeds bij de geboorte eene melkwitte, beloop, enz. bij de Negers lichtgrijze kleur, of bekomt dezelve eerst in de volgende tijdperken des levens. De haren, niet alleen des hoofds, maar ook die van alle

alle andere deelen des ligchaams zijn wit, en hebben het voorkomen van gebleekt vlas of zijde; zijn glad, gelokt of gekruld gelijk bij den Neger; de regenboog heeft eene lichtblaauwe of rozenroode kleur, de oogappel eene hoogroode, door gebrek aan kleurstof van het druiven- en adervlies des oogbals.

Het ligchaamsgeftel der Albinoos is zwak, teeder, tegen geene duurzame krachtfpanning bestand. Hunne gestalte is middelmatig, en hunne verftandelijke vermogens zijn beperkt; men wil echter, dat ten deze uitzonderingen bestaan. Zij kunnen het daglicht niet verdragen (*Nyctalopia*). Zonneftralen, die onverwacht hunne oogen treffen, verwekken onaangename gewaarwordingen. Op plaatfen, waar het licht getemperd is, bij eene betrokkene lucht en in de avondfchemering, zien zij even goed als andere lieden, en kunnen de voorwerpen duidelyk onderfcheiden. Zij knipoo-gen aanhoudend, hunne oogen tranen, en de oogappel is in eene bevende beweging.

Men vindt Albinoos in alle gewesten der aarde; niet alleen bij Negers en kleurlingen, onder welke zij meer in het oog vallen, maar ook bij de blankfte volkeren van *Europa*. Onder de Denen en Zweden worden er gevonden, minder talryk echter dan onder de Afrikaanfche volksftammen.

Behalve dat er Albinoos geboren worden, weten wij niets van de oorzaken dezer verbastering van het menfchelyk geflacht. Of de achterwege blijvende affcheiding der kleurstof van de huid aan

algemeene of plaatselijke zwakte en werkeloosheid der afscheidende vaten moet worden toegeschreven, kan eene gegronde stelling zijn; bewijsbaar is dezelve echter niet. De vereeniging van personen, die eene gezonde kleur hebben, met Albinoos brengt zoowel gezond gekleurde als Albinoos voort.

Genezing. De geboren Albinoos kunnen geene voorwerpen van de geneeskundige behandeling zijn, want zij zijn ongeneesbaar. Bij de ontkleuring na de geboorte ontstaan, handele men naar de voorschriften der algemeene ziektekunde, verwijdere bekende oorzaken, herstelle de gestoorde verrigtingen en ondersteune en regele de ontoereikende of afwijkend werkende krachten der natuur.

2. *Vitiligo*. Gevlekte huid.

Bepaling. Eene pleksgewijze of gedeeltelijke ontkleuring der huid, terwijl de overige deelen de hun natuurlijk eigene kleur behouden.

Beloop, geaardheid, enz. De *Vitiligo*-vlekken hebben, even als de huid van den Albino, eene melkwitte of vuilwitte kleur. De haren op de vlekken worden wit en zacht als zijde; de lijders hebben het aanzien van bont- of veelverwig gevlekte dieren.

De *Vitiligo* is gewoonlijk eene ziekte der Negers en kleurlingen, slechts zelden komt zij bij blanken voor. In de middeleeuwen werden de *Vitiligo*-vlekken als voortekenen der melaatschheid, en, waar slechts enkele aanwezig waren, voor het zegel des duiveis gehouden, waarmede hij de licha-

chamen der met hem in verbond getredene zielen teekende.

Op den buik bij vrouwen, die gekraamd hebben, en bij mannen aan den balzak, vindt men langwerpige gestreepte witte vlekken, door vernietiging der kleurstof ontstaan, en derhalve tot de *vitiligo* behoorende.

De witgeveekte huid kan aangeboren of later ontstaan zijn. Omtrent de oorzaken, welke tot de gedeeltelijke afwezigheid, of tot de vernietiging der kleurstof van de huid aanleiding geven, bevinden wij ons op hetzelfde standpunt als bij het *albinismus*.

De *vitiligo* oefent geenen nadeeligen invloed op de gezondheid der daaraan lijdenden uit. Pogingen tot genezing zijn vruchteloos en behooren achterwege te blijven, met uitzondering van na de geboorte ontstane gevallen. Bij deze kan de raad van RAYER gevolgd worden, namelijk: om door spaansche-vliegpleisters de vlekken te vernietigen, en vlugge prikkelende smeersels aan te wenden, om de kwijnende verrigtingen der huidvaten op te wekken en in eene andere stemming te brengen.

9e. Orde.

Ziekten der huidaanhangfels. *Epidermoses*,
Trichoses, *Onychoses*.

Tot de aanhangfels der huid behooren: de opperhuid, de haren en de nagels. De oorspronkelijke ziekelijke veranderingen, waaraan dezelve onder-

hevig zijn, behooren tot deze orde. De veranderingen in kleur en gedaante, die de opperhuid, als algemeen bekleedfel van het geheele ligchaam, ten gevolge van in de huid gezetelde ziekten, ondergaat, worden niet onder hare ziekten opgenomen. Er bestaat slechts eene ziekte, gegrond in eene eigene en oorspronkelijke verandering van het weefsel der opperhuid, en die haar, als aanhangfel der huid, uitsluitend toebehoort, namelijk: de stekelvarken-uitslag (*hystricismus*). JONATH. GREEN heeft ten onregte ook de *Ichthyosis* daarbij opgenomen.

a.

Hystricismus, Cerostrosis, Hystrix. Stekelvarken-uitslag. Stekelvarken-menschen. (*The procupine men, les hommes porc-épics*).

Bepaling. Eene tallooze menigte opspringende aanhangfels der opperhuid, van eenige lijnen tot een' halven duim lengte.

Benaming. De ziekte, aan welke de naam van stekelvarken-uitslag gegeven is, vindt men bij de meeste schrijvers als eene wijziging van den hoornachtigen, vischschubachtigen uitslag beschreven, waarvan hij zich echter, zoowel door gedaante als beloop te duidelijk onderscheidt, om daarbij opgenomen te worden.

Aan geene landstreek en aan geene betrekkingen gebonden, komt hij over het geheel zelden voor; doch, zoo het schijnt, meermalen in *Engeland* en *Frankrijk* dan in andere landen. Als erfziekte heeft

heeft zij zich in de Engelsche familie LAMBERT eene zekere vermaardheid in *Europa* verworven; zij zijn ook bij ons te zien geweest, en onder de benaming van stekelvarken-menschen beschreven en algemeen bekend geworden. Bij den eersten der LAMBERTS ontstond deze vreemde huidontaarding zonder bekende oorzaken, en erfde van den vader op den zoon, nu reeds in het vierde lid, terwijl al de dochters bevrijd bleven. Hieruit mag echter niet afgeleid worden, dat het vrouwelijk geslacht altijd en in alle omstandigheden onvatbaar zijn zoude, om deze ziekte te ontwikkelen, aangezien er waarnemingen bestaan, waarin personen van het vrouwelijk geslacht de lijders waren.

Deze slepende, zeldzame, somwijlen erfelijke Toevallen, ontaarding der opperhuid begint gewoonlijk eenige beloop, enz. weken na de geboorte. De huid wordt eerst geel, daarna donker van kleur, vervolgens schilferende, en hierna begint de uitslag met wrataardige drooge verhevenheden, die zich allengskens tot wanstaltige huidaanhangfels verlengen. Het geheele ligchaam, alleen het aangezicht, de handpalmen en voetzolen uitgezonderd, worden er mede overdekt. Men heeft dit ziekelijke voortbrengsel der opperhuid van eene hoornachtige zelfstandigheid met de schors van boomen, met de huid van den olifant, met die van den rhinoceros, met wrataardige tepeltjes, met haren borstels en de stekels van den egel en het stekelvarken vergeleken. Het bestaat niet uit eene zamenhangende massa, maar uit zeer vele tot op de huid doordringende inkervingen, verdeeld

in geheel van elkander afgescheidene stukjes van eenige lijnen diameter, zoodat zij zelfs aan hare grondvlakte niet zamenhangen. Van buiten hebben dezelve eene donkere kleur; van binnen zijn zij wit. Men kan ze uittrekken zonder pijn te veroorzaken, maar er volgt uitzijpeling van een bloedig vocht; ook vallen zij van tijd tot tijd van zelve af. De ontbloote opperhuid is ruw, en wordt spoedig weder door nieuwe aanhangfels bedekt. Bij de bewegingen des ligchaams en wanneer men met de vlakke hand er overheen strijkt, hoort men een eigenaardig geruisch. De huiduitwaseming ondergaat geene verandering en de lijders genieten voortdurend eene goede gezondheid.

Oorzaken. Omtrent de voorgeschiedtheid en de opwekkende oorzaken, laat zich niets met zekerheid zeggen. Dat de ziekte erfelijk kan zijn, bewijst de gescheidenis der familie LAMBERT. Het uitwerksel der naaste oorzaak is eene vermeerderde en veranderde afscheiding der stof, die in den gezonden toestand de opperhuid vormt.

Kenteeke- De kenteekenen der onderhavige ziekte zijn ge-
ken. grond op de eigenaardige gedaante en lengte der
Diagnosis. huid-aanhangfels, welke het wezen van dezen
 uitslag daarstellen, en zoo duidelijk gekenschetst
 zijn, dat verwisselingen met andere ziekten niet wel
 kunnen plaats grijpen.

Voorzegging. Gevaar sluit deze ziekte niet in. Zij stoort noch
Prognosis. de gezondheid, noch verkort het leven. De lijders
 kunnen eenen hoogen ouderdom bereiken; maar de
 kwaal is ongeneeslijk; noch uit- noch inwendige
 mid-

middelen vermogen iets tegen dezelve , zoodat zij geheel en al buiten het gebied der geneeskunst ligt.

b.

Trichoses. Ziekten der haren.

Het viltachtig zamenpakken , het bederf van de wortels , de scheede en de bolletjes der haren bij de onderscheidene soorten van hoofdzeer , *lepra* , enz. , het uitvallen en verkleuren van dezelve , de gevolgen en uitwerkselen van oorspronkelijke ziekten der huid behooren niet tot de eigenlijke ziekten der haren , en kunnen onder de *Trichoses* geene plaats beslaan. Er is slechts eene ziekte , die daartoe behoort , namelijk de Poolfche vlecht.

Plica Polonica , Trichoma , Lues Sarmatica , Coma Caesarea. Poolfche vlecht.

Eene strengsgewijze of viltachtige verwarring Bepaling. en zamenkleving der haren van het hoofd en van alle andere deelen des ligchaams , ontstaan door ziekelijke afscheiding van een kleverig weivocht , zoowel door de haarbolletjes en de huid , als door de haren zelven. Deze ziekte draagt den naam van Poolfche en Weichselvlecht , omdat zij het meest algemeen in *Polen* en wel aan de oevers der *Weichsel* voorkomt.

Men wil , dat de Poolfche vlecht ongeveer in de dertiende eeuw voor het eerst in *Polen* versche-<sup>Geschiede-
nis.</sup> nen is , aangebragt door de Mongolen en Tartaren , die in 1285 dat land overheerden. Volgens CLÉBOWSKI heeft de vlecht ongeveer in 1500 in de

landen, welke aan *Polen* grenzen, iets later als eene van oudsher bekende ziekte in *Duitschland*, en eerst in 1564 in *Polen* geheerscht. Volgens WEESE zoude de vlecht niet voor 1583 in *Podolië* bekend zijn geweest. Over het geheel ligt de oorsprong der ziekte in het duister. Hare meer algemeene verbreiding in de zestiende eeuw schijnt toen eerst de oplettendheid der geneeskundigen getrokken te hebben, en de oorzaak te zijn, dat men haar begin in die eeuw stelt, en hare vroegere geboorte en bestaan buiten het bereik der geschiedkundige nasporingen gebragt heeft.

Algemeene
geaardheid.

De vlecht is eene besmettende ziekte; in *Rusland*, *Tartarije* en *Polen*, voornamelijk aan de oevers der *Weichsel* endemisch; en wel zóó algemeen, dat, volgens CHROMY, in den omtrek van tien vierkante mijlen jaarlijks niet minder dan dertig tot vijftig menschen het leven er door verliezen. Sporadisch vindt men de vlecht in *Hongarijë*, *Croatië*, *Dalmatië*, *Duitschland* en *Frankrijk*. Volgens JON. GREEN is zij in *Engeland* nog nimmer voorgekomen. Het schijnt mij toe, dat van *Noord-Nederland* hetzelfde kan gezegd worden; althans heb ik geene waarnemingen bij Nederlandsche schrijvers gevonden.

Verdeeling.

Naar aanleiding van de verschillende gedaanten, die de verwarde en zamenklevende haren aannemen, en naar de wijze, waarop zich de vlecht ontwikkelt, heeft men aan dezelve verschillende benamingen gegeven. Zijn de haren tot ééne lange streng of eenen staart vereenigd, dan wordt deze *Plica longicorda*,

cir-

cirrhusa, (*Plique à queue ou solidaire* ALIBERTI) genoemd. Zijn de haren tot meer dan ééne streng of eenen staart zamen verbonden, dan draagt zij den naam van *Plica multiformis*, *Plica caput medusae* (*Plique multiforme* ALIBERTI). In beide deze gedaanten komt de vlecht alleen bij mannen op het hoofd, de borst en de teeldeelen voor, en wordt deswegens ook de mannelijke vlecht (*Plica masculina*) genoemd. De verwarring der haren, eene viltachtige massa daarstellende, die het geheele behaarde deel gelijkmatig bedekt, noemt men *Plica villosa*, *mitralis*, *Cespita* (*Plique en masse* ALIBERTI); ook de vrouwelijke vlecht, omdat zij in deze gedaante meer algemeen bij de vrouwen en zelden bij mannen voorkomt.

Ook onderscheidt men de oorspronkelijke vlecht (*Plica primaria*) van de toevallige of afgeleide (*Plica secundaria*, *symptomatica*). Men houdt de vlecht voor oorspronkelijk, wanneer zonder voorafgaande voorboden de ontwikkeling der vlecht binnen een kort tijdsbestek plaats vindt, door besmetting ontstaat, geene algemeene toevallen verwekt, na een regelmatig beloop los wordt en afvalt, en alleen door bijkomende schadelijkheden en verwaarloozing in den *secundairen* overgaat. De vlecht gaat aan de dyscrasie vooraf, en deze ontwikkelt zich eerst, wanneer gene door langdurigheid en belemmeringen in haar beloop verhinderd wordt. Bij de *secundaire* vlecht vindt het tegendeel plaats; de dyscrasie gaat aan de vlecht vooraf, en de toevallen, welke het algemeen lijden der bewerktui-

ging kenschetsen, zijn maanden en jaren lang voor de ontwikkeling der vlecht aanwezig.

Voorboden,
Gevaarheid
en Beloop.

De eerst voorkomende verschijnselen, die als voortekenen te beschouwen zijn, bestaan in lusteloosheid, loomheid, pijn in het hoofd en de ledematen, verhoogde gevoeligheid der algemeene bekleedfelen van het hoofd of van andere behaarde deelen; aandoeningen der oogen en der ooren, krampachtige aangezigtspijn, en pijn onder de nagels der handen en voeten. De verrigtingen der buksingewanden zijn op verschillende wijzen gestoord; de eetlust ontbreekt en de spijsvertering is bedorven. De aanbeijen en de stondenvloed zijn onregelmatig; gewone voedfels en aangename reukwerken walgen en mishagen, terwijl onwecrstaanbare lusten naar oneetbare zelfstandigheden en geestrijke dranken aanwezig zijn. Zenuwtoevallen, aan hypochondristen en hysterische vrouwen eigen, kramptrekkingen, watervrees, begoochelingen en misleidingen der uitwendige zinnen, gevolgd door blindheid, doofheid, vallende ziekte, beroerte en krankzinnigheid treden te voorschijn. De huiduitwaseming gaat in een kleverig zweet over; de urin-affcheiding wijkt in hoeveelheid en hoedanigheid van den gezondheidstoestand af. De adem heeft eenen onaangenaamen reuk, en vrouwen worden door den witten vloed aangetast. Gedurende de voortgaande ontwikkeling der genoemde toevallen, krijgen de lijders een cachectisch aanzien; de klieren zwellen, de onderste ledematen zijn met spataderen bezet; puisten, zweren en uitwasfen

ko-

komen op de huid te voorschijn. De voorste leden der vingers verliezen hunne natuurlijke gedaante en worden dik en breed. De beenderen worden bros en door bederf aangetast. Somwijlen komen ook ontstekingsaardige huidziekten en ontstekingen der ingewanden onder de voorboden voor, en meerendeels koortsen, zoowel tuschenpoozende als aanhoudende, van een bepaald karakter en verschillend gewijzigd, verbonden met een stinkend kleverig zweet, hevige hoofdpijnen, slaperigheid en slaapzucht. Deze belangrijke ziekteverschijnselen gaan van maanden tot jaren aan de vlecht vooraf; zeldzaam zijn dezelve geheel en al afwezig, maar veelvuldig gewijzigd door de verschillende invloeden, waaraan de lijders blootstaan, en de betrekkingen, waarin zij leven.

Met een gevoel van jeukte en kriebeling in de huid, zwellen de haarbolletjes en scheiden een kleverig vocht af, dat later ook uit de haren zweet, en deze eerst aan de wortels en allengskens in hunne geheele lengte zamenkleeft. De afscheiding der kleverige wei duurt voort, en de ziekelijk gestelde haren blijven groeijen, ook dan wanneer de vlecht volkomen gevormd is. Maanden en jaren kan dit voortduren, en de vlecht bereikt vaak eene buitengewone lengte.

De ontwikkelde vlecht is, wanneer zij niet door besmetting ontstond, de crisis der eigene dyscrasie. Deze crisis is volkomen, wanneer de natuur de noodige krachten heeft, door eene ruime afscheiding van de kleverige wei, de vlecht spoedig te

ontwikkelen, mits hare pogingen door geene ondoelmatige verpleging, noch door het affnijden of kammen der haren wordt belemmerd, en de algemeene ziekteverschijnselen allengskens afnemen en geheel verdwijnen. Ontbreken aan de natuur de noodige krachten, of worden hare pogingen belemmerd, dan blijft de crisis onvolkomen, de toevallen verzwaren, verzwerigen en smeltende ontlastingen putten de krachten uit, waterzucht en tering volgen, — heftische koortsen eindigen het lijden en leven der lijdens.

De gevoeligheid der huid van het deel, waarop de vlecht aanwezig is, neemt bij eenen gunstigen keer der ziekte af, en onder de vlecht groeijen gezonde haren, waardoor zij los en van de huid verwijderd wordt en afvalt. Valt de los en droog geworden vlecht niet van zelve af, en veroorzaakt zij, door hare zwaarte, pijn en andere ongemakken, dan kan dezelve door eene schar worden weggenomen. Staan de lijdens na de genezing op nieuw aan de opwekkende schadelijkheden bloot, dan grijpen er instortingen plaats, die binnen kortere of langere tusschenruimte meermalen kunnen plaats vinden. Ook gebeurt het, dat terstond, nadat de vlecht door de natuur of de kunst is opgeruimd, de toevallen terug keeren en door eene nieuwe spoedig gevormde vlecht (*Plica chronica*) bedaren. Blijft de vlecht achterwege (*Plica larvata*), dan duren de toevallen voort, tot dat de natuur of de kunst slaagt, dezelve tot ontwikkeling te brengen.

Menigmaal is de dyscrasie der vlecht met die der syphilis, der scrophulosis, der jicht, der scheurbuik, de smetstof der schurft en van andere huidziekten verbonden, waaruit belangrijke wijzigingen voor de Geneeskundige behandeling voortkomen.

De kleverige stof, die de haren verbindt, schijnt van eene weiaardige, slijmachtige gesteldheid te zijn. Wordt de vlecht voor het droog worden en afgroeijen door- of afgesneden, dan ontlast zich eene groote hoeveelheid van die stof. Somwijlen is zij gekleurd, en dit heeft aanleiding gegeven, haar voor bloed aan te zien.

De zelfstandigheid der haren tot ééne vlecht vereenigd schijnt, geene verandering te ondergaan, althans door ze met water te koken en daardoor van aanhangende verdroogde vochten te zuiveren, verkrijgen dezelve hunne gewone gedaante. Scheikundige ontledingen hebben naauwelijks merkbare verscheidenheden, vergeleken met die van gezonde haren, opgeleverd.

Van het tijdstip af aan, dat het weeffel onder en in den omtrek der nagels van de vingeren en teenen pijnlijk wordt, worden dezelve door een kleverig vocht overtrokken, veranderen van kleur en gedaante door ophooping van hoornachtige plaatjes, gevormd uit de stof, waaruit de nagels gevormd worden, ziekelijk en in groote hoeveelheid afscheiden.

In de lijken der aan de vlecht overledenen vindt men de haarbolletjes vergroot, met een dun vocht ge-

gevuld. Volgens J. FRANK is de lever ziekelijk vergroot, verweekt en met knobbels bezet.

Oorzaken.

Voorge-
schiktheid.

Causa prae-
disponens.

De Sarmatfche volksftam fchijnt met eenen meer ontwikkelden aanleg voor de vlecht begaafd te zijn, dan andere volksftammen. De fcrrophulofis, de fymphilis, de fcabies, de fcheurbuik, enz. begunftigen die ontwikkeling. De aanleg komt ook door overerving aangeboren voor, en het is niet zelden, in familiën, waarin zulks plaats heeft, kinderen met de vlecht ter wereld te zien komen. Ook het mannelijke geflacht en zwartharige lieden zijn meer dan de vrouwen en de blonden voorgefchikt.

Opwekkende

oorzaken.

Causa occa-

sionalis.

Het ruwe, koude klimaat, de leefwijze, de voeding, kleeding en woning, de koude vochtigheid des dampkrings door uitgebreide bosfchen en moerassen veroorzaakt, de verregaande onreinheid, het misbruik van fterken drank en andere landeigene fchadelijkheden, waaraan de van vrijheid droomende Poolfche flaaft onderworpen is, omvatten toereikende oorzaken, om de dyscrasie van de vlecht oorfpronkelijk te ontwikkelen. De arme, in ellende levende Poolfche landlieden, de Joden en de bedelaars worden het menigvuldigft door de vlecht aangetast, aanduidende, dat de genoemde fchadelijkheden den hun toegekenden invloed wezenlijk uitoefenen. Meer ftellig wordt zulks bewezen door de ervaring; want daar, waar die fchadelijke invloeden verminderen en de menfchen onder meer gunstige omftandigheden leven dan voorheen, gelijk met Oostenrijksch Polen plaats heeft, neemt de vlecht af; terwijl zij daar, waar de

de voornoemde schadelijkheden eene grootere uitgebreidheid en sterkte erlangd hebben, naar evenredigheid toeneemt. In de grootst mogelijke uitgebreidheid oefent zij zelfs op de dieren haren verderfelijken invloed uit, de langharigen, de paarden, het hoornvee, de schapen, honden, vossen en wolven worden door vlechtaardige verwarringen der haren aangedaan. Door besmetting ontstaat de vlecht zonder onderscheid van jaren, stand en geslacht, bij de inboorlingen en bij de vreemdelingen. Gemoedsaandoeningen, koortsen en koortse huidaandoeningen begunstigen de besmetting. De ziekelijk afgescheidene, kleverige wei, het product der ziekte, is het voermiddel der smetstof, die tot de vaste (*contagia fixa*) behoort, en zoowel door inenting als onmiddellijke aanraking van kleedingstukken, beddegoed, huisraad, kammen en borstels, alvorens bij vlechtlidder in gebruik, medege-deeld wordt.

Eene eigene dyscrasie, hetzij door algemeen werkende schadelijkheden, hetzij door eene smetstof ontstaan, gevolgd door de critische reäctie met ziekelijke afscheiding op die gedeelten der huid, welke met haren begroeid zijn, is de naaste oorzaak der vlecht, en maakt deze steeds — het tijdperk der onmiddellijke besmetting welligt alleen uitgezonderd — tot eene algemeene ziekte, die nimmer als geheel en alleen plaatselijk mag beschouwd worden.

Naaste oorzaak. Causa proxima.

Of de dyscrasie der vlecht eenzelvig met andere dyscrasiën of daarmede verwant is, blijft twijfelachtig, theoretisch verklaarbaar, doch practisch niet te bewijzen.

De

Onderschei-
dingsteeken-
en. Dia-
gnosis.

De vlecht kan alleen met de zoogenaamde valsche vlecht (*Plica spuria*) verwisfeld worden. Zij onderscheidt zich van deze kennelijk. De valsche vlecht ontstaat zonder voorboden; er zijn geene teekenen der eigene dyscrasie aanwezig; hoofdzeer of andere uitflag is voorafgegaan; de verwarde haren missen de eigene kenteekenen der ware vlecht; onreinheid en verwaarloozing der haren baanden den weg; luizen zijn met een talloos heer aanwezig, terwijl zij bij de ware vlecht zelden, en dan nog slechts enkel gezien worden.

Voorzegging.
Prognosis.

De vlecht is door geene bekende middelen in alle voorkomende gevallen geneesbaar, zoodat de kunst met uitzondering van de gevallen, door besmetting ontstaan, een zeer gering vermogen tegen deze ziekte bezit. De voorzegging is uit dien hoofde reeds ongunstig, maar wordt het nog te meer, doordien het doorgaans buiten het bereik der kunst gesteld is, de voortbrengende schadelijkheden uit den weg te ruimen, of de lijders aan derzelver invloed te onttrekken. Langdurige voorboden, gepaard met aandoeningen van het zenuwstelsel en der zinwerktuigen, voorspellen steeds een ongunstig einde. Eene spoedige en volkomene ontwikkeling der vlecht en van de aandoeningen der nagels, gepaard met ruime ontlasting van troebele *urin*, aanhoudend ruim zweet, vloeiende aanbeijen en van tijd tot tijd wederkeerende roos, geven hoop op een gunstig einde.

Geneeskun-
digebehande-
ling.

De geneeswijze der vlecht is weifelend en onzeker; want wat de eene geneeskundige aanprijst, verwerpt de

de andere, alhoewel beide de ziekte in haar vaderland hebben waargenomen en behandeld. In het tijdperk der voorboden, bevordere men de afscheidingen en ontlastingen in het algemeen, naar aanleiding der voorafgegangene schadelijkheden, der bijzondere toevallen en der vergezellende koorts. Voornamelijk echter dient de huiduitwaseming eerst door *spiritus mindereri*, *vinum stibiatum*, het poeder van DOWER, later door *antimonium*, zwavel, kamfer, *guajac* en *sassaaparilla* bevorderd te worden; de *liquor cornu cervi succinatus* en *aether sulphuricus* geve men bij aanwezige zenuwtoevallen, en ruime giften opium bij krampachtige aandoeningen. Na een toereikend gebruik dezer middelen worden de *sulphureta hydrargyri et stibii* aangeraden, maar tevens tegen het gebruik der onvermengde kwikbereidingen gewaarschuwd, want de ondervinding heeft deze als schadelijk leeren kennen. Is het noodig, den aanbeijenvloed te bevorderen, dan zijn de aloës, de rhabarber en de zwavel aangewezen. J. FRANK geeft het *extractum hellebori* of *cicutae* in giften van drie greinen, met zes greinen rhabarber en zwavel. Onder de volks- of huismiddelen hebben het *lycopodium clavatum*, de *vinca per vinca* en het *symphytum officinale* zich eenigen roem verworven.

De aangewezene algemeene behandeling verbindt men met warm-water- en dampbaden, en plaatse eene prikkelende pleister tusfchen de fchouderbladen, zamengesteld uit twee drachma *emplastrum cicutae* en *assae foetidae* met zes drachma *emplastrum*

trum vesicatorii. Het hoofd houde men warm, vermijde togt en iedere gelegenheid tot vatten van koude. De haren en de nagels late men onaange- roerd, om de natuur in de ontwikkeling der vlecht en crisis niet te storen, noch te belemmeren. Lie- ver trachte men dezelve te ondersteunen door sto- vingen van het hoofd met afkookfels van het *lyco- podium clavatum*, de *vinca per vinca* of *uva ursi*. Gaat de ontwikkeling der vlecht eenen regelmatig- gang, en verminderen gelijktijdig de algemeene ziek- teverschijnselen, dan beperke men de uitwendige behandeling tot warmhouden van het hoofd. Con- gestiën en active ontflekingaardige reäctie vorderen salpeter en verkoelende lakseermiddelen; om aflei- ding te maken, voetbaden en mosterdpappen. He- vige plaatselijke pijnen van de behaarde deelen vor- deren verzachtende stovingen en pappen. Zijn de algemeene ziekte-verschijnselen zeer hevig en gevaar dreigend, terwijl der natuur de noodige krachten ontbreken, om de vlecht te ontwikkelen, dan zijn inwendig de kamfer, de vlug-loogzout bevattende middelen, de spiesglasbereidingen en het opium aangewezen. Gelijktijdig bedekke men de lijdende deelen met afkookfel van mosterdzaad of van de *bryonia*, met inwrijvingen van spaansche-vliegen- tinctuur en prikkelende smeersels af te wisselen.

De vlecht volkomen ontwikkeld zijnde, houde men het hoofd voortdurend warm, beveilige het- zelve tegen het vatten van koude, en snijde de vlecht niet af, voordat zij door gezonde haar- groeiing geheel los is, de toevallen, plaatselijke en
al-

algemeene geheel geweken zijn, en de lijdèrs alle-
zins eene goede gezondheid genieten. Bedekken de
verwarde en zamengekleefde haren het lijdende deel
met ééne masfa, dan is het raadzaam, de loswor-
dende gedeelten van tijd tot tijd weg te nemen, en
hetzelve zóó lang warm te houden, tot dat het
toereikend met gezonde haren begroeid is.

Is de natuur, onberadener wijze, door te vroege
opruiming der vlecht in haar beloop gestoord, en
keeren de gewekene toevallen terug, dan trachte
men de behoudende pogingen der natuur door sterk
zweetdrijvende voorschriften van spiesglasbereidin-
gen en kamfer, door het gebruik van warme damp-
baden en prikkelende inwrijvingen en oplegfels op
te wekken en te ondersteunen. Daarmede niet fla-
gerende, moet de inënting beproefd worden. Zwe-
ren en andere uitwendige gebreken, in de gevolgen
der vlecht voorkomende, moeten met pleisters en
zalven, met scheinling bereid, behandeld worden.
Complicatiën met andere dyscrasiën, vorderen die
geneesmiddelen, welke aan hare geaardheden be-
antwoorden. Algemeene zwakte en cachexiën ver-
eischen de vochtverbeterende en versterkende ge-
neeswijze, ondersteund door den daaraan beant-
woordenden leef- en eetregel.

C.

Onychoses, Onychia. Ziekten der nagels.

De veranderingen, welke het weeffel en de ge-
daante der nagels ondergaan, ten gevolge van schei-

kundige inwerkingen bij de uitoefening van onderscheidene beroepen en bedrijven. Derzelver wanstaltigheden, door onderscheidene huidziekten veroorzaakt, en de dikke omgekrulde nagels met verbreeding der voorste vingerleden bij de tering en de ziekten van het hart, behooren niet tot de *onychia*, maar tot de verschijnselen en toevalen der genoemde ziekten.

Bepaling. De *onychia* of ziekte der nagels bestaat in eene idiopathische ontsteking van het vaatweeffel (*matrix*), dat de stof afscheidt, waaruit de nagels gevormd worden. Men onderscheidt de navolgende wijzigingen.

1. De ontsteking der *matrix*, door uitwendige oorzaken ontstaan, is vaak belangrijk genoeg, om hevige pijnen en symptomatische koortsen te verwekken. Deze ontsteking eindigt bijna altijd met verettering, waardoor de nagel los wordt. De etter baant zich tusfchen den nagel en het daaronder liggende vaatweeffel eenen weg naar buiten; de losse nagel valt vervolgens af, om door eenen nieuwen en gezonden vervangen te worden. In deze gedaante wordt de *onychia* ook *panaritium sub ungue*, de nagelvijt, genoemd. De behandeling vordert eerst ontstekingwerende, later verzachtende en vervolgens de verettering bevorderende middelen; na het afvallen van den nagel, droog plukfel en beveiliging van het lijdende deel tegen uitwendige beleedigingen.

2. De *onychia*, veroorzaakt door het groeijen van den nagel in het vleesch (*incarnatio unguis*),
ver.

verwekt mechanische prikkeling, hevige pijnen en meermalen ontsteking der *matrix* en der deelen, welke den nagel omgeven. De groote teen is de gewone zetel van dit gebrek, en veelmalen is hetzelfde een gevolg van naauwe schoenen. In den beginne gemakkelijk te verhelpen en op te ruimen door verzachtende plaatselijke middelen, rust en een geschikt verband om de nabijliggende deelen tegen de drukking des nagels te beschermen. Zijne harde en scherpe randen neme men door mes of schar weg, en schuive een stukje hechtpleister, theelood of eenige draden plukfel tuschen den nagel en de zachte deelen, en houde zoo lang er mede vol, tot dat de opgeligte nagel over het vleesch is heengegroeid. Of men volge de behandeling van DUPUYTREN, hierin bestaande: dat men van eene scherpe en fijn gepunte schar het eene blad in het midden onder den nagel van de punt naar den wortel invoere, en denzelven op die wijze doorsnijde. De eene helft neme men vervolgens met een tangetje weg; de andere blijft terug tot beschutting der lijdende deelen. De mechanische prikkeling aldus uit den weg geruimd zijnde, volgt de genezing spoedig, en is door de vorming van eenen nieuwen nagel voldongen.

3. De ontsteking en verzwering der *matrix* van den nagel met bederf en verlies van denzelven, wordt van de andere nagelgebreken door de benaming van kwaadaardige nagelzweer (*onych'a maligna*) onderscheiden. Zoowel uitwendige oorzaken, mechanische en chemische, als inwendige

kunnen de kwaadaardige nagelzweer voortbrengen. Zij blijft tot éénen teen of éénen vinger bepaald, of tast achtereenvolgend alle aan, vooral wanneer eene fyphilitifche oorzaak of complicatie aanwezig is. Ook de *scrophulosis* kan eenen gewigtigen invloed op het ontstaan en beloop van het onderhavige gebrek uitoefenen. In een der mij voorgekomene gevallen, waar het eenen scrophuleusen lijder betrof, die sedert eenige jaren aan *onychiamaligna* lijdend was, waartegen alle pogingen, tot genezing langen tijd in het werk gesteld, zonder gevolg waren gebleven, genas de kwaal ten laatste als het ware van zelve, maar spoedig daarna volgde hoest met etterachtige en bloedige fluimlozing, en binnen weinige maanden bezweek de lijder aan de tering.

Jonge lieden worden meermalen dan bejaarde, en menigvuldiger aan de teenen dan aan de vingers door de kwaadaardige nagelzweer bezocht. De groote teen en de duim zijn hare gewone, de andere teenen en vingers hare zeldzame zetels.

De *onychiamaligna* begint met pijn onder en rondom den nagel. Na verloop van eenigen tijd beginnen de pijnlijke deelen te zwellen en eene ichoreuse stof af te scheiden, waarna spoedig aan den wortel en de zijdedeelen van den nagel eene kwaadaardige zweer volgt, die eenen stinkenden, kwalijk bereiden etter afscheidt. De zwelling breidt zich over het geheele eerste lid van teen of duim, somwijlen nog verder uit, en bekomt eene roode kleur. De omtrek der lijdende deelen bereikt menig-

nigmaal eenen omvang, die den gezondheidmatigen drie- en meermalen overtreft. De nagel wordt dan wanftaltig, groeit niet meer, krimpt, wordt korter en finaller en er blijft ten laafte niets dan een hoornachtig brokftuk van denzelven overig. De pogingen, die de natuur aanwendt, om eenen nieuwen nagel voort te brengen, mislukken, en vermogen niet meer dan dunne vormlooze hoornachtige plaatjes daar te ftellen, die tot niets nut zijn, maar vaak door prikkeling der zweer nieuwe toevallen verwekken. De weivaten nemen alsdan deel in de ontfteking, en vertoonen zich als roode tot in de liezen of okfelholte voortloopende ftrepen. De zweer en derzelver omtrek ontaarden in eene fponsachtige vleefchgroeiing, waardoor het overgeblevene nagelgedeelte bedekt wordt; de pijnen nemen in hevigheid toe; de geringfte aanra-king der zweer verwekt bloeding, en het wordt voor den lijder ondoenlijk, de lijdende deelen te gebruiken.

De *onychïa maligna* is een hoogst pijnlijk, hardnekkig gebrek, dat jaren lang kan duren. Door inwendige oorzaken ontftaan of onderhouden, geeft zij tot belangrijke ontaarding en beenbederf aanleiding, met verlies der lijdende deelen. De toefland der lijders wordt gevaar dreigend, bijkomende heftifche koortfen brengen zijn leven in gevaar, en kunnen zelfs den dood veroorzaken.

4. De *onychïa* komt fomwijlen nog in eene andere wijziging voor, en tast gewoonlijk de vingeren, hoogst zelden de teenen aan. De ontfte-

king begint aan den wortel der nagels en onder dezelve in de *matrix*, is niet zeer hevig en verwekt schilfering der opperhuid en afbladering des nagels; deze wordt dik en wanftallig, valt af en wordt door eenen anderen vervangen, niet minder gebrekkig dan de vorige; dit vindt meermalen plaats. De eerst oppervlakkige verzwering dringt dieper door, tast het beenvlies aan; de kootjes sterven af, en de voorste leden der vingeren gaan verloren, zonder dat de pijn hevig, noch de verettering belangrijk is. Gewoonlijk worden achtereenvolgend, eerst aan de eene en dan aan de andere hand, alle nagels aangedaan en de vingeren verminkt; de stompen, na het verlies der eerste kootjes, hebben veel tijds noodig om te genezen. Bij gedeeltelijke behouding der kootjes worden dezelve door wanftaltige, klaauwvormig gekromde nagels onvolkomen gedekt.

Geneeswijze. In de eerste plaats zijn de algemeene oorzaken op te ruimen; daarna zijn de kwikbereidingen, die boven alle andere geneesmiddelen de voorkeur verdienen, aangewezen, zonder daarom met RUST, WARDROP en anderen de venerische geaardheid des gebreks in bescherming te nemen, of die met LELUT te weêrspreken. Volgens den raad van RUST geve men de roode kwikpraecipitaat of andere kwikbereidingen volgens WARDROP, zoo lang tot dat er salivatie volgt. De *mercurius dulcis*, zoowel als de sublimaat met *extractum cicutae*, heb ik steeds met een gewenscht gevolg gebruikt, waar de kwikbereidingen waren aangewezen. De uitwen-

wendige behandeling regele men naar de tijdperken des gebreks en den toestand der lijdende deelen. Heeft de ontsteking in het eerste tijdperk eene active geaardheid, dan vordert zij bloedzuigers, verzachtende pappen, omslagen en stovingen, rust van het lijdende deel, vermijdende iedere poging om te gaan of te staan. Bij geringe irritatie en ontsteking, alsmede in het verdere beloop der *onychia*, wanneer de ontsteking geweken en zij slepend geworden is, bezige men inwrijvingen van kwikzalf, zoo ver zich de zwelling uitstrekt, en verbind de zweer met de *aqua phagadaenica nigra*, zijnde eene oplossing van eene halve tot eene heele drachma zoet kwik in kalkwater, verbonden met het inwendige gebruik van calomel met opium en een afkooksel van de saspaparilla, volgens COOPER. Met deze behandeling niet slagende, beproeve men de oplossing van de sublimaat, bestrijkingen der zweer met salpeterzuurzilver, blaauw vitriool of bijtsteen, of wel men bezige strooipoeders uit rood praecipitaat één deel, en twee deelen *pulveris herbae sabinae*, om de verettering te bevorderen, te verbeteren, de voorhanden gedeelten der nagels los te maken, het sponsachtige vleesch weg te nemen en deszelfs aangroei te verhinderen. De slechts gedeeltelijk losgewordene, gedeeltelijk nog vastzittende nagel neemt men met eene tang of pincet weg, en verbindt daarna met verzachtende en bedarende middelen. Alle pogingen, tot genezing aangewend, vruchteloos zijnde, zoo blijft er niets over dan den raad

van COOPER en DUPUYTREN te volgen, namelijk, den nagel met de *matrix* en den geheelen ziekelijken omtrek met het mes weg te nemen.

Huidziekten, welke tot geene der voorgaande orden gebragt en als grondvormen voor nieuwe orden aangenomen kunnen worden.

10de Orde.

Pellagra, Dermatagria, Erysipelas periodicus, Nervosus, Chronicus, Scorbutus alpinus. Lombardysche pokken. Scheurbuik der Alpen.

Bepaling. De *pellagra* openbaart haar bestaan eerst door huidaandoeningen, nadat algemeene ziekteverschijnselen langdurig zijn voorafgegaan. Vroeg in het voorjaar komen kleine roosaardige vlekken op die deelen des ligchaams te voorschijn, welke van kleeding ontbloot blijven. Gedurende den zomer worden deze vlekken grooter; in den herfst en winter verdwijnen dezelve, om telkens in de lente met grooter hevigheid weder te keeren. De vlekken beginnen te schilferen, en ontaarding der huid, met wrongelachtige verdikking, kloven en korstachtige roven grijpen achtereenvolgend plaats. De algemeene ziekteverschijnselen, welke den uitslag voorafgingen, duren voort en verzwaren ieder voorjaar, zonder gedurende den herfst en winter af te laten.

Naam en geschiedenis. De Italianen hebben aan deze ziekte den naam van *pellarsis* gegeven, waarschijnlijk afgeleid van het

het woord *pellarsi*, vervellen. De roosaardige gedaante der vlekken, waarmede de *pellagra* begint, gaven aanleiding haar *roos van Lombardye* te noemen. De later zich ontwikkelende korsten, gaven haar den naam van *melaatschheid van Lombardye*; de verschijnselen der scheurbuik dien van scheurbuik der Alpen; de tijdelijke terugkeer des uitslags, de zenuwtoevallen en het slepende beloop, deden er de woorden *periodicus*, *nervosus* en *chronicus* bijvoegen. ALIBERT bragt haar tot de schubben, met de benaming van *Ichthyose pellagre*.

De *pellagra* behoort tot die ziekten, welke eerst in latere tijden door den zamenloop van ondoorgronde, schadelijke invloeden haar aanzijn verkregen. Niet langer dan eene eeuw geleden, heeft men de *pellagra* voor het eerst waargenomen; de vroegere sporen, die men meende gevonden te hebben, zijn geschiedkundig niet bewijsbaar.

Lombardye is de wieg en bakermat van de *pellagra*; dáár is haar vaderland, dáár vindt men de plaatsen, waar zij ook nu nog, oorspronkelijk ontwikkeld, endemisch heerscht, en van waar zij uitging, om zich over geheel *Opper-Italië* te verbreiden. In het gebergte van middelbare hoogte en langs de oevers der *Ticino*, in de dalen, door gene omgeven en door deze besproeid, worden de landlieden, bewoners van kleine dorpen en gehuchten, het menigvuldigst aangetast; maar de bevolking van het hooge gebergte, van steden en groote dorpen, en van plaatsen, waar de tusschenpoo-

zende koortfen endemisch heerschen , blijven meere deels verschoond. De landeigene gesteldheden , aan welke de *pellagra* haar bestaan is verschuldigd , blijven vaak binnen zeer naauwe grenzen beperkt , zoodat , terwijl de inwoners van de eene plaats er veel door te lijden hebben , die van eene andere op eenen korten afstand verwijderd , verschoond blijven , en aan den voortgang der ziekte paal en perk wordt gesteld , wanneer hare lijders in den beginne hunne woning van de eene naar de andere plaats kunnen overbrengen.

Toevallen en
beloop.

Lang voordat de uitslag op de huid verschijnt , zijn algemeene ziekteverschijnselen aanwezig. Klagende over lusteloosheid , zwakte en loomheid , gaat de eetlust verloren , de maagstrekk wordt pijnlijk en de gemoedsgesteldheid droefgeestig. Drukkende , doffe pijn in het hoofd en den rug , verdoofde gevoeligheid der onderste ledematen , ruifching in de ooren en een kleine langzame pols vergezellen dien toestand. Gelijktijdig neemt de huiduitwaseming eenen eigenen reuk aan , niet ongelijk aan dien van beschimmeld brood. De urin wordt dik en troebel ; de maandstonden zijn onregelmatig of onderdrukt , door witten vloed gevolgd. Met toenemende maagaandoening , buikpijn en talrijken stoelgang treden de eerste verschijnselen der huidziekte te voorschijn. Naar mate de zomer nadert , verzwaren de aanwezige toevallen ; de hoofdpijn wordt hevig stekend ; een kieuwelend gevoel in de ruggegraat met vliegende pijn door de ledematen , zenuwtoevallen , gezichtsverduistering , dubbelzien

en

en buikloop vergezellen de voortgaande ontwikkeling des uitslags. Roosaardig ontstokene vlekken zijn op den rug der handen, op de beenen, den hals, de borst en, bij mannen, op den rug, zoo verre zij dien bij den arbeid ontblooten, aanwezig; eenigen tijd voorafgegaan door knobbeltjes, die hunne eerst witte kleur met eene ligtroode, tot donkerrood klimmende, verwisfelen. De aanwezige vlekken groeijen tot grootere plekken ineen, bekomen eene glinsterende roode kleur, donkerder dan die der roos, gepaard met spanning en hevige jeukte. Binnen een korter of langer tijdsverloop, dat eenige weken, maar ook maanden duren kan, ontstaan op de ineengevloaide vlekken blazen van verschillende grootte, gevuld met eene heldere vloeistof; of de huid wordt droog, wankleurig, ruw, en er grijpt eene ligte afschilfering der opperhuid plaats. De schilferende vlekken zijn glad, gevoelig en rooskleurig. Op al deze aandoeningen, die de huid ondergaat, heeft de inwerking der zonnestralen eenen gewigtigen invloed; want dezelve kunnen, zoo niet geheel verhoed, echter aanmerkelijk verzacht worden, door de lijdende deelen gedekt te houden en de zonnestralen af te weren.

De hevigheid der algemeene ziekte-toevallen staat met het plaatselijk lijden in geene evenredigheid: de eerste kunnen eenen zeer hoogen trap bereiken, terwijl de laatste gering schijnen; zelfs kunnen zij geheel achterwege blijven, of eerst na verloop van jaren te voorschijn komen (*Pellagra larvata*).

De

De huidaandoeningen, die na den eersten aanval van de *pellagra* met den intredenden herfst verminderen en des winters geheel verdwenen zijn, gaan met aflaten der algemeene toevallen gepaard, zoodat de lijders schijnbaar eene vrij goede gezondheid genieten. Maar in de volgende lente keeren de algemeene en plaatselijke toevallen met grootere hevigheid terug, en bewijzen onwederlegbaar het bestaan der *pellagra*, daar bij geringe toevallen gedurende den eersten aanval het aanwezen dezer ziekte in twijfel zoude kunnen getrokken worden. Na den eersten of tweeden terugkeer der *pellagra* zijn hare aanvallen zwaarder en duren voort door alle jaargetijden henen, zonder af te laten. Somwijlen, echter zelden, gebeurt het, dat tusfchen den eersten en den tweeden aanval een vrije tusfchentijd van eenige jaren verloopt.

Naar mate de kwaal langer geduurd heeft, bereiken de toevallen eenen hooger trap, steeds verslimmerd in hare ontwikkeling voortgaande. De buikloop neemt de verschijnselen des rooden loops aan; het tandvleesch, de mondholte en de tong zwellen, bedekt met zweertjes, door inkervingen gekloofd en niet zelden met speekselvloed verbonden. De slaap is onrustig, afgebroken door krampen en stuiptrekkingen; aanvallen der vallende ziekte vinden plaats; de onderste ledematen verlammen onvolkomen, en maken het gaan moeilijk en onzeker. De oogen zijn ontstoken, gevolgd door gezichtsverduistering en zwarte staar. Eene ziekelijke begeerte tot den bijslaap vermeerderd de kwal-

lin-

lingen der lijdens. De reeds met de voorboden begonnene neerslagtigheid slaat tot melancholie over. Stompzinnig in zich zelve gekeerd, wenden zij alle pogingen aan, om zich door verdrinken te moorden. Meermalen gaat de melancholie tot krankzinnigheid over, hetzij zich kenmerkend door stille ijlhoofdigheid met zucht tot zelfmoord, hetzij met raaskallenden waanzin, versnelde bloedsomloop en heftige koorts. Plotseling plaatsgrijpende vermindering der algemeene toevallen zijn alsdan de voorboden des naderenden doods, door sluipen voorafgegaan. Gewoonlijk echter eindigt het leven door heftige koortsen en krachttuitputting, nadat de buikloop smeltend geworden is, en zoo wel plaatselijke als algemeene waterzucht voorafgingen. In den nu geschilderden toestand, waarin de algemeene ziekte-verschijnselen den hoogsten trap bereiken en alle hoop op herstel vernietigd is, heeft men de ziekte met den naam van *tabes pellagrosa* of *pellagra desperata* bestempeld. De bij herhaling wederkeerende aanvallen van de aandoeningen der huid doen deze op verschillende wijs ontaarden. Nadat het zoogenaamde bontjesvel voorafging of wel een uitflag, die, over de geheele oppervlakte verbreid of tot enkele deelen bepaald, hevig jeukt, peukelachtig, puistig is en zich met roven bedekt, wordt de huid perkamentaardig, ruw; zij scheurt, krijgt diepe kloven, vooral aan de vingers; het gevoel gaat verloren, en dikke schubachtige roven bedekken de vroeger ontstane vlekken. De algemeene toevallen, vooral die, welke het lijden der zenuwen

doen

doen kennen, nemen bij deze hoogere ontwikkeling des uitflags af. Somwijlen ziet men ook, kort voor den dood, vlekken in de huid, door uitgevaat bloed ontstaan.

Gorzaken. Lieden uit den behoeftigsten volkstand, welke Voorgeschied- landelijken arbeid verrigten, volgens EDEL. VON heid. Prae- dispositio HILDEBRAND vooral de maaijers van hooi- en rijst-landen, en de wachters bij de waterleidingen, hebben eenen grooteren aanleg voor de *pellagra* dan grijsaards en kinderen; maar dat deze en gene, zelfs zuigelingen niet uitgezonderd, kunnen aangetast worden, bewijst de ervaring. Ook is de aanleg erfelijk, in dier voege namelijk, dat kinderen, van *pellagreuse* ouders verwekt of geboren, aan de landeigene schadelijkheden in plaats, waar de *pellagra* inheemsch is, blootgesteld, spoediger dan andere kinderen, van gezonde ouders geboren, er door aangetast worden, en reeds vroeg de sporen der ziekte omdragen. Ook is de aanleg bij de inboorlingen meer ontwikkeld dan bij vreemdelingen. De ervaring leert, dat deze zelden, nimmer binnen de eerste jaren hunner inwoning, maar eerst na eene reeks van jaren in plaats, waar de *pellagra* heerscht, gewoond te hebben, worden aangetast. Dat de weersgesteldheden, andere *atmospherische* en *klimatische* betrekkingen, de ontwikkeling van den aanleg bevorderen of vertragen, is blijkbaar, daar de ziekte in het eene jaar meer algemeen verbreid voorkomt en kwaadaardiger is, dan in het andere; in vruchtbare jaren ziet men haar het zeldzaamst.

Armoede, ongunstige betrekkingen in het leven, Toevallige
 slecht voedsel der behoeftigen, het veelvuldig ge-^{oorzaken.}
 bruik van Turksche tarwe tot voedsel, zuur brood,^{Causae oc-}
 zware arbeid op het open veld bij moerasfige^{casinoales.}
 uitwasemingen, en onreinheid in kleeding en woning,
 begunstigen de ontwikkeling der *pellegra*. Be-
 smettend is dezelve niet.

Waarom de *pellegra* alleen in enkele gedeelten Endemische
 van *Opper-Italië* oorspronkelijk ontwikkeld wordt,^{oorzaken.}
 blijft raadselachtig, daar de landeigene schadelijk-
 heden tot eene volledige verklaring ontoereikende
 zijn; want de *mal de la rose* van *Asturie* en de
 epidemie van 1829 en 1830, die onder den naam
 van *acrodynie* te *Parijs* heerschte, en groote over-
 eenkomst met de *pellegra* vertoonen, ontwikkelen
 zich zonder den invloed van de endemische scha-
 delijkheden, waaraan de *pellegra* wordt toegeschreven.
 Intusschen is het hoogst waarschijnlijk, dat het
 warme klimaat van *Opper-Italië*, de rijstteelt, de
 daarbij noodige kunstmatige overstromingen, de
 uitwasemingen der moerasen, de eigene ligging des
 lands, de hooger en lager liggende dalen, waar het
 hooggebergte der Alpen, zich, dalende, in de
 uitgestrekte vlakten van *Milaan* verliest, met
 elkander vereenigd, en geholpen door andere nog
 onbekende invloeden voor endemische oorzaken te
 houden zijn.

In de lijken der aan de *pellegra* overledenen vindt Naaste oor-
 men in de buksingewanden, in de hersenen, in^{zaak.}
 het ruggemerg en in de zenuwen werktuigelijke^{Causa pro-}
 veranderingen met ontstekingsaardige aandoeningen,
 wel-

welke door de meeste Geneeskundigen voor de gevolgen, door eenige weinige voor de oorzaken der ziekte gehouden worden. Waarschijnlijk bestaat er een vreemde prikkel als naaste oorzaak, die door de natuur niet kan geassimileerd worden, en die de bewerktuiging tot eene onregelmatige reactie aanspoort, ontoereikende om eene volkomene *crisis* tot stand te brengen. Of deze prikkel in ontmening der vloeibare of vaste deelen, door de endemische oorzaken voortgebracht, gegrond zij, blijft onbeslist.

Onderscheidingsteekenen. *Diagnosis.* De periodieke terugkeer der uitwendige toevallen in de lente en den zomer, hun verdwijnen in den herfst en winter, terwijl de algemeene toevallen voortduren; de endemische geaardheid der ziekte; de verwarring der verstandelijke vermogens, en de zucht tot zelfmoord, onderscheiden de *pellagra* van alle andere ziekten.

Voorzegging. *Prognosis.* De *pellagra* is eene zeer langdurige, hardnekkige, zelden geneesbare ziekte. Alleen in haar eerste tijdperk, doelmatig behandeld wordende, mits de lijder van woonplaats veranderen kunne, mag men een gunstig einde voorspellen.

Geneeswijze. Al de tot hiertoe beproefde behandelingen der *pellagra* in hare gevorderde tijdperken, zijn, in het algemeen genomen, mislukt.

De Geneeskundigen, welke de *pellagra* in haar vaderland gezien en behandeld hebben, houden het voor noodzakelijk, dat de lijder, zoodra hij de eerste sporen der ziekte ontdekt, zijne woonplaats met eene andere verwiscele, waar de *pellagra* niet in-

inheemsch is ; — dat onder deze voorwaarde alleen de ziekte kan genezen of ten minste in haren voortgang gestuit, en het leven gerekt worden. De lijder moet daarbij gerust en gemakkelijk leven, zwaren arbeid mijden, en eenen voedzamen eetregel kunnen volgen, bepaald tot zachte, gezonde spijsen, met uitsluiting van al wat zout, gerookt, scherp en ligt aan gisting onderhevig is. De antiscorbutische planten en van deze bovenal de porselein; later, versterkende en opwekkende middelen, afgewisseld of voorafgegaan door ontlastingsmiddelen, waar gastrische ophoopingten aanwezig zijn, worden algemeen aanbevolen. Den buikloop trachte men door opium in bedwang te houden; de kramptrekkingen en zenuwaandoeningen door zenuwmiddelen te bedaren. GHIDELLA bezigt bloedzuigers, bloedige koppen, vliegenpleisters en zemelbaden; vervolgens bittere middelen, ijzerbereidingen, vochtrijke, ligte voedfels en wijn. AB. CERRI, die de oorzaak van de *pellagra* uit het zure brood stelt, bepaalt voor de behandeling het gebruik van zoet, goed bereid en uitgebakken brood en de melkkuur gedurende twee tot drie maanden. EDEL. VON HILDEBRAND zag de *pellagra* in haar eerste tijdperk genezen door openende, oplosfende, bittere middelen, ondersteund door eenen doelmatigen leefregel, en verplaatsing der zieken, ten einde ze aan de atmosferische schadelijkheden te onttrekken. In gevallen, waarin de ziekte reeds lang bestaan en vele jaren achtereenvolgend wedergekeerd was, liet hij eerst het waterachtige aftrek-

fel der rhabarber, daarna versterkende geneesmiddelen en dierlijk voedsel gebruiken. Spiesglas-bereidingen en versterkende zenuwmiddelen waren dikwijls nuttig. Baden en wasfchingen waren doorgaans onmisbaar.

11^{de} Orde.

Syphilides. Venerifche Huidziekten.

Onder *Syphilides* zijn al die huidaandoeningen begrepen, welke ten gevolge van venerifche befmetting ontstaan, onverschillig of deze primair van huid op huid heeft plaats gehad, of dat zij fecundair, na voorafgegane befmetting der teedeelen, voorkomen ten gevolge der fyphilitifche dyscrasie, hetzij door veelmalige befmetting, hetzij door ondoelmatige behandeling verwekt.

De *syphilides* komen in alle gedaanten der huidziekten voor, als *erythema*, vlekken, peukels, puisten, knobbels, zweren, enz. Zij onderscheiden zich van andere huidziekten daarin, dat zij, in welke gedaante ook voorkomende, aan de aangedane huiddeelen eene koperkleur mededeelen; dat verreweg in de meeste gevallen venerifche befmetting door vereeniging met onreine personen voorafging, en er gelijktijdig verfchijnfelen aanwezig zijn, welke de *syphilis* kenschetsen.

De *syphilides* worden nimmer door de natuur genezen, maar vorderen eene wél bestuurde behandeling met kwikbereidingen, geholpen door middelen, van welke de ervaring heeft bewezen, dat zij krach-

krachten bezitten om de *syphilitische* dyscrasiën te verbeteren en op te ruimen. Complicatiën der *syphilides* met alle andere dyscrasiën, cachexiën en ziekte-gefteldheden, van welken aard ook, komen zeer menigvuldig voor, en vorderen gewijzigde geneeskundige behandelingen, geleid en toegepast volgens de voorschriften der algemeene en der bijzondere ziektekunde.

De *syphilides* zijn door de nieuwere Schrijvers algemeen onder de huidziekten opgenomen, en behoorden derhalve ook in dit werk eene plaats te beflaan; maar zij kunnen geen onderwerp voor eene uitvoerige bebandeling opleveren, daar zij tot de algemeene *syphilis* behooren, en alzoo ter bane zullen komen dàar, waar over deze ziekte zal gehandeld worden.

12^{de} Orde.

Purpura. Peperkoren.

(Handboek 2^o Deel. 2^o Afd. 2^o St. pag. 810.)

13^{de} Orde.

Elephantiasis Arabum, *Elephantia*, *Lepra artuum*. Arabische Olifantsziekte.

Eene harde, veerkrachtige zwelling, waarop geene putten kunnen ingedrukt worden, ontstaan door ontaarding van de huid, het celweefsel en het daarin bevatte vet, en waardoor de aangedane deelen buitengewoon vergroot en wanftaltig worden.

Reeds lang vóór de Arabieren vindt men deze huidontaarding, gelijk HENSLER bewees, door

Naam en
Geschiedenis.

CELSUS, ARETAEUS en ARCHIGENES naauwkeurig en fraai beschreven. De schrikbarende wanftaltigheden, welke deze ziekte in de lijdende deelen te weeg bragt, de verdikte, loodverwige, met kwabben en wrongels over elkander en over de gezond geblevene deelen afhangende, ziekelijk gestelde huid, waardoor eenige gelijkenis met de huid van den Olifant plaats vindt, hebben haar den naam van *elephantiasis* doen geven. Tot de onderste en wel meerendeels tot slechts één der ledematen bepaald, draagt zij om dezelfde reden, en omdat het voetgewricht, gelijk bij den Olifant, onbewegelijk wordt, den naam van Olifants-voet. Tot onderscheiding van de Grieksche Olifantsziekte, heeft men er het woord Arabische bijgevoegd; echter niet, omdat dezelve het eerst door de Arabieren waargenomen en beschreven werd, maar omdat dezelve, zoo verre de geschiedkundige nasporingen reiken, uit het vaderland der Arabieren herkomstig is, zich van daar verder heeft verbreid, en door de Arabieren aan alle landen en werelddeelen is medegedeeld. In *West-Indië*, vooral op *Barbados*, inheemsch geworden zijnde, gaf zulks aanleiding haar de klierziekte van *Barbados*, en, tot één been bepaald blijvende, het been van *Barbados* te noemen.

Algemeene
Geaardheid.

De Arabische Olifantsziekte, die in de middeleeuwen met andere huidziekten, onder den gemeenen naam van melaatschheid, *Europa* teisterde, is thans in dit werelddeel eene zeldzame, in de Keerkringslanden daarentegen eene inheemsche ver-

verwoestende ziekte geworden. Met HENSLEER houde ik het voor hoogst waarschijnlijk, dat de Arabische Olifantsziekte de oorspronkelijke vorm der melaatschheid geweest is, en dat zij, gewijzigd door plaatselijke invloeden, waaraan zij onder de Keerkringen en aan de Polen, zoowel als in de gematigde hemelstreken blootstond, de moeder is geworden van vele aan enkele gewesten gebondene kwaadaardige en veelal ongeneesbare huidziekten.

Ten onregte heeft men alle buitengewone wanstaallige vergrootingen der onderste ledematen tot den olifants-voet gebragt, en zuchtige zwellingen met spataderachtige ontaarding, door fluiting der bloedaderen verwekt, zoowel als *syphilitische* en andere toevallige wanstaaligheden daaronder opgenomen.

De Arabische olifantsziekte kan alle deelen des ligchaams aantasten; meerendeels echter blijft zij tot de onderste ledematen op ééne zijde en tot de teeldeelen bepaald. Ook gebeurt het, dat zij het eerst aangetaste deel verlaat, en op een ander te voorschijn komt. Zij behoort tot de slepende, in hare ontwikkeling langzaam voortgaande en zeer langdurige ziekte. Bij beide de geslachten en in alle leeftijden komt zij voor, doch het menigvuldigst bij volwassenen. Zij is niet besmettend; maar de aanleg schijnt van de ouders op de kinderen over te erven. In alle landen vindt men voorbeelden dezer ziekte, maar niet talrijk. In de Amerikaansche keerkingslanden, waar zij met de Neger-slaven is ingevoerd, heeft zij de endemische geaardheid verkregen en zich algemeen verbreid.

De vergrooting der lijdende deelen is menigwerf aan het ongeloofbare grenzende : één der onderste ledematen overtreft den omvang en het gewigt van het geheele ligchaam. Volgens JON. GREEN WOOG het afgezette, door deze ziekte aangetaste *scrotum* dertig Nederlandsche ponden.

Toevallen
en beloop.

De *elephantiasis Arabum* begint gewoonlijk plotseling met hevige, diepzittende pijnen langs den loop der bloed- en watervaten; gelijktijdig worden deze hard en bij het aanraken pijnlijk; als gespannen koorden, door knopen afgedeeld, klimmen dezelve van de teenen en vingeren opwaarts, en eindigen in de harde gezwollene klieren van de liezen en der okselholte. Het celweeffel en de huid der lijdende deelen zijn roosachtig ontstoken en sterk gezwollen. Koorts met langdurige koude rillingen, hevige dorst, gastrische aandoeningen, zijn aanwezig en worden door zware hitte en overdadig zweet gevolgd. De hersenen en zenuwen worden medelijdend aangedaan, en somwijlen grijpt ijlhoofdigheid plaats. Hierna nemen de algemeene toevallen en de plaatselijke aandoening der bloed- en watervaten af, en laten voor eenigen tijd geheel na. De zwelling der aangedane deelen gaat intusschen voort met in omvang en uitbreiding toe te nemen, verliest hare weekheid en wordt veerkrachtig en hard. Na den afloop van dezen eersten aanval, genieten de lijders eene tamelijke gezondheid, tot dat, na een korter of langer tijdsverloop, de algemeene toevallen terug keeren, om hetzelfde beloop te volgen. Bij afwisseling grijpen deze tijdelijke verheffingen en aflaten plaats,

zoo lang de ziekte duurt. De eenmaal aanwezige zwelling der aangedane deelen is blijvend, zonder hare grenzen te overschrijden; en zeer langzaam in omvang toenemende, blijft zij tot het eerst lijdende deel beperkt; (er zijn gevallen bekend, waarin zij, in de lange reeks van tien jaren, beneden het kniegewricht bleef staan); of de zwelling groeit onafgebroken, zoowel gedurende de verheffingen als de aflaten, aan, en verbreidt zich spoedig over de geheele uitgestrektheid van het lijdende deel; al deszelfs plooiën en de uitwendige verhevenheden en holligheden der gewrichten verdwijnen. De ledematen bereiken eenen ongeloofbaren omtrek; diepe, dwarslopende kloven verdeelen de zwelling en maken haar nog afzigtiger. Met kwabben hangt de ontaarde huid over de handen en voeten neder, dezelve zoodanig bedekkende, dat naauwelijks de voorste leden der vingers en teenen zichtbaar blijven. De onderste ledematen gelijken op wanstallige zuilen; de armen worden zoodanig misvormd, dat zij geene deelen meer schijnen te zijn van het ligchaam, waartoe zij behooren. Naar mate de zwelling grooter wordt, neemt de ontaarding van de huid, van het celweeffel en van het vet toe, en veranderen deze in eene spons- en spekachtige zelfstandigheid. De handpalmen en de voetzolen blijven intusschen vrij van ontaarding en zwelling: een opmerkenswaardig en kenfchetfend verschijnsel in deze ziekte, dat zich uit het maakfel van het celweeffel niet laat verklaren, aangezien hetzelfde in andere heilkundige gebreken tot eenen buitengewonen omvang zwelt.

De veranderingen, welke de huid, ten gevolge der deelneming in de onttaarding van het vet en het celweeffel, ondervindt, zijn veelvuldig en verschillend gewijzigd. In het begin en in de lichtere graden der ziekte is de huid verdikt, vast en bleek. In het tweede tijdperk zwellen de bloedaderen en ontaarden in talrijke spatadergezwollen, waardoor de geheele omvang der gezwollene deelen eene loodkleur aanneemt. Ten laatste ontaart het geheele weeffel der huid. Voortdurend in eenen toestand van roosaardige ontsteking zijnde, ontstaan er groepsgewijze talrijke blaasjes, die eene scherpe naar schimmel riekende wei ontlasten, welke hier en daar tot schubachtige roven verdroogt, gelijkende naar die der *ichthyosis*, onder welke diepe kloven en zweren ontstaan, die in een wit, sponsachtig, niet zeer verheven weeffel ontaarden of met dikke gele korsten bedekt raken.

De verharde en gezwollene weivaaat-klieren gaan door nieuw opgewekte ontstekingen tot verettering over, gevolgd door etterbuilen en diepe zweren, die weinig pijn verwekken, eenen zeer stinkenden etter afscheiden, en zelden tot genezing zijn te brengen.

Niet alleen de ledematen, alhoewel zulks dikwijls geschiedt, maar ook het *scrotum*, de *penis*, de omtrek van den aars, bij vrouwen de uitwendige teeldeelen en de borsten, worden meermalen, somtijds ook alle andere ligchaamsdeelen door de Arabische olifantsziekte aangetast. De gevoeligheid is in de lijdende deelen wel niet uitgebluscht, maar
toch

toch meer onderdrukt dan verhoogd. In een door mij waargenomen geval, waarin zich de ziekte tot het eene been bepaalde, dat den omvang van het gezonde meermalen overtrof, en, wat de uitwendige gedaante betreft, volkomen overeenkwam met het afgebeelde been, voorkomende op de plaat, door het Genootschap te *Hoorn* in het licht gegeven, klaagde de lijder bijna nimmer over pijn.

De wanftallige vergrooting der lijdende ledematen en de verstijving van derzelver gewrichten maken dezelve voor den lijder, die ze moet medeslepen tot een' nntteloozen last. Overigens kunnen de lijders eenen hoogen ouderdom bereiken, en, alhoewel zij er kwaadsappig uitzien, eene betrekkelijk goede gezondheid genieten. Zoo lang er geene koortsen bijkomen, smaakt en bekomt hun het eten en drinken goed. Zonder de geringste stoornis in de spijsvertering te ondervinden, wordt alles goed verdragen, en de verstandelijke vermogens blijven ongekrenkt.

Zonder bekende oorzaken ontwikkelt zich de Arabische olifantsziekte. Waarschijnlijk zijn hare oorzaken in landeigene schadelijkheden gelegen, afhankelijk van den invloed der betrekkingen en der in gebruik zijnde leefwijze. Naar mate deze veranderingen en wijzigingen ondergaan, kan de ziekte toe- en afnemen, in het eene land verdwijnen en in het andere, waar zij vroeger onbekend was, geboren worden. De ervaring schijnt deze stelling te staven. In de middeleeuwen was de Arabische olifantsziekte zeer gewoon; thans is zij in *Europa*

eene hoogst zeldzame ziekte. In *Amerika*, waar zij weleer onbekend was, is zij, na den invoer van Afrikaansche slaven en door eene geheel andere leefwijze dan die der Amerikaansche inboorlingen, tot eene algemeen verbreide endemische ziekte geworden.

Dat likteekens van verouderde zweren, en andere oorzaken, welke door verstoppingen den bloedaderlijken omloop belemmeren en de weivaten drukken, de oorzaken van den olifantsvoet zijn zouden, laat zich noch met het beloop, noch met de geaardheid van dit gebrek overeenbrengen.

De laatst waarneembare gevolgen van de werking der onbekende schadelijkheden, de naaste oorzaak genoemd, bestaat in hypertrophie van het celweeffel onder de huid, bederf van het daarin bevatte vet en de daarmee verbondene ontaarding der huid.

De veranderingen, gevonden in de lijken der aan deze ziekte overledenen, hebben tot hiertoe niets opgehelderd. Die van het weeffel der algemeene bekleedfelen van de spieren en van het vet maken wel den invloed en de werking der ziekte op die deelen kenbaar, maar ontsluit haar wezen in geenen deele.

Kenteekenen. Het eigenaardige beloop der Arabische olifants-
Diagnosis. ziekte; de ontsteking der weivaten, waarmee zij begint; de ontaarding en buitengewone vergrooting der lijdende deelen; en hunne wederstand biedende hardheid; de afwezigheid van de korstachtige roven der *lepra*, en van de knobbels der Grieksche olifantsziekte, kenschetsen en onderscheiden haar van al de andere huidziekten.

Voorzegging. De langdurige hardnekkigheid en de zelden met
Prognosis. een

een goed gevolg bekroonde pogingen tot genezing, maken de voorzegging in deze ziekte altijd ongunstig. Alleen in het tijdperk harer ontwikkeling, zelden in de meer gevorderde tijdperken, mag men zich met genezing vleijen. Een ongunstig einde staat te vreezen, waar cachectische toestand met krachttuitputting verbonden is, en hectische koortsen plaats grijpen of aanwezig zijn.

In het begin der ziekte, terwijl de weivaten ^{Geneeskun-} ontstoken zijn, en de algemeene gezondheids-toestand ^{dige behan-} deling.

zich gunstig voordoet, zijn algemeene en plaatselijke bloedontlastingen — de laatste door bloedzuigers langs den loop der ontstokenene vaten, lakseermiddelen, van tijd tot tijd te herhalen, en verzachtende pappen op de lijdende deelen, aangewezen. Zoodra de ziekte het chronische tijdperk is ingetreden, wordt de behandeling moeilijk, niet bemoedigend, maar meerendeels vruchteloos. Te vergeefs beproefde men plaatselijke bloedontlastingen, inkervingen der lijdende deelen, vliegenpleisters, brandmiddelen en de afzetting van het lijdende deel.

De drukking, de oplosfende inwrijvingen en de dampbaden schijnen betere uitkomsten te geven, en, zoo men op de ervaring der Fransche Geneesheeren vertrouwt, aanbeveling te verdienen.

De drukking wordt bewerkstelligd door middel van eenen zwachtel, die niet te breed, maar lang genoeg zijn moet, om het geheele deel, goed fluitend, met genoegzame drukking te omwinden. De zwelling der deelen wordt er door verminderd, en
het

het gebruik van andere plaatsmiddelen gemakkelijk gemaakt. In het geval, door mij waargenomen en gedurende eene reeks van jaren behandeld, bleef het uitdrijvend verband, na meermalige schijnbaar tot stand gekomene verbeteringen, zonder vrucht.

Tot de oplosfende middelen behooren hier: het *unguentum neapolitanum*, dagelijks eenige malen ingewreven. Dit bewijst soms goede diensten, alhoewel het in mijn geval wel tijdelijke verbetering, maar geene genezing tot stand bragt. Met groot vertrouwen meent BIËRT de zalf, uit een scrupel tot eene halve drachma *kali jodini* met ééne once reuzel bereid, te mogen aanraden, mits er mede opgehouden worde, zoodra er eene actieve ontsteking, gelijk bij de *elephantiasis Arabum* meermalen geschiedt, plaats vindt.

De dampbaden worden als hoogst nuttig aanbevolen. Ter regeling van het gebruik wordt voorgeschreven: Men leide de heete waterdampen, gedurende een vierde uurs, door middel eener pijp zoodanig op de lijdende en gezwollene deelen, dat elk derzelve behoorlijk en gelijkmatig wordt beftoomd, en gedurende deze bewerking worden de gezwollene deelen fterk gekneed.

Naar aanleiding van het verfchil der fchadelijkheden, complicatiën en wijzigingen der ziekte door toevallige omftandigheden, vordert de inwendige behandeling ook wijzigingen in de toepafing van het geneesplan, dat men volgt. Eigene middelen, gefchikt om de dyscrasie der Arabifche olifants-ziekte (waartoe men toch ter verklaring van vele

zaken toevlugt moet nemen, om zich uit een doolhof te redden, waarin men ongemerkt geraakt) uit den weg te ruimen, bezit de Geneeskunst tot heden niet. Men volge de raadgevingen van anderen, voor zoo verre deze op ervaring steunen en met eene bestaanbaar oordeelende ziektekunde, gegrondvest op de mensch-natuurkunde te rijmen zijn. Zonder kritiek alles na te volgen, wat anderen deden of doen, is dwaasheid.

14e. Orde.

Keloides, Cheloides, Cancroides.

Schilpad-gezwel.

Deze nog weinig gekende ziekte, — het eerst door ALIBERT onder den naam van *cancroides* (kankeraardig), later onder dien van *cheloides* (gezwel met brandende hitte) beschreven, door BATEMAN in twijfel getrokken, door de waarnemingen van BIËTT en RAYER in haar bestaan bevestigd, — wordt onder de hoogst zelden voorkomende ziekten gerangschikt. Naar mijne overtuiging is zij echter zoo zelden niet, als het wel schijnt, maar wordt in de meeste gevallen met huidkanker, *impetigo rodens*, *lupus* en venerische zweren verwisseld. Willekeurig is de benaming van schilpad-gezwel, ontleend aan de overeenkomst met den rug eener schilpad: immers men heeft de kwaal ook met de scharen eener kreeft en met de pooten der krabben en padden vergeleken.

Weinig boven de huid verhevene, harde liktee- Bepaling.
ken-

kenaardige gezwellen van eene onregelmatige gedaante en van licht- tot donkerroode kleur, met dwarse fijne inkervingen, zonder klopping.

Toevallen
en beloop.

Gewoonlijk begint de *keloïdes* met een klein, hard, rood gezwelletje, niet grooter dan een hennepzaadje, veelmalen op een likteeken, dat na voorafgegane huid-beleediging is terug gebleven. Binnen een niet zeer langdurig tijdsverloop wordt dit gezwelletje grooter, verheft zich uitpuilend boven de huid en krijgt eene eironde, in het midden ingedrukte, of eene langwerpige rolronde gedaante. In beide gevallen vertoont de oppervlakte zijne dwars loopende inkervingen of rimpels en gevulde bloedvaatjes. In de ontwikkeling zeer langzaam voortgaande, krijgt het gebrek het aanzien van een likteeken, dat na verbrandingen in den derden graad terug blijft. De verhevene kamaardige naden en randen hebben eene rozenroode of donkerroode kleur, terwijl de huid in den omtrek hare natuurlijke kleur behoudt, onderworpen aan den invloed der temperatuur en des intredenden stonden-vloeds bij vrouwen. De verhevene naden, die zich bij de eironde *keloïde* uit het middelpunt met onregelmatig gevormde takken, en bij de rolronde in de lengte uitbreiden, zijn hard en weêrstand biedend. De reeds vroeger aanwezige dwarse inkervingen zijn dieper, en de rimpels duidelijk gevormd. In de grootste uitbreiding en ontwikkeling, die eerst na een zeer lang tijdsverloop tot stand komt, zijn de *keloïdes* eenige lijnen boven de huid verheven; het hoogst naar den omtrek, en meer ingedrukt in

hun

hun midden. Meerendeels is er slechts een gezwel aanwezig; echter komen ook gevallen voor, waarin dezelve gelijktijdig op twee en meer plaatsen bestaan. De omtrek der enkel aanwezige bedraagt van een tot twee vierkante duimen oppervlakte. De gewone zitplaats der *keloides* is de voorste oppervlakte der borst, zelden de hals en het aangezicht of de armen; echter kunnen ook op alle andere deelen des ligchaams deze gebreken voorkomen. RAYER zag ze eenmaal in het aangezicht na voorafgegane zamenvloeiende pokken. Op de borst hebben ze gewoonlijk eene eironde gedaante met een ingedrukt midden (*cancroïde ovulaire ALIBERTI*); op de armen eene langwerpige half rolronde (*cancroïde cilindracée ALIBERTI*). Menigwerf gaat de *keloides* met hevige pijnen, jeukte en diep doordringende scheuten gepaard, vooral gedurende weersveranderingen en prikkelende, de geheele bewerktuiging treffende invloeden. Ook komen gevallen voor, waar deze pijnlijke aandoeningen aanwezig zijn, en de lijders alleen jeukte en kriebeling ontwaren.

Ongestoord aan zich zelve overgelaten, ontwikkelt zich de *keloides* zeer langzaam, en kan jaren lang onveranderd blijven. Op eene ondoelmatige wijze getergd en geprikkeld, gaat zij spoediger voort en kan eene kwade geaardheid aannemen. Zelden gaat zij tot verettering over. Bij eene voortdurende ligte schilfering der opperhuid, verbleeken de naad- en kamvormige verhevenheden, krimpen in, verdwijnen en laten witte, vaste likteekens terug.

De

Oorzaken. De algemeen aangenomene zeldzaamheid der *keloides*, de weinige waarnemingen, die er bestaan, en de zeldzame gelegenheid, die zich tot waarnemen aanbiedt, hebben ten gevolg, dat de oorzaken van dit huidgebrek nog in het duister liggen. Likteekenen van voorafgegane huidbeledigingen, de middelbare leeftijd en het lymphatische temperament schijnen het ontstaan der *keloides* te begunstigen; de kinderlijke leeftijd schijnt er tegen te beveiligen, en beide geslachten evenzeer aan dezelve onderworpen te zijn, alhoewel ALIBERT meent, dat de vrouwen bij voorkeur worden aangetast. ALIBERT telde onder zes lijdens vier vrouwen en twee mannen; BIËTT onder negen, vijf vrouwen en vier mannen, en RAYER onder vijf, vier mannen en eene vrouw: onder twintig lijdens waren derhalve de getallen volkomen gelijk, namelijk tien mannen en tien vrouwen.

Onderscheidingsteekenen. *Diagnosis.*

De kamvormig, boven de huid verhevene, roode, in het midden ingedrukte, naar den omtrek met opspringende vaste en tegenstand biedende randen omgevene gezwellen, die met kloppen en op de oppervlakte met vele fijne dwarsstrepen en bloedadertjes voorzien zijn, terwijl de kenfchetfende teekenen der kankerachtige en knoestgezwel-aardige verhardingen der venerische knobbels, der beursgezwellen en der vaatachtige moedervlekken ontbreken, maken het niet moeilijk de *keloides* te onderkennen.

Voorzegging. Dit onbelangrijke, maar zeer langdurige huidgebrek kan maanden en jaren bestaan, zonder de gezondheid.

zondheid te storen. Veelal wordt het door de lijders te gering geacht, om geneeskundige hulp er tegen in te roepen. Tot kankerachtige onttaarding is hetzelfde niet genegen; alleen dan eene ongunstige geaardheid aannemende, wanneer eene ondoelmatige behandeling wordt gekozen.

Geene tot heden toe aangewende uit- en inwen-^{Geneeswijze.} dige middelen, het mes en de bijtmiddelen niet uitgezonderd, hebben aan de verwachtingen doeltreffend beantwoord. SCHEDEL en CAZENAVE schieen het toe, dat de zwaveldampbaden het inkrimpen der *keloides* bevorderen. BIËRT wil bij voorkomende gelegenheden het *kali hydrojodinum* tot inwrijvingen beproeven. Volgens RAYER had aanhoudende drukking in een door hem behandeld geval aanvankelijk een goed gevolg; maar de lijder brak door zijn vertrek de behandeling af. Het gevaarlooze dezer huidaandoening; de geringe last, dien zij aan de lijders verwekt; het inkrimpen en verdwijnen van die, welke men aan zich zelve overlaat, en het ontoereikende der geneeskundige behandeling, maken het allezins raadzaam, dit gebrek aan de natuur over te laten.

EINDE VAN HET DERDE DEEL.

REGISTER

OP HET DERDE DEEL.

A.

	bladz.
Achroa.	433, 446.
Acne.	132.
— indurata.	137.
— punctata.	136.
— rofacea.	140.
— simplex.	134.
Albinismus.	446.
Anthracia tubula.	354.
Anthracophlyctus.	418.
Anthrax.	418.
Arabische olifantsziekte.	483.

B.

Baardschurft.	147.
Blaar (eenvoudige vuile).	79.
— (knagende of invretende)	82.
— (verhevene of schulpvormige)	81.
— (vuile)	79.
— (zwarte)	424.
Blaasjes.	8.

Blazen.	78.
Bloedvin, Bloedzweer.	411.
Boasie van Suriname.	329.
Bullae.	78.

C.

Cancer superficialis.	405.
—— vulgaire.	450.
Cancroïdes.	493.
Carbo, Furunculus gangraenosus	418.
Carbunculus.	418.
—— ——— contagiosus.	424.
—— ——— septentrionalis.	424.
Cerostrophis.	450.
Cheloïdes.	493.
Coma caesarea.	453.
Crusta lactea, Lactumina.	103.
—— ——— puerperarum.	108.
—— ——— serpiginosa.	106.

D.

Dermatagria.	472.
Dartre écailleuse, squameuse, lichenoïde.	267.
—— furfuracée arondie.	242.
—— ——— volante.	300.
—— pustuleuse.	147.
—— rongeante.	380.
—— squameuse sèche.	267.
Dauwworm.	102, 106.
Dyschroa.	433.

E.

Ecthyma.	88.
——— infantile.	92.
——— luridum	93.
——— vulgare.	92.
Eczema.	8.
——— acutum.	13.
——— capitis.	19.
——— chronicum.	19.
——— faciei et aurium.	20.
——— impetiginodes.	17.
——— mercuriale.	29.
——— rubrum.	15.
——— simplex.	13.
Elephantia.	483.
Elephantiasis arabum.	483.
——— graecorum.	329.
——— tuberculosa.	329.
Elevures folliculeuses.	345.
Ephélides hépathiques.	300.
Ephelis.	434.
Epidermoses.	449.
Eruptia fungoides.	345.
Erysipelas periodicus, nervosus, chronicus.	472.
Etterpuisten.	88.
Etterpuist (gemeene)	92.
——— der kinderen.	92.
——— (wankleurige)	93.

F.

Feux de dents.	196.
------------------------	------

Formica corrosiva.	380.
Framboesia.	351.
———— batoides.	351.
———— cromwelliana.	377.
———— Illyrica Falcaldina.	366.
———— Scotica.	377.
Frambozen-uitflag.	351.
———— (Illyrische).	366.
———— (Schotsche).	377.
Furunculus.	411.
———— malignus.	418.

G.

Gezwel (schilpad).	493.
Gordelroos.	46.
Grieksche olifantsziekte.	329.
Gutta rosacea.	140.

H.

Haarmos.	201.
Haarworm.	37.
———— (blaasvormige).	39.
———— (etterende).	88.
———— (kringsgewijze).	46.
———— der lippen.	41.
———— der voorhuid en der teeldeelen.	44.
———— vuile.	79.
Haren (ziekten der).	453.
Herpes.	37.
———— circinatus.	46.
———— esthiomenes.	380.

Herpes exedens.	380.
—— labialis.	41.
—— phagadaenicus f. ferus f. depascens.	380.
—— phlyctenodes.	39.
—— praeputialis, genitalium.	44.
—— scabidus, centrifugus, papulofus.	242.
—— squaminosa madidans.	15.
—— zoster.	46.
Hitte-uitflag.	8.
—— (eenvoudige).	13.
—— (natrovige).	17.
—— (roode).	15.
—— (spoedig verdwijnende)	13.
Hoofdzeer.	158.
—— (kwaadaardig, schildvormig)	171.
—— (natrovig).	165.
—— (wolfsboonvormig, kwaad)	167.
Huid (gevlekte).	448.
—— (witte).	446.
Huidaanhangfels (ziekte der).	449.
Huidjeukte van den aars.	220.
—— — — balzak.	221.
—— (zachte, peukelachtige).	216.
—— (kriewelende ———).	217.
—— (peukelachtige) der oude lieden).	218.
—— algemeene peukelachtige.	220.
—— van de teeldeelen.	221.
Huidkanker.	405.
Huidmos.	199.
—— (afgeperkt).	202.

	bladz.
Huidmos (droog schubachtig).	267.
———— (eenvoudig).	200.
———— der keerringen.	206.
———— (loodkleurig).	206.
———— (netelzuchtaardig).	205.
Huidontkleuring.	433, 446.
Huidverkleuring.	433.
Huidworm (vurige).	203.
Huidziekte (eenvoudige vischschubbaardige).	314.
———— (hoornachtige).	318.
———— (venerifche).	482.
———— (verdeeling der).	3.
Hydrargyria.	29.
Hystricismus, Hystrix.	450.

I.

Ichthyosis.	313.
———— cornea.	318.
———— simplex.	314.
Impetigo.	97.
———— erysipelatodes.	109.
———— figurata.	98.
———— larvata.	102.
———— rodens.	111.
———— scabida.	110.
———— sparfa.	101.
Inhoud des 3 ^{de} Deels.	1.

K.

Kanker (Huid-).	405.
Kankerzweer.	405.

Karbonkel.	418.
Keloïdes.	493.
Kinschurft.	147.
Klieren op het hoofd.	165.
Knobbels.	326.
Kraauwfel (droog).	267.
———— (drupvormig droog).	269.
———— (gecronkeld slangvormig droog).	277.
———— (uitgebreid, spattend droog)	271.
———— (verouderd droog)	274.
———— (droog) der bakkers.	279.
———— ————— bleekers.	280.
———— ————— handpalmen.	281.
———— ————— kinderen.	286.
———— ————— lippen.	282.
———— ————— oogen.	285.
———— ————— teeldeelen	283.

L.

Lactumina.	103.
Lentigo.	434.
Leonia, Leontiasis, Léontine	329.
Lepra.	240, 329.
———— alphos, alphondes.	249.
———— artuum	483.
———— nigricans.	252.
———— vulgaris, graecorum.	242.
Lèpre tuberculeuse	329.
Leprosy (donkerkleurige)	252.
———— (witte)	249.
Leucopthia.	446.

	bladz.
Lichen	199.
—— agrius.	203.
—— circumscriptus.	202.
—— lividus.	206.
—— pilaris.	201.
—— simplex.	200.
—— tropicus.	206.
—— urticans.	205.
Lombardijſche pokken.	472.
Lues ſarmatica.	453.
Lupina.	167.
Lupus.	380.
—— exedens.	385.
—— exfolians.	387.
—— hyperthrophicus.	388.
—— ulcerofus.	384.
—— vorax s. herpeticus	380.

M.

Maculae	433.
—— maternae	440.
Melaatschheid.	240.
—— (gewone of griekſche).	242.
—— (knobbelachtige).	329.
Melkkorst	102, 103.
—— der kraamvrouwen	108.
Mentagra, Mentègre.	147.
Moedervlekken.	440.
—— (gekleurde)	440.
—— (vaatachtige of verhevene).	443.
Molusca.	345.

Molusca contagiosa.	348.
————— vulgaris.	347.
Muciflua.	165.

N.

Naevus maternus.	440.
———— pigmenti	440.
———— vasicularis.	443.
Noli me tangere	380, 405.

O.

Olifantsziekte (arabishe).	483.
————— (griekfche).	329.
Onychia.	465.
Onychofes.	449, 453.
Ophiasis.	277.

P.

Papulae.	193.
Pellagra.	472.
Pemphigus.	79.
Pestkool.	418.
Peukels.	193.
Pians.	359.
———— fongoïde.	345.
———— ruboïde.	359.
Pityriasis.	300.
———— capitis.	302.
———— nigra.	312.
———— rubra.	308.
———— versicolor.	305.

Plica polonica.	453.
Pokken van de Goudkust.	351.
—— (Lombardijſche)	472.
Poolſche vlecht.	453.
Porc-épics (Les hommes), Porcupine men. .	450.
Porrigo.	158, 300.
—— favoſa, volatia.	165.
—— furfurans.	163.
—— lupinoſa.	167.
—— ſcutulata	171.
Pruna.	418.
Prurigo, pruritus	215.
—— formicans	217.
—— genitalium	221.
—— localis	220.
—— mitis.	216.
—— podicus.	220.
—— pudendi.	222.
—— ſenilis	218.
—— ſcroti.	221.
—— univerſalis.	216.
Psora leproſa.	267.
Psoriaſis, Psora.	267.
—— (algemeene).	269.
—— agria	274.
—— diffuſa.	271.
—— genitalium	283.
—— guttata	269.
—— gyrata.	277.
—— infantilis.	286.
—— inveterata.	274.

Psoriasis labiorum	282.
———— localis.	279.
———— lotorum.	280.
———— ophthalmica.	285.
———— palmaria.	281.
———— pistoria.	279.
Psoride papuleuse.	215.
Prydracia	215.
Puisten.	86.
———— (vurige).	8.
Purpura.	483.
Pustula maligna.	424.
———— gangraenosa.	424.
Pustulae.	86.

R.

Red-gum.	195.
Rhypia , Rupia , Rypia.	79.
Rhyphia escharotica.	82.
———— prominens.	81.
———— simplex.	79.
Ringworm.	46.
Roof (afgeperkte natte).	98.
———— (eenvoudige vuile)	79.
———— (knagende of invretende	82.
———— (knagende natte).	111.
———— (natte)	97.
———— (korstige natte).	110.
———— (roosaardige natte)	109.
———— (verhevene of schulpvormige bruine)	81.
———— (verstrooide natte)	101.

	bladz.
Roof (vuile)	79.
Roos op het hoofd	163.
Ruidigheid.	300.

S.

Satyriasis	329.
Scabies	51.
——— capitis favosa.	165.
——— ——— lupina.	167.
——— papuliformis	215.
——— ficca	267.
Scherlievo (ziekte van).	366.
Scheurbuik der Alpen	472.
Schildpadgezwel.	493.
Schubben	236.
Schurft.	51.
——— drooge.	267.
Scorbutus alpinus.	472.
Serpigo.	277.
Sibbins, Sivvins, Sivvens.	377.
Spilus	440.
Sproeten.	434.
Squamae.	236.
Stekelvarken-uitflag, stekelvarken- menschen.	450.
Strophulus.	194.
——— ——— albidus.	195.
——— ——— candidus.	197.
——— ——— confectus	196.
——— ——— interstinatus ruber	195.
——— ——— volaticus	196.
Sycosis.	147.

Sycosis Indica	354.
Syphilides.	482.

T.

Tanduitflag.	194, 196.
———— (glinsterend)	197.
———— (vurig).	196.
Thymosis Indica.	359.
Tinea.	158.
—— annularis	167.
—— favosa, muciflua.	165, 167
—— ——— et granulata	171.
—— micosa	103.
—— muciflua faciei.	103.
Trichoma	453.
Trichoses	449, 453.
Tubercula.	326.
Tyria.	277.
Tyriasis.	277.

U.

Uitflag (Frambozen-)	351.
—— (Illyrische Frambozen-).	351.
—— (Schotsche Frambozen-).	377.
—— (Stekelvarken).	450.
—— (Tand-).	194, 196.
—— (glinsterend Tand-)	197.
—— (vurig Tand-)	196.
—— (vischschubachtig).	313.
—— (zemel-).	300.
—— (zemel-) van het hoofd.	302.

Uitslag (met kleuren spelend zemel-).	305.
—— (roode zemel-).	308.
—— (zwarte zemel-)	312.
—— (zuur-)	194.
—— (roode zuur-)	194, 196.
—— (witte zuur-)	195.
Uitwasfen	345.
—— (besmettende)	348.
—— (gewone)	347.
Ulcère cancreux.	405.

V.

Verdeeling der Huidziekten.	3.
Vesiculae	8.
Vinnen	132.
—— (eenvoudige)	134.
—— (gepunte).	136.
—— (verharde)	137.
Vitiligo.	448.
Vlecht (Poolfche)	453.
Vlekken.	433.
—— (Moeder-).	440.
—— (gekleurde Moeder-)	440.
—— (vaataardige of verhevene Moeder-).	443.

W.

Wolf.	380.
—— (zwerende)	385.
—— (dieper indringende zwerende)	385.
—— (oppervlakkig schilferende, niet zwerende)	387.
—— (met vergrooting der lijdende deelen)	388.

Y.

Yams 354.

Z.

Zemeluitflag 300.
 ————— van het hoofd. 302.
 ————— (met kleuren spelende) 305.
 ————— (roode). 308.
 ————— (zwarte) 312.
 Ziekte der Haren 453.
 ——— ——— Huidaanhangfels 449.
 ——— van Scherlievo 366.
 Zuuruitflag. 194, 195.
 ————— (witte). 195.
 ————— (roode). 195.

DRUKFOUTEN.

Bl.	1. regel	5 van boven staat: beoefende	lees: beoefenende
—	2. —	9 v. onderen — geene	— gene
—	7. —	5 v. b. — en grondvor-	— en als grondvor-
		men	men
—	8. —	2 v. o. — eene	— geene
—	10. —	2 v. o. — de voeten of	— de voeten. Of ook
		ook, de voch-	de vochten worden
		ten dik	dik,
—	29. —	15 v. b. — laat het gebruik	— laat na het gebruik.
—	50. —	4 v. b. — te matigen	— te matigen, in ge-
			bruik
—	ibid. —	2 v. o. — gewone	— de gewone
—	ibid. —	2 v. o. — oplettendheid	— de oplettendheid
—	52. —	3 v. o. — bereidt	— breidt
—	53. —	9 v. o. — menigvuldi-	— menigvuldiger
		ger	wordt
—	58. —	7 v. b. — aan	— men aan
—	60. —	2 v. o. — en er	— er
—	74. —	13 v. o. — in	— en
—	132. —	9 v. b. — plaatsen	— plaatse
—	143. —	13 v. o. — met	— gepaard met
—	176. —	15 v. o. — waarin	— waarin door
—	180. —	8 v. b. — zuivere	— zuiver
—	250 —	1 v. b. — in gedaante	— in de gedaante
—	262. —	6 v. o. — geene	— gene
—	312. —	5 v. o. — van	— op
—	322. —	15 v. o. — degezondheid	— de gezondheid in
		en de stand	stand
—	329. —	6 v. o. — knobbelachte	— knobbelachtige
—	340. —	1 v. o. — knobbels der	— knobbels met die
		olifantsziekte	der olifantsziekte
—	352. —	1 v. o. — Joden	— zaden
—	377. —	9 v. b. — waarvan	— waaraan
—	411. —	8 v. b. — darmkanale	— darmkanaal
—	450. —	15 v. o. — <i>procupine</i>	— <i>porcupine</i>
—	496. —	10 v. o. — met	— niet

Andere, min hinderlijke fouten gelieve de goedgunstige Lezer te verschoonen.





